

W. Vatke

CATALOGUS

HORTI ACADEMICI VINDOBONENSIS.

DISPOSUIT

STEPHANUS ENDLICHER.

TOMUS I.

VINDOBONAE.

SUMPTIBUS ET TYPIS CAROLI GEROLD.

1842.

K

. . . . . Illud vero deterrimum genus est, quod erit siccum simul et spissum, et macrum vel frigidum. Sed ubi haec, quae naturalia sunt, neque humana ope curari possunt, deligentius aestimaveris, exsequi convenit partem, quae restat industriae.

Palladius.

PRAEFATIO.

Hortorum botanicorum catalogi vario usui destinati sunt. Nam ejusmodi recensus cunctis, qui in eadem scientiae vinea operantur, serviunt, et quid ex unoquoque petendum et vicissim sit dandum docent, deinde tutissimum plantarum per areas et caldaria dispositionis fundamentum sistunt et nomenclatorem, seminariorum etiam clavis sunt, et commercii epistolici index, primaria verbo horti administrandi norma.

Plantarum horti Vindobonensis, qui per longam annorum seriem, a clarissimis inter botanicos viris curatus, primum sub Jacquinio patre inclaruit, deinde a Jacquinio filio immensum ampliatus et mirifice auctus est, recensus nullus exstat, unde factum fuit, ut ab aliis divitiae nostrae extollerentur nimium, alii paupertatem invidiose despicerent, omne autem cum exteris commercium fieret intutum, plantarum in horto dispositio squallide arbitraria, et nomenclatura perpetuae inconstantiae dubiis vexata. Nunc ut collegae, quorum benevolentiam toties experior, intelligant, quibus in satis spectabili apparatu praesidiis careamus, curandum fuit, et danda in reformando et augendo porro quoque horto norma, illis etiam, qui nostris studiorum causa uti volunt, succur-

rendum. Prospiciendum deinde mature fuit, ut quid a praedecessoribus acceptum, successori reliquendum erit, juste intelligatur, intelligatur autem etiam ab illis, qui caliginem in ejusmodi judicio luci praeferunt; in quo tamen haereditatis botanicae recensu tam parum sordidus fui, ut non modicus stirpium rarissimarum numerus, quas ad hanc diem ego, partim meo aere emptas, partim immodicis etiam precibus amicis extortas, horto primus intuli, inter acceptas a Jacquiniis in hoc libro habeatur.

Systema quod in ista horti academici enumeratione secutus sum, nemo prudens morabitur. Nam dummodo ab artificialium clavium serie abstineamus, qualecumque bonum est, in quo genera sub familiarum naturalium vinculo coërcentur. Ipsorum enim ordinum series nimis adhuc arbitraria est, et in horto plane loco accomodanda.

Ab observationibus botanicis, quibus tales libelli gravantur, abstinui. Hae dificillime ex ejusmodi farragine possunt expiscari, et alias dandae sunt.

Plantarum qui recens, si per fata licet, horto inferentur, annuos indices dabo.

Res autem horti, quae etiam meae sunt, amicis collegis et fautoribus porro, quibus possum precibus, commendo.

Vindobonae, in aedibus horti academici.
Kal. Mart. 1842.

Steph. Endlicher.

I. CORMOPHYTA ACROBRYA.

Ordo I. Equisetaceae.

601. **Equisetum** Linn. Schachtelhalm.

1. **Equisetum arvense** Linn. Spec. 1516. Hayne Arzneigew. VIII. t. 46. — Zinnkraut. —♃— *Crescit in agris argillosis Europae totius.*

Officin. Herba Equiseti minoris.

2. **Equisetum fluviatile** Linn. Spec. 1517. Blackwell Herb. t. 277. f. 2. — ♃ — *Crescit juxta aquas lente fluentes et quietas Europae totius.*

Officin. Herba Equiseti majoris, ἵππουρις Dioscorid.

3. **Equisetum hiemale** Linn. Spec. 1517. Flor. dan. t. 1184. — Schachtelhalm. —♃— *Habitat in limosis Europae et Americae borealis.*

Officin. Herba Equiseti mechanici.

4. **Equisetum limosum** Linn. Spec. 1517. Flor. dan. t. 1184. —♃— *Habitat in paludosis et turfosis Europae totius.*

Haec species (ἵππουρις ἑτέρα Dioscorid.) inter congeneres vehementissime diuretica.

Ordo II. Polypodiaceae.

603. **Acrostichum** Linn.

a. **Polybotrya** H. B.

5. **Acrostichum acuminatum.** *Polybotrya acuminata* Kaulf. msc. Link Hort. Berolin. I. 135. —♃— *Habitat in Brasilia.*

6. **Acrostichum incisum.** *Polybotrya incisa* Link Hort. Berolin. I. 135. —♃— *Habitat in Brasilia.*

b. **Olfersia** Radd.

7. **Acrostichum Olfersia.** *Polybotrya Raddiana* Kaulfuss msc. Link Hort. Berol. I. 134. excl. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

8. **Acrostichum conforme** Swartz Synops. 10. 192. t. 1. f. 1. Blume Flor. Jav. Filic. 23. t. 5. *Olfersia conformis* Presl Pteridogr. 234. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei et in Asia tropica.*

c. **Neuroplatyceros** Pluckn.

9. **Acrostichum alcicorne** Swartz Synops. 12. et 196. Willd. Spec. V. 111. *Platycerium alcicorne* Gaudich. ad Freyc. 48. *Neuroplatyceros* Pluckn. Amalth. 151. t. 429. f. 2. —♃— *Habitat inter tropicos Asiae et Africae.*

606. Gymnogramme Desv.

a. **Neurogramma** Presl.

10. **Gymnogramme tomentosa** Desvaux in Berl. Magaz. V. 304. Link Hort. Berol. I. 49. *Hemionitis tomentosa* Raddi Brasil. 8. t. 19. *Ceterach lobatum* Presl Delic. 1. 162. — 5 — *Habitat in Brasilia.*

b. **Calomelanos** Presl.

11. **Gymnogramme chrysophylla** Kaulfuss Enum. 74. *Acrostichum chrysophyllum* Swartz Synops. 15. Willd. Sp. V. 124. — ♃ — *Habitat in Jamaica, Hispaniola, Martinica.*

12. **Gymnogramme flavens** Kaulf. Enum. 77. *Acrostichum flavens* Swartz Synops. 204. Willd. Sp. V. 125. — ♃ — *Habitat in America meridionali.*

13. **Gymnogramme Calomelanos** Kaulf. Enum. 76. *Acrostichum Calomelanos* Linn. Spec. 1529. Schkuhr Handb. t. 5. Willdenow Hort. Berolin. t. 40. 41. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

14. **Gymnogramme dealbata** Link Hort. Berol. I. 52. *Gymnogramme tatarea* Desvaux Journ. Bot. 1. 27. *Hemionitis dealbata* Willdenow Spec. V. 131. Hort. Berol. t. 40. — 5 — *Habitat in America tropica.*

15. **Gymnogramme sulfurea** Desvaux Journ. Bot. 1. 27. Kaulf. Enum. 74. *Acrostichum sulfureum* Swartz Synops. 15. Schkuhr Farrenkr. t. 4. — ♃ — *Habitat in Jamaica.*

16. **Gymnogramme peruviana** Desvaux in Berl. Magaz. V. 329. Kaulf. Enum. 77. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

17. **Gymnogramme distans** Link Hort. Berol. II. 53. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

c. **Ceterach** Adans.

18. **Gymnogramme leptophylla** Desvaux in Berl. Magaz. V. 305. Hooker et Grev. Fil. I. t. 25. *Grammitis leptophylla* Swartz Synops. 23 et 218. t. 1. f 6. *Polypodium leptophyllum* Linn. Spec. 1553. Schkuhr Farrenkr. t. 26. *Acrostichum leptophyllum* Linn. Spec. 1553. Schkuhr Farrenkr. t. 26. *Ceterach leptophyllum* DC. Flor. fr. II. 565. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

19. **Gymnogramme sinuata** Presl Pteridogr. 219. *Nothochlaena sinuata* Kaulf. Enum. 135. *Acrostichum sinuatum* Swartz Synops. 14. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

607. **Grammitis** Swartz.

20. **Grammitis villosa** Presl Pterid. 209. *Gymnogramme villosa* Link Hort. Berol. I. 51. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

614. **Nothochlaena** R. Br.

21. **Nothochlaena sulcata** Link Hort. Berolin. II. 367. — ♃ — *Habitat in China australi, a beato Meyen in hortum Berolinensem illata.*

615. **Polypodium** Linn. Engelsüss.

a. **Eupolypodium** Endl.

a. Ctenopteris Blum.

22. **Polypodium vulgare** Linn. Spec. 1544. Schkuhr Farrenkr. t. 11. Willdenow Spec. V. 172.

— *Kropfwurzel. Engelsüss.* — ♃ — *Habitat in rupestribus sylvaticis Europae totius et Americae borealis.*

Var. ε. *P. cambricum* Linn. Spec. 1546. (Bolton Filic. t. 2. f. 5. 6.)

Officin. Radix Polypodii s. Filiculae dulcis.

23. **Polypodium Paradiseae** Willd. Spec. V. 119. Langsdorf et Fischer Fil. t. 11. Kaulf. Enum. 105. — ♃ — *Habitat in insula S. Catharinae Brasiliae.*

β. *Phegopteris* Presl.

24. **Polypodium Dryopteris** Linn. Spec. 1555. Schkuhr Farrenkr. t. 25. Willdenow Spec. V. 209. — ♃ — *Habitat in umbrosis nemorosis Europae mediae.*

25. **Polypodium effusum** Swartz Synops. 41. Willdenow Spec. V. 203. Schkuhr Farrenkr. t. 26. c. Link Hort. Berol I. 109. — ♃ — *Habitat in montibus Jamaicae.*

26. **Polypodium concinnum** Willdenow Spec. V. 201. Link Hort. Berol. I. 104. — ♃ — *Habitat in Caracas et Chili.*

b. **Goniopteris** Presl.

27. **Polypodium proliferum** Kaulf. Enum. 107. Link Hort. Berolin. I. 101. — ♃ — *Habitat in insula S. Catharinae Brasiliae.*

28. **Polypodium crenatum** Swartz Synops. 37. Kaulf. Enum. 109. Link Hort. Berolin. I. 103. *Goniopteris crenata* Presl Pteridogr. 185. — ♃ — *Habitat in insula St. Crucis et in St. Domingo.*

c. **Marginaria** Presl.

29. **Polypodium harpeodes** Link Hort. Berol. I. 97. *Marginaria harpeodes* Presl Pteridogr. 188. — ♃ — *Habitat verisimiliter in Brasilia.*

d. **Cyrtophlebium** R. Br.

30. **Polypodium Phyllitidis** Linn. Spec. 1543. Willdenow Spec. V. 157. *Campyloneurum Phyllitidis* Presl Pteridogr. 190. — ♃ — *Habitat in sylvis Antillarum.*

31. **Polypodium decurrens** Raddi Brasil. 23. t. 33. Link Hort. Berol. I. 103. *Campyloneurum decurrens* Presl Pteridogr. 190. — ♃ — *Habitat in sylvis opacis montium Estrella Brasiliae.*

e. **Phlebodium** R. Br.

32. **Polypodium aureum** Linn. Spec. 1546. Schkuhr t. 12. Swartz Synops. 32. Willdenow. Spec. V. 162. *Pleopeltis aurea* Presl Pteridogr. 193. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

Rhizomatis indumentum squamosum stypticum, in Angliae officinis servatur.

f. **Phymatodes** Presl.

33. **Polypodium crassifolium** Linn. Spec. 1543. Swartz Synops. 27. Willdenow Spec. V. 161. Kaulf. Enum. 93. *Phymatodes crassifolia* Presl Pteridogr. 193. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

618. Cheilanthes Swartz.

a. **Eucheilanthes** Endl.

34. **Cheilanthes micromera** Link Hort. Berol. II. 36. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

35. **Cheilanthes micropteris** Swartz Synops. 126. t. 3. f. 5. — ♃ — *Habitat in Quito.*

36. **Cheilanthes microphylla** Swartz Synops. 127. Link Hort. Berol. II. 37. *Adiantum microphyllum* Swartz Flor. Ind. occ. III. 1713. — ♃ — *Habitat in montibus Indiae occidentalis.*

37. **Cheilanthes ferruginea** Willd. Herb. Sprengel Pugill. II. 94. Link Hort. Berol. II. 38. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

38. **Cheilanthes hirta** Swartz Synops. 120. Link Hort. Berol. II. 42. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

39. **Cheilanthes tomentosa** Link Hort. Berol. II. 42. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

40. **Cheilanthes viscosa** Link Hort. Berol. II. 43. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

b. **Physapteris** Presl.

41. **Cheilanthes lendigera** Swartz Synops. 128. Link Hort. Berol. II. 42. *Pteris lendigera* Cavanill. Praelect. n. 664. — ♃ — *Habitat in Nova Hispania.*

c. **Hypolepis** Bernh.

42. **Cheilanthes dicksonioides** Endl. Prodr. Fl. norf. n. 46. Kunze Farrenkr. t. 8. *Hypolepis dicksonioides* Presl Pteridogr. 162. — 5 — *Habitat in insula Norfolk.*

620. Adiantum Linn. Frauenhaar.

43. **Adiantum reniforme** Linn. Spec. 1556. Willd. Spec. V. 427. Schkuhr Farrenkr. t. 105. *Adiantum asarifolium* Willdenow Spec. V. 427. — ♃ — *Habitat in rupibus insularum Madeirae, Teneriffae, Mauritii et Borboniae.*

44. **Adiantum Capillus Veneris** Linn. Spec. 1558. Jacq. Miscell. II. 77. t. 7. Willdenow Spec. V. 449. — *Frauenhaar.* — ♃ — *Habitat in rupibus Europae australioris.*

Officin. Herba Capillorum Veneris.

45. **Adiantum tenerum** Swartz Flor. Ind. occ. III. 1719. — ♃ — *Habitat in Jamaica.*

46. **Adiantum trapeziforme** Linn. Spec. 1559. Swartz Synops. 125. *Adiantum rhomboideum* Schkuhr Farrenkr. 1. t. 122. — ♃ — *Habitat in Antillis.*

47. **Adiantum plicatum** Kaulf. Enum. 201. *Adiantum pubescens* Schkuhr Farrenkr. t. 116. non Willd. — ♃ — *Patria ignota.*

48. **Adiantum concinnum** Humb. in Willd. Spec. V. 451. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 20. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

622. Pteris Linn. Adlerfarren.

a. **Allosorus** Presl.

49. **Pteris argentea** Gmelin in N. A. Petrop. XII. t. 12. f. 2. Langsd. et Fisch. Fil. 1. 19. t.

22. *Allosorus argenteus* Presl Pteridogr. 153. — ♃ — *Habitat in Sibiria orientali ad lacum Baikal.*

50. **Pteris inframarginalis** Kaulf. ex Link Hort. Berol. II. 34. *Allosorus inframarginalis* Presl Pteridogr. 153. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

51. **Pteris cordata** Cavanill. Praelect. 1801. n. 662. Link Hort. Berol. II. 27. *Allosorus cordatus* Presl Pteridogr. 153. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

52. **Pteris Calomelanos** Swartz Synops. 106. *Allosorus Calomelanos* Presl. Pteridogr. 153. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

53. **Pteris sagittata** Cavanill. Praelect. 1801. n. 661. Swartz Synops. 106. *Allosorus sagittatus* Presl Pteridogr. 153. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

54. **Pteris rufescens** Endl. *Cheilanthes marginata* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gén. et sp. I. 22. *Cheilanthes rufescens* Link Hort. Berol. II. 39. *Allosorus ciliatus* Presl Pteridogr. 53. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

55. **Pteris aquilina** Linn. Spec. 1833. Schkuhr Farrenkr. t. 95. *Allosorus aquilinus* Presl Pteridogr. 153. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Europae totius et Americae borealis.*

Offic. exolet. Radix Pteridis aquilinae s. Filicis feminae.

b. **Litobrochia** Presl.

56. **Pteris pedata** Linn. Spec. 1833. Schkuhr Farrenkr. t. 100. *Litobrochia pedata* Presl Pteridogr. 149. — ♃ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

c. **Eupteris** Agardh Fil.

57. **Pteris falcata** R. Brown Prodr. 154. Link Hort. Berol. II. 21. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

58. **Pteris serrulata** Linn. f. Suppl. 425. Schkuhr Farrenkr. t. 91. — ♃ — *Habitat in China et Japonia.*

59. **Pteris nemoralis** Willd. Spec. V. 386. Agardh Pter. 25. *Pteris Plumierii* Willd. Enum. 11. 462. — ♃ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

60. **Pteris biaurita** Linn. Spec. 1534. Agardh

Pteridogr. 26. — ♃ — *Habitat inter tropicos Asiae et Americae.*

61. **Pteris elegans** Jacq. Fragm. 74. t. 116. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

62. **Pteris longifolia** Jacq. Hort. Schönbr. III. 78. t. 399. 400. — ♃ — *Habitat in Asia et America tropica.*

63. **Pteris arguta** Vahl Symb. I. 84. Agardh Pter. 36. — ♃ — *Habitat in insulis Canariis.*

64. **Pteris lata** Kaulf. ex Link Hort. Berol. II. 28. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

65. **Pteris flabellata** Thunb. Prodr. 172. Agardh Pter. 37. *Pteris arguta* Schlechtend. Adumbr. 43. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

66. **Pteris tremula** R. Brown Prodr. 154. Agardh Pter. 40 *Pteris chrysocarpa* Link Hort. Berol. II. 33. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

67. **Pteris deflexa** Link Hort. Berol. II. 30. Agardh Pter. 41. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

624. Blechnum Linn.

a. **Blechnum** Willd.

68. **Blechnum lanceolatum** Raddi Brasil. 52. t. 60. f. 3. Link Hort. Berol. II. 75. — 5 — *Habitat in Corcovado Brasiliae.*

69. **Blechnum gracile** Kaulf. Enum. 158. Link Hort. Berol. II. 75. — 5 — *Habitat in Brasilia.*

70. **Blechnum triangulare** Link Hort. Berol. II. 76. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

71 **Blechnum occidentale** Linn. Spec. 1534. Jacq. Collect. III. 228. Ic. rar. t. 644. *Blechnum cartilagineum* Schkuhr Farrenkr. t. 108. 6. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

72 **Blechnum australe** Linn. Mant. I. 130. Schkuhr Farrenkr. t. 110. 6. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

73. **Blechnum brasiliense** Desvaux in Berl. Magaz. V. 330. Kaulf. Enum. 159. Link Hort. Berol. II. 78. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

b. **Lomaria** Willd.

74. **Blechnum auriculatum.** *Lomaria auriculata* Dèsvaux in Berl. Magaz. V. 330. *Lomaria densa* Kaulf. Enum. 151. Link Hort. Berol. II. 81. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

628. **Struthiopteris** Willd. Straussfarren.

75. **Struthiopteris germanica** Willd. Spec. V. 288. *Osmunda Struthiopteris* Linn. Spec. 1522. Flor. dan. t. 169. *Onoclea Struthiopteris* Swartz Synops. 111. — ♃ — *Habitat in Europa media.*

630. **Asplenium** Linn. Streifenfarren.

a. **Thamnopteris** Presl.

76. **Asplenium Nidus** Linn. Spec. 1537. Willdenow Spec. V. 303. Raddi Brasil. 34. t. 53. — 5 — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

b. **Euasplenium** Endl.

77. **Asplenium palmatum** Swartz Synops. 75. Willdenow Spec. V. 306. Schkuhr Farrenkr. t. 66. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

78. **Asplenium Serra** Langsdorf et Fischer Filic. 17. t. 19. Link Hort. Berol. I. 58. — ♃ — *Habitat in insula S. Catharinae Brasiliae.*

79. **Asplenium marinum** Linn. Spec. 1540. Schkuhr Farrenkr. t 68. — ♃ — *Habitat in rupibus maritimis Angliae, Hispaniae, Barbariae et in Canariis.*

80. **Asplenium obtusifolium** Linn. Spec. 1538. Hooker et Greville Fil. t. 249. Link Hort. Berol. I. 59. — ♃ — *Habitat in Antillis.*

81. **Asplenium ebenum** Aiton Hort. Kew. ed. 1. III. 462. Schkuhr Farrenkr. t. 73. Link Hort. Berol. I. 60. — ♃ — *Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania.*

82. **Asplenium Trichomanes** Linn. Spec. Schkuhr Farrenkr. t. 74. E. B. t. 576. — ♃ — *Habitat in rupibus Europae totius.*

83. **Asplenium praemorsum** Swartz Syn-

ops. 83. Schkuhr Farrenkr. t. 79. Link Hort. Berol. I. 65. — ♃ — *Habitat in Caracas.*

84. **Asplenium Ruta muraria** Linn. Spec. 1541. Schkuhr Farrenkr. t. 80. 6. E. B. t. 150. — ♃ — *Habitat in rupibus Europae, imprimis borealis.*

634. Scolopendrium Smith. Hirschzunge.

85. **Scolopendrium officinarum** Swartz Synops. 89. Schkuhr Farrenkr. t. 83. Willdenow Spec. V. 349. *Asplenium Scolopendrium* Linn. Spec. 1537. — ♃ — *Habitat in saxosis nemorum Europae totius.*

Var. δ. *S. daedaleum* Willd. Enum. 1073.

Var ε. *S. multifidum* Willd. Spec. V. 349. (Schkuhr t. 83. f. 6.)

Officin. Herba Sclopendrii s. Linguae cervinae (φυλλῖτις Dioscorid.)

636. Diplazium Swartz.

86. **Diplazium acuminatum** Raddi Brasil. 41. t. 57. f. 2. Link Hort. Berol. II. 70. — ♃ — *Habitat in monte Corcovado Brasiliae.*

87. **Diplazium Shepherdi** Link Hort. Berol. II. 70. *Asplenium ambiguum* Raddi Brasil. 38. t. 54. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

88. **Diplazium obtusum** Kaulf. msc. Link Hort. Berol. II 73. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

89. **Diplazium arborescens** Swartz Synops. 92. Link Hort. Berol. II. 72. — ♃ — *Habitat in insula Borbonia.*

639. Nephrodium L. C. Rich.

a. Eunephrodium Endl.

90. **Nephrodium molle** Schott Fil. t. 14. *Aspidium molle* Swartz Synops. 49. Schkuhr Farrenkr. t. 34. f. a. b. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

91. **Nephrodium violascens** Schott Fil. 14. *Aspidium violascens* Link Hort. Berol. I. 115. *Polypodium molle* Jacq. Collect. III. 188. Ic. rar. t. 640. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

b. Dryopteris Adans.

a. Eudryopteris.

92. **Nephrodium Serra.** *Aspidium Serra* Swartz Synops. 47. Willden. Spec. V. 240. *Polypodium Serra* Swartz Flor. Ind. occid. III. 1665. *Lastraea Serra* Presl Pteridogr. 76. — ♃ — *Habitat in sylvis Jamaicae et Brasiliae.*

93. **Nephrodium patens** Schott msc. *Aspidium patens* Willdenow Spec. V. 244. Raddi Brasil. 32. t. 48. — ♃ — *Habitat in Brasilia prope Rio Janeiro.*

94. **Nephrodium Kaulfussii.** *Aspidium Kaulfussii* Link Hort. Berol. I. 117. *Lastraea Kaulfussii* Presl Pteridogr. 75. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

95. **Nephrodium chrysolobum.** *Aspidium chrysolobum* Kaulfuss msc. Link Hort. Berol. I. 117. *Lastraea chrysoloba* Presl Pteridogr. 75. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

β Thelypteris.

96. **Nephrodium Filix mas** L. C. Richard. *Aspidium Filix mas* Swartz Synops. 55. Schkuhr Farrenkr. t. 44. *Polypodium Filix mas* Linn. Spec. 1551. *Dryopteris Filix mas* Schott Fil. t. 12. *Lastraea Filix mas* Presl Pteridogr. 76. — ♃ — *Habitat in Europae mediae sylvis montanis.*

97. **Nephrodium aculeatum.** *Aspidium aculeatum* Swartz Synops. 53. — Schkuhr Farrenkr. t. 39. *Polypodium aculeatum* Linn. Spec. 1552. — ♃ — *Habitat in nemorosis montanis Europae et Americae borealis.*

640. Aspidium Swartz. Wurmfarren.

98. **Aspidium trifoliatum** Swartz Synops. 43. Schkuhr Farrenkr. t. 28. Willdenow Spec. V. 213. *Polypodium trifoliatum* Linn. Spec. 1547. Jacq. Collect. III. 185. Ic. rar. t. 638. — ♃ — *Habitat in nemoribus Hispaniolae, Jamaicae et Martinicae.*

99. **Aspidium macrophyllum** Swartz Synops. 43. Willdenow Spec. V. 217. Link Hort. Berolin. I. 113 — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

641. **Cystopteris** Bernh.

100. **Cystopteris alpina** Link Hort. Berol. II. 130. *Aspidium alpinum* Swartz Synops. 60. Schkuhr Farrenkr. t. 62. *Polypodium alpinum* Jacq. Collect. II. 171. Ic. rar. t. 642. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae.*

643. **Davallia** Smith.

101. **Davallia canariensis** Swartz Synops. 134. Willdenow Spec. V. 474. *Trichomanes canariense* Linn. Spec. 1562. *Polypodium lusitanicum* Linn. Spec. 1556. — ♃ — *Habitat in insulis Canariis et in Lusitania.*

644. **Dicksonia** Herit.

102. **Dicksonia tenera** Presl Pteridogr. 136. *Dicksonia adiantoides* Link Hort. Berol. II. 9. non Willd. et Humb. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

103. **Dicksonia rubiginosa** Kaulfuss Enum. 226. Link Hort. Berol. II. 10. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

646. **Physematium** Kaulf.

104. **Physematium molle** Kaulf. in Link Hort. Berol. II. 134. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

105. **Physematium incisum** Presl Pteridogr. 66. *Woodsia incisia* Hooker et Grev. Fil. t. 119. — ♃ — *Habitat in Chili.*

655. **Ceratopteris** Brongn.

106. **Ceratopteris thalictroides** Brongniart in Bullet. Soc. philomat. 1821. p. 184. *Ellobocarpus oleraceus* Kaulfuss Entwickl. f. 7.—9. *Pteris thalictroides* Swartz in Schrader Journ. 1801. II. t. 1. f. 1. *Acrostichum thalictroides* Linn. Amoen. Academ. I. t. 12. f. 3. — ♃ — *Habitat in aquis stagnantibus Indiae orientalis.*

Ordo III. Schizaeaceae.

661. **Aneimia** Swartz.

107. **Aneimia Phyllitidis** Swartz Synops. 155. Willd. Spec. V. 89. Langsdorff et Fisch. Fil. t. 28. Link Hort. Berol. II. 142. *Aneimia longifolia* Raddi Fil. t. 8. *Osmunda Phyllitidis* Linn. Spec. 1520. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

108. **Aneimia densa** Link Hort. Berol. II. 143. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

109. **Aneimia collina** Raddi Bras. 71. t. 12. Link Hort. Berol. II. 143. — ♃ — *Habitat in Brasilia, prope Rio-Janeiro.*

664. **Mohria** Swartz.

110. **Mohria thurifraga** Swartz Synops. 159 et 385. t. 5. Schkuhr Farrenkr. t. 143. *Polypodium Caffrorum* Linn. Mant. 307. *Adiantum Caffrorum* Linn. Suppl. 447. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*
Trita Benzoën redolet.

Ordo IV. Ophioglosseae.

674. **Botrychium** Swartz. Mondraute.

111. **Botrychium Lunaria** Swartz Synops. 171. Willdenow. Spec. V. 61. *Osmunda Lunaria* Linn. Spec. 1519. Flor. dan. t. 18. — ♃ — *Habitat in collibus siccis Europae totius.*
Officin. exolet. Herba Lunariae botrytidos.

Ordo V. Isoeteae.

693. **Isoetes** Linn. Brachsenkraut.

112. **Isoetes setacea** Bosc in Dict hist. nat. Delile in Mem. Mus. XIV. t. 6. 7. — ♃ — *Habitat in fossis agri monspessulani.*

Ordo VI. Lycopodiaceae.

696. Lycopodium Linn. Bärlapp.

113. **Lycopodium circinale** Swartz Synops. 182. Hooker et Grev. Bot. Miscell. II. 381. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

114. **Lycopodium stoloniferum** Swartz Synops. 182. Hooker et Grev. Bot. Miscell. II. 392. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

115. **Lycopodium denticulatum** Linn. Spec. 1569, Hooker et Grev. Bot. Miscell. II. 400. — ♃ — *Habitat in Europa et Africa mediterranea.*

Ordo VII. Cycadeaceae.

704. Cycas Linn.

116. **Cycas revoluta** Thunb. Flor. japon. 229. Smith in Linn. Transact. VI. 312. t. 29. — 5 — *Habitat in Japonia et China.*

117. **Cycas circinalis** Linn. Spec. 1658. Richard Cycad. t. 24—26. Hooker in Bot. Mag. t. 2826. 2827. *Todda Panna* Rheede Hort. Malab. III. 9. t. 13—21. — 5 — *Habitat in India orientali.*

705. Encephalartos Lehm.

118. **Encephalartos caffer** Lehmann Pugill. VI. 14. *Cycas caffra* Thunberg in Nov. Act. Upsal. II. t. 5. — 5 — *Habitat in Capite bonae spei.*

706. Zamia L.

119. **Zamia integrifolia** Aiton Hort. Kew. ed. 1. III. 478. Jacq. Collect. III. 261. Ic. rar. III. t. 635. — 5 — *Habitat in St. Domingo et in Florida orientali.*

II. CORMOPHYTA AMPHIBRYA.

Ordo VIII. Gramineae.

Tribus I. Oryzeae.

728. **Leersia** Soland.

120. **Leersia oryzoides** Swartz Flor. Ind. occ. I. 132. Willd. spec. I. 325. Host Gram. I. t. 35. Kunth Agrost. 5. *Phalaris oryzoides* Linn. Spec. 81. Schreb. Gram. VI. t. 22. *Homalocenchrus oryzoides* Poll. Pal. n. 56. *Asprella oryzoides* Lam. Ill. 1. 167. — ♃ — *Habitat in aquis Europae, Persiae et Americae borealis.*

729. **Oryza** Linn. Reis.

121. **Oryza sativa** Linn. Spec. 465. Willd. Spec. II. 247. Kunth Agrost. 7. — ⊙♃ — *Colitur in Europa australi, et in regionibus tropicis subtropicisque totius orbis.*

β. *Oryza sativa montana.*

736. **Ehrharta** Thunb.

122. **Ehrharta panicea** Smith Icon. t. 9. Swartz in Linn. Trans. VI. t. 3. f. 2. Beauv. Agrost. 60. t. 12. f. 2. Schrad. Anal. II. n. 7. Kunth Agrost. 12. *Ehrharta erecta* Lam Encycl. II. 347. Ejusd. ill. t. 263. f. 1. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Tribus II. Phalarideae.*

741. **Lygeum** Linn.

123. **Lygeum sparteum** Loefl. Iter. 285. t. 2. Linn. Spec. 78. Richard in Act. Soc. Par. 28. t. 3.

Willd. Spec. I. 316. Kunth Agrost. 19. — ♃ — *Habitat in Hispania et Africa boreali.*

742. **Zea** Linn. Mais.

124. **Zea Mays** Linn. Spec. 1378. Parmentier, Le mais, ou blé de Turquie apprécié. Paris, 1785. 8. Ed. 2. 1812. 8. Harasti Gaet. Della coltivazione del Maiz. Vicenza, 1788. 8. Burger, Naturgeschichte, Cultur und Benutzung des Mais. Wien, 1809. 8. Bonafous, Matth. Histoire naturelle, agricole et économique du Maïs. Paris, 1836. Fol. — ⊙ — *Habitat verisimiliter spontanea in America tropica.*

Var. *A. Praecox. Zea mays praecox* Bonaf. op. cit. 32. t. 6. f. 3. Mais quarantain.

B. Minima. Zea Mays minima Bonaf. op. cit. 36. t. 9. f. 11. Mais nain s. Maïs a poulet.

C. Guasquinensis. Zea Mays guasquinensis Bonaf. op. cit. 37. t, 10. f. 14. Mais de Guasco.

D. Hirta. Zea hirta Bonaf. op. cit. 29. et 39. t. 4. Maïs herissé.

E. Rubra. Zea Mays rubra Bonaf. op. cit. 40. t. 12. f. 22. Maïs rouge.

F. Versicolor. Zea Mays versicolor Bonaf. op. cit. 40. t. 21. f. 23. Maïs jaspé.

743. **Coix** Linn. Hiobsthräne.

125. **Coix Lacryma** Linn. Spec. 1378. Lam. Ill. t. 750. Kunth Agrost. 20. *Lithagrostis Lacryma Jobi* Gärtn. Fruct. I. t. 1. f. 10. — Rumph. V. t. 75. f. 2. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

Officin. exolet. Semina Lacrymae Jobi, diuretica.

744. **Cornucopiae** Linn. Füllhorngras.

126. **Cornucopiae cucullatum** Linn. Spec. 79. Schreb. Gram. II. t. 41. Smith Spicil. t. 14. Kunth Agrost. 21. — ⊙ — *Habitat in Graecia et Asia minori.*

745. **Crypsis** Ait.

127. **Crypsis schoenoides** Lam Ill. I. t. 42. f. 1. Kunth Agrost. 22. *Heleochloa schoenoides* Host

Gram. I. t. 30. *Phleum schoenoides* Linn. Spec. 88. Jacq. Icon. rar. I. t. 15. — ⊙ — *Habitat in regione mediterranea, Caucaso et Sibiria.*

128. **Crypsis alopecuroides** Schrad. Germ. I. 167. Kunth. Agrost. 21. *Heleochloa alopecuroides* Host Gram I. t. 29. *Phleum alopecuroides* Pill. et Mitterb. Iter. 147. t. 16. — ⊙ — *Habitat ad paludes Europae calidioris, Orientis et Sibiriae.*

746. **Mibora** Adans.

129. **Mibora verna** Adans. Beauv. Agrost. t. 8. f. 4. *Chammagrostis minima* Borkh. Flor. Ob.Katzenellb. Kunth Agrost. 23. *Sturmia minima* Hoppe in Sturm Flor. Deutschl. fasc. 7. *Knappia verna* Trin. Icon. II. t. 17. *Agrostis minima* Linn. Spec. 93. — ⊙ — *Habitat in arenosis humidis Europae mediae et occidentalis.*

747. **Alopecurus** Linn. Fuchsschwanz.

a. **Alopecurus** Palis.

130. **Alopecurus agrestis** Linn. Spec. 89. Schreber Gram. t. 19 f. 2. E. B. t. 848. Host Gram. III t. 12 Trinius Ic t. 37. Kunth Agrost. 23. — ⊙ — *Habitat in Europa et Caucaso.*

131. **Alopecurus creticus** Trinius in Spreng. N. E. II. 45. et Ic. t 41. *Alopecurus agrestis* Sieber Herb. Cret. — ⊙ — *Habitat in archipelagi graeci insulis.*

132. **Alopecurus geniculatus** Linn. Spec. 89. E. B. t 1250. Host Gram. II. t. 32. Trin. Icon. IV. t. 42. Kunth Agrost. 24. *Alopecurus paniceus* Flor. Dan. t. 861. — ♃ — *Habitat in humidis, ad aquas Europae, Asiae et Americae borealis.*

133. **Alopecurus bulbosus** Linn. Spec. 1665. E. B. t. 1249. Trin. Icon. IV. t. 40. Kunth Agrost. 24. — ♃ — *Habitat in Gallia et Anglia.*

134. **Alopecurus pratensis** Linn. Spec. 88. Schreb Gram. t. 19 f. 1. E. B. t. 759. Host Gram. II. t. 31. Trin Icon. IV. t. 40. Kunth Agrost. 24.

— ♃ — *Habitat in pratis Europae, Asiae et Americae borealis.*

135. **Alopecurus Gerardi** Vill. Delph. II. t. 2. f. 6. Trin Icon. I t. 1. Kunth Agrost. 26. *Phleum Gerardi* All. Flor. Pedem. n. 2135. Jacq. Icon. rar. II. t. 301. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae et australis.*

136. **Alopecurus nigricans** Horn. Hort. Hafn. I 68. Kunth Agrost. 24. *Alopecurus nigrescens* Jacq. Ecl. Gram. II t. 13. *Alopecurus ruthenicus* Weinm. Cat. Hort. Dorpat. 1810. 10. *Alopecurus ventricosus* Pers. Synops. I. 80. — ♃ — *Habitat in Germania et Rossia meridionali.*

b. **Tozzettia** Savi.

137. **Alopecurus utriculatus** Persoon Synops. I. 80. Sibthorp Flor. Graec. t. 63. Trinius Ic. t. 46. Kunth Agrost. 36. *Phalaris utriculata* Linn. Spec. 80. Host Gram. III. t. 6. *Tozzettia utriculata* Savi in Usteri Annal. XXIV. 50. *Tozzettia pratensis* Savi in Mem. Soc. italian. VIII. 2. 477. *Cornucopiae alopecuroides* Linn. Mant. 29. — ⊙ — *Habitat in Europa australi, Anglia et Oriente.*

c. **Colobachne** Palis.

138. **Alopecurus vaginatus** Pall. in Nov. Act. Petrop. X. 304. Kunth Agrost. 25. *Allopecurus Pallasii* Trin. Fundam. 59. Icon. I. t. 2. *Alopecurus angustifolius* Sibth. Flor. Graec. I. t. 64. *Polypogon vaginatus* Willd. in Act. soc. nat. Berol. III. 443. *Colobachne vaginata* Beauv. Agrost. 22. — ♃ — *Habitat in Tauria et Caucaso.*

749. **Beckmannia** Host.

139. **Beckmannia erucaeformis** Host Gram. III. t. 6. Kunth Agrost. 27. *Phalaris crucaeformis* Linn. Spec. 80. *Cynosurus crucaeformis* Aiton Hort. Kew. ed. 1. I. 105. *Paspalum aristatum* Mönch Method. 196. *Joachimia phalaroides* Tenore Flor. neap. 16. t. 5. *Bruchmannia crucaeformis* Nuttall Gen. 1. 48.

— ♃ — *Habitat in Europa australi, Sibiria, Oriente, ad sinum Hudsonis et ad fluvium Missouri Americae borealis.*

750. **Phleum** Linn. Lische.

140. **Phleum tenue** Schrad. Flor. Germ. I. 191. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 488. Kunth Agrost. 28. *Phalaris tenuis* Host Gram. II. t. 36. *Phalaris Bellardi* Willd. in Nov. Act. soc. nat. Berol. III. 415. *Phalaris bulbosa* Linn. Amoen. IV. 264. Spec. 79. *Phalaris cylindrica* DC. Flor. fr. III. 11. *Phalaris sativa* Pers. Syn. I. 78. *Achnodonton tenue et Bellardi* Beauv. Agrost. 24. — ⊙ — *Habitat in siccis Europae australis, Chersonesi tauricae et Orientis.*

141. **Phleum asperum** Vill. Flor. Delph. II. t. 2. f. 4. Jacq. Coll. I. 100. Icon. rar. I. t. 14. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 493. Kunth Agrost. 28. *Phleum paniculatum* Huds. Flor. Angl. 26. E. B. t. 1077. *Phleum viride* All. Pedem. n. 2133. *Phalaris aspera* Retz Observ. IV. 14. Host Gram. II. t. 37. *Chilochloa aspera* Beauv. Agrost. 37. — ⊙ — *Habitat in Europae australis et occidentalis collibus siccis.*

142. **Phleum Boehmeri** Wib. Flor. Werth. 125. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 494. Kunth Agrost. 28. *Phleum laeve* Bieb. Flor. I. 46. *Phleum phalaroides* Koel. Gram. 52. *Phalaris phleoides* Linn. Spec. 80. Host Gram. II. 34. *Cilochloa Boehmeri* Beauv. Agrost. 37. — ♃ — *Habitat in collibus siccis apricis Europae et Sibiriae.*

143. **Phleum Michelii** All. Flor. Pedem. n. 2138. E. B. t. 2265. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 495. Kunth Agrost. 28. *Phleum hirsutum* Sut. Helv. I. 34. *Phalaris alpina* Haenk. in Jacq. Coll. II. 91. Host Gram. II. t. 35. DC. Flor. fr. III. n. 1489. *Phalaris ciliata* Lagasc. Elench. 3. — ♃ — *Habitat in alpibus montibusque Europae calidioris.*

144. **Phleum cuspidatum** Willd. Enum. suppl. 5. Kunth Agrost. 29. *Phleum trigynum* Schrad. in Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 496. *Phleum Hostii* Hort. Vind. *Phalaris trigyna* Host Gram. IV. t. 20.

Chilochloa cuspidata Roem. et Schult. Syst. II. 409. — ♃ — *Habitat in Tyroli meridionali.*

145. **Phleum pratense** Linn. Spec. 87. E. B. t. 1076. Schreb. Gram. I. t. 14. Host Gram. III. t. 9. Trin. Icon. I. t. 6. Kunth Agrost. 29. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, Asiae et Americae borealis.*

β. Nodosum. *Phleum nodosum* Linn. Spec. 88. *Phleum bulbosum* Host Gram. IV. t. 21.

146. **Phleum echinatum** Host Gram III. t. 11. Trin. Icon. I. t. 7. Kunth Agrost. 29. *Phleum felinum* Smith Prodr. Flor. Graec. I. 42. — ⊙ — *Habitat in Dalmatia et insulis Graeciae.*

147. **Phleum alpinum** Linn. Spec. 88. Flor. Dan. t. 213. E. B. t. 519. Host Gram. III. t. 10. Trin. Icon. II. t. 21. Kunth Agrost. 29. *Phleum pratense* Schreb. Gram. III. 103. — ♃ — *Habitat in montanis Europae et Asiae borealis.*

148. **Phleum Bertolonii** DC. Cat. Hort. Monsp. 132. Roem et Schult. Syst. II. 379. Kunth. Agrost. 30. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

149. **Phleum arenarium** Linn. Spec. 88. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 496. Kunth Agrost. 28. *Phalaris arenaria* Willd. Spec. I. 388. E. B. t. 222. *Crypsis arenaria* Desf. Flor. Atl. I. 63. — ⊙ — *Habitat in regione mediterranea.*

753. **Phalaris** Linn. Glanzgras.

a. **Phalaris** Palis.

150. **Phalaris canariensis** Linn. Spec. 79. Host Gram. II. t. 38. Schreb. Gram. I. t. 10. f. 2. E. B. t. 1310. Trin. Icon. VII. t. 74. Kunth Agrost. 31. — ⊙ — *Habitat in insulis Fortunatis; in Europa passim culta.*

Officin. exolet. Semina canariensia.

151. **Phalaris minor** Retz Observ. III. 8. Trin. Icon. VII. t. 79. Kunth Agrost. 32. *Phalaris aquatica* Ait. Hort. Kew. I. 56. Host Gram. II. t. 39. — ⊙ — *Habitat in Europa australi, Aegypto et Capite bonae spei.*

152. **Phalaris angusta** Nees in Mart. Flor. Bras. II. 391. Trin. Icon. VII. t. 78. Kunth Agrost. 32. — ⊙ — *Habitat in Brasilia.*

153. **Phalaris paradoxa** Linn. fil. Dec. t. 18. Schreb. Gram. I. t. 12. Host Gram. II. t. 40. Sibth. Flor. Graec. I. t. 58. Trin. Icon. VII. t. 82. Kunth Agrost. 33. — ♃ — *Habitat in Europa australi et Oriente.*

b. **Digraphis** Trin.

154. **Phalaris arundinacea** Linn. Spec. 80. Flor. Dan. t. 259. Host Gram. II. t. 33. Kunth Agrost. 33. *Arundo colorata* Ait. Hort. Kew. I. 116. E. B. t. 402. *Baldingera colorata* Flor. Wetter. n. 99. *Digraphis arundinacea* Trin. Fund. 127 — ♃ — *Habitat ad aquas Europae, Americae et Asiae borealis.*

β. *Variegata.* Habitat in Japonia.

754. Holcus Linn. Honiggras.

155. **Holcus lanatus** Linn. Spec. 1485. Host Gram. I. t. 2. Schreb. Gram. I. t. 20. f. 1. E. B. t. 1169. Kunth Agrost. 34. *Avena lanata* Koel. Gram. 363. — ♃ — *Habitat in pratis et dumetis Europae et Americae borealis.*

156. **Holcus mollis** Linn. Spec. 1485. Host Gram. I. t. 3. E. B. t. 1170. Schreb. Gram. I. t. 20. f. 2. Kunth Agrost. 35. *Avena mollis* Koel. Gram. 300. — ♃ — *Habitat in siccioribus Europae et Americae borealis.*

755. Hierochloa Gmel. Mariengras.

157. **Hierochloa borealis** Roem. et Schult. Syst. II. 513. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 548. Kunth Agrost. 36. *Hierochloa repens* Beauv. Agrost. 62. *Hierochloa odorata* Wahlb. Flor. Upsal. 32. *Holcus borealis* Schrad. Flor. Germ. I. 252. *Holcus repens* Host Gram. III. t. 3. *Avena odorata* Pers. Synops. I. 100. — ♃ — *Habitat in Europa et Asia boreali.*

158. **Hierochloa australis** Roem. et Schult.

Syst. II. 214. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 549. Kunth Agrost. 36. *Hierochloa odorata* Beauv. Agrost. 62. *Holcus australis* Schrad. Germ. Flor. I. 253. *Holcus odoratus* Schkuhr Handb. II. t. 344. Host Gram. I. t. 4. — ♃ — *Habitat in montanis nemorosis Europae mediae et australis.*

756. **Anthoxanthum** Linn. Ruchgras.

159. **Anthoxanthum odoratum** Linn. Spec. 40. Schreb. Gram. I. t. 5. Host Gram. I. t. 5. E. B. t. 647. Trin. Icon. II. t. 14. — ♃ — *Habitat in Europa, Sibiria et Pensylvania in pratis.*

160. **Anthoxanthum ovatum** Lagasc. Elench. 2. Trin. Icon. II. t. 16. Kunth Agrost. 38. — ☉ — *Habitat in Hispania australi.*

161. **Anthoxanthum amarum** Brot. Phytogr. Lusit. 11. t. 4. Vahl Enum. I. 311. Trin. Gram. II. t. 15. Kunth Agrost. 38. — ♃ — *Habitat in Lusitania.*

Tribus III. Paniceae.

761. **Paspalum** Linn.

162. **Paspalum membranaceum** Lam. Illustr. I. 177. t. 43. f. 2. Flügge Monogr. 57. Kunth Agrost. 41. *Ceresia elegans* Persoon Encheir. I. 85. Jacquin Fragm. t. 86. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

163. **Paspalum stoloniferum** Bosc in Linn. Trans. II. t. 16. Willd. Spec. I. 331. Kunth Agrost. 44. *Paspalum racemosum* Jacq. Coll. Suppl. 32. Ejusd. Icon. rar. II. t. 302. *Milium latifolium* Cav. Icon. III. t. 273. — ♃ — *Habitat in Nova Granada et Peruvia.*

164 **Paspalum inaequale** Link Enum. 103. Kunth Agrost. 48. *Digitaria inaequalis* Sprengel Syst. I. 271. Link Hort. Berol. I. 224. — ☉ — *Habitat in Manilla.*

165. **Paspalum conjugatum** Berg. in Act. Helv. VII. t. 8. Swartz Flor. Ind. occ. I. 133. Humb.

et Kunth Nov. Gener. I. 91. Trin. Icon IX. t. 202. Kunth Agrost. 51. *Panicum tenue* Gaertn. Fruct. II. t. 80. f. 4. — ☉ — *Habitat in America calidiori, insulis Indiae occidentalis et Africa aequinoctiali.*

166. **Paspalum scrobiculatum** Linn. Mant. 29. Flügge Monogr. 86. Trinius Ic. t. 143. Kunth Agrost. 53. — ♃ — *Habitat inter tropicos Asiae, Africae et Novae Hollandiae.*

167. **Paspalum dilatatum** Poiret Dict. V. 35. Kunth Gram. t. 10. Agrost. 60. *Paspalum platense* Spreng. Syst. I. 247. Link Hort Berolin. I. 49. *Paspalum ovatum* Nees Flor. bras. II. 43. Trin. Ic. t. 139. — ♃ — *Habitat in America.*

168. **Paspalum annulatum** Flügge Monogr. 133. Trin. Icon. XII. t. 133. *Eriochloa? annulata* Kunth Gram. I 30. Agrost. 73. *Milium ramosum* Retz Observ. VI. 22. — ♃ — *Habitat in India orientali, Manilla et America australi.*

762. Milium Linn. Flattergras.

169. **Milium effusum** Linn. Spec. 90. E. B. t. 1106. Flor. dan. t. 1143. Host Gram. III. t. 22. Kunth Agrost. 66. — ♃ — *Habitat in Europa et Asia media.*

170. **Milium vernale** Bieb. Flor. I. 53. Kunth Agrost. 66. *Agrostis vernalis* Poir. Encycl. Suppl. I. 259. — ☉ — *Habitat in Tauria et Caucaso.*

770. Panicum Linn. Hirse.

171. **Panicum brizoides** Jacq. Eclog. Gram. I. t. 2. Nees in Martius Flor. Brasil. II. 115. Kunth Agrost. 78. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

172. **Panicum eruciforme** Sibth. Flor. Graec. I. t. 59. Kunth Agrost. 78. — ♃ — *Habitat in insula Samos.*

173. **Panicum horizontale** G. F. W. Meyer Esseq. 54. Kunth Agrost. 81. *Digitaria horizontalis* Willdenow Enum. 92. *Digitaria setigera* Roth Nov.

Spec. 37. Link Hort. Berol. I. 225. —⊙— *Habitat in America tropica.*

174. **Panicum fimbriatum** Kunth Gram. I. 33. Agrost. 81. *Digitaria fimbriata* Link Hort. I. 226. —⊙— *Habitat in Brasilia, Mexico et California.*

175. **Panicum ciliare** Retz Observ. IV. 16. Host Gram. IV. t. 15. Kunth Agrost. 82. *Digitaria ciliaris* Pers. Synops. I. 85. *Paspalum ciliare* DC. Flor. fr. VI. 259. *Syntherisma ciliare* Schrad. Flor. Germ. t. 3. f. 7. —⊙— *Habitat in cultis Europae et Asiae australis, Capitis bonae spei et Novae Hollandiae.*

176. **Panicum eriogonum** Schrader Hort. Götting. 1. Kunth Agrost. 82. *Digitaria eriogona* Link Hort. Berol. I. 227. —⊙— *Patria ignota.*

177. **Panicum sanguinale** Linn. Spec. 84. Schreb. Gram. t. 16. Host Gram. II. t. 17. Trin. Icon. t. 93. 94. Kunth Agrost. 82. *Digitaria sanguinalis* Scop. Flor. Carn. n. 72. *Digitaria marginata* Link Hort. I. 102. *Dactylon sanguinale* Vill. Flor. Delph. II. 69. *Syntherisma vulgare* Schrad. Flor. Germ. I. 161. —⊙— *Habitat in cultis Europae, Asiae et Americae.*

Officin. exolet. Semina Graminis Mannae, s. Graminis sanguinalis.

178. **Panicum aegyptiacum** Retz Observ. III. 8. Kunth Agrost. 83. *Digitaria aegyptiaca* Willd. Enum. 93. *Panicum filiforme* Jacq. Observ. III. t. 70. —⊙— *Habitat in Pannonia, Oriente, Aegypto, America et India orientali.*

179. **Panicum glabrum** Gaudin Agrost. I. 22. Kunth Agrost. 83. *Panicum humifusum* Kunth Gram. I. 33. *Paspalum ambiguum* DC. Flor. fr. n. 1505. *Digitaria humifusa* Pers. Synops. I. 85. *Syntherisma glabrum* Schrad Flor. Germ. I. 163. —⊙— *Habitat in arenosis Europae et Orientis.*

180. **Panicum violascens** Link Hort. I. 229. —⊙— *Habitat in Brasilia.*

181. **Panicum prostratum** Lam. Dict. IV. 740. Trinius Ic. t. 184. 185. Kunth Agrost. 89. *Panicum caespitosum* Swartz Flor. Ind. occid. I. 146.

Panicum Sieberi Link Hort. Berol. I. 207. — ⊙ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

182. **Panicum setigerum** Retz Observ. IV. 15. Roxburgh Flor. ind. I. 302. Kunth Agrost. 90. — ♃ — *Habitat in India orientali, China et insula Mauritii.*

183. **Panicum umbrosum** Retz Observ. IV. 16. Kunth Agrost. 90. *Digitaria umbrosa* Persoon Encheir. I. 85. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

184. **Panicum palmatifolium** Poir. Encycl. Suppl. IV. 282. Kunth Agrost. 93. *Panicum plicatum* Willd. Enum. 1033. Jacq. Eclog. Gram. t. 1. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

185. **Panicum compressum** Bivona-Bern. Stirp. Sicil. n. 35. Link Hort. I. 208. Kunth Agrost. 97. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

186. **Panicum Teneriffae** R. Brown Prodr. 39. Kunth Agrost. 98. *Saccharum Teneriffae* Linn. Suppl. 106. Sibthorp Flor. graec. t. 53. Jacq. f. Eclog. Gram. t. 34. excl. syn. — ♃ — *Habitat in Teneriffa, Sicilia et Graecia.*

187. **Panicum proliferum** Lam. Encycl. IV. 747. Kunth Agrost. 100. *Panicum gongylodes* Jacq. Eclog. Gram. III. t. 21. *Panicum attenuatum* Willd. Enum. 1033. *Panicum dichotomiflorum* Mich. Flor. Bor. Amer. I. 48. — ♃ — *Habitat in America septemtrionali.*

188. **Panicum jumentorum** Pers. Synops. I. 83. Kunth Agrost. 101. *Panicum maximum* Jacq. Collect. I. 76. Icon. rar. I. t. 13. *Panicum polygamum* Swartz Prodr. Flor. Ind. occ. 24. — ♃ — *Habitat in Africa; in America australi cultum.*

β. Laeve. *Panicum laeve* Lam. Ill. I. 172.

189. **Panicum altissimum** DC. in Horn. Hort. Hafn. I. 84. Kunth Agrost. 103. — ⊙ — *Patria?*

190. **Panicum coloratum** Linn. Mant. 30. Jacq. Icon. rar. I. t. 12. Kunth Agrost. 104. *Panicum virgatum* Muehlenb. Desc. 120. — ⊙ — *Habitat in Aegypto, Capite bonae spei et America boreali.*

191. **Panicum miliaceum** Linn. Spec. 86.

Host Gram. II. t. 20. Trin. Icon. t. 221. Kunth Agrost. 104. — Hirse — ⊙ — *Colitur in Europa.*

β. *Aureum.*

Officin. exolet. Semina Milii.

192. **Panicum asperrimum** Lagasc. msc. Link Enum. I. 77. Kunth Agrost. 105. — ⊙ — *Patria?*

193. **Panicum capillare** Gronov. Virgin. 13. Linn. Spec. 86. Kunth Agrost. 114. *Panicum strigosum* Muehlenb. in Ell. Bot. I. 126. — ⊙ — *Habitat in America boreali et australi; in Europam australem introductum.*

776. Melinis Palis.

194. **Melinis minutiflora** Palisot Agrost. 54. t. 11. f. 4. Nees in Martius Flor. Brasil. II. 407. Kunth Agrost. 138. *Tristegis glutinosa* Nees Hor. phys. Berol. 47. t. 7. *Suardia picta* Schrank Hort. Monac. III. t. 58. *Agrostis glutinosa* Fischer msc. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

778. Oplismenus Palis. Grannich.

a. Orthopogon R. Br.

195. **Oplismenus undulatifolius** Roem. et Schult. Syst. II. 482. Kunth Agrost. 139. *Panicum undulatifolium* Arduin. Spec. II. t. 4. Trin. Icon. t. 192. *Panicum hirtellum* Wulf. in Jacq. Coll. I. 263. Host Gram. III. t. 52. — ⊙ — *Habitat in Europa australi.*

b. Echinochloa Palis.

196. **Oplismenus colonus** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 109. Agrost. 142. *Panicum colonum* Linn. Spec. 84. Trinius Ic. t. 160. — ♃ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

197. **Oplismenus Crus Galli** Kunth Gram. I. 44. Agrost. 143. *Panicum Crus Galli* Linn. Spec. 83. E. B. t. 876. Host Gram. II. t. 19. Trin. Icon. XIV. t. 161. *Echinochloa Crus Galli* Palis. Agrost. 53. *Echinochloa Crus Corvi* Beauv. Agrost. 53. — ⊙ — *Habitat per omnem orbem.*

198. **Oplismenus echinatus** Kunth Gram.

I. 45. Agrost. 145. *Panicum echinatum* Willd. Enum. 1032. Jacq. f. Eclog. Gram. 98. t. 20. *Panicum muricatum* Horn. Cat. Hort. Hafn. 28. *Echinochloa echinata* Link Hort. I. 204. —⊙— *Habitat in America.*

199. **Oplismenus frumentaceus** Kunth Gram. I. 45. Agrost. 146. *Panicum frumentaceum* Roxburgh Flor. ind. I 307. Trinius Ic. t. 164. *Echinochloa frumentacea* Link Hort. Berol. I. 204 —♃— *Colitur in India orientali.*

781. **Pennisetum** Rich. Fennich.

a. **Gymnothrix** Palis.

200. **Pennisetum hordeiforme** Spreng. Syst. I. 302. *Cenchrus hordeiformis* Thunb. Prod. 24. *Alopecurus hordeiformis* Linn. Spec. 90. *Panicum hordeiforme* Thunb. Flor. Japon. 46. *Gymnothrix cenchroides* Roem. et Schult. Syst. II 499. Kunth Agrost. 158. —♃— *Habitat in Capite bonae spei, India orientali et insula Mauritii.*

b. **Pennisetum** Palis.

201. **Pennisetum cenchroides** Richard in Persoon Synops. 1. 72. Kunth Agrost. 162. *Cenchrus ciliaris* Linn. Mant. 320. Giesecke Ic. t. 23. —♃— *Habitat in Barbaria, Capite bonae spei et India occidentali.*

202. **Pennisetum purpurascens** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 113. Agrost. 160. *Pennisetum setosum* Richard in Persoon Encheir. I. 72. Trinius Ic. t. 20. *Cenchrus setosus* Swartz Flor. Ind. occid. I. 211. —♃— *Habitat in India occidentali et Mexico.*

c. **Setaria** Palis.

203. **Pennisetum glaucum** R Br. Prodr. Flor. N. Holl. I. 195. Nutt. Gen. I. 45. *Panicum glaucum* Linn. Spec. 83. Schreb. Gram. t. 25. Host Gram. II. t. 16. Trin. Icon. t. 195. *Setaria glauca* Beauv. Agrost. 51. Kunth Agrost. 149 —⊙— *Habitat per totum orbem.*

204. **Pennisetum geniculatum** Jacq. f. Eclog. Gram. t. 27. *Panicum geniculatum* Lam. Encycl. IV. 737. *Setaria geniculata* Roem. et Schult. Syst. II. 491. Kunth Agrost. 150. — ♃ — *Habitat in insulis Antillanis.*

205. **Pennisetum viride** R. Br. Prodr. Flor. N. Holl. I. 195. Nutt. Gen. I. 55. *Panicum viride* Linn. Spec. 83. E. B. t. 875. Host Gram. II. t. 14. Trin. Icon. XVII. t. 203. *Setaria viridis* Beauv. Agrost. 151. Kunth Agrost. 151. — ☉ — *Habitat in cultis Europae, Asiae et Americae borealis.*

206. **Pennisetum scandens** Jacq. f. Index Sem. hort. Vindob. 1801. *Setaria scandens* Schrader in Schultes Mant. II. 279. Link Hort. Berol. I. 216. Kunth Agrost. 151. — ♃ — *Patria ignota.*

207. **Pennisetum macrochaetum** Jacq. f. Eclog. Gram. t. 25. *Panicum macrochaetum* Link Enum. I. 76. *Setaria macrochaeta* Spreng. Syst. I. 305. Kunth Agrost. 152. — ☉ — *Habitat in India orientali.*

208. **Pennisetum verticillatum** R. Br. Prodr. Flor. Nov. Holl. I. 195 *Panicum verticillatum* Linn. Spec. 82. E. B. t. 874 Host Gram. II. t. 13. Trin. Icon. XVII. t. 202. *Setaria verticillata* Beauv. Agrost. 51. Kunth Agrost. 152. — ☉ — *Habitat in Europae, Asiae, Americae borealis cultis.*

209. **Pennisetum italicum** R. Br. Prodr. Flor N. Holl. I. 195 *Panicum italicum* Linn. Sp. 83. Host Gram. IV. t. 14. Trin. Icon. XVII t. 198. *Setaria italica* Kunth Gram. I. 46. Agrost. 153. — ☉ — *Habitat in Europa, India utraque et Nova Hollandia.*

β. *Maritimum. Setaria maritima* Roem. et Schult. Syst. II. 492. *Panicum sibiricum* Hort.

γ. *Germanicum. Setaria germanica* Roem. et Schult. Syst. II. 492. *Panicum germanicum* Roth. Tent. Flor. Germ. II. 71. Host Gram. II. t. 17.

782. **Penicillaria** Swartz. Pinselgras.

210. **Penicillaria spicata** Willd. Enum. 1037. Jacq. f. Eclog. Gram. t. 17. Beauv. Agrost. t. 13. f. 4. Kunth Agrost. 165. *Holcus spicatus* Linn. Spec.

1483. *Panicum spicatum* Roxb. Flor. Ind. I. 268. — ⊙ — *Habitat in India orientali.*

β. *Gigantea.*

211. **Penicillaria Plukenetii** Link Hort. Berol. I. 221. — ⊙ — *Habitat in India orientali.*

783. Cenchrus Linn.

212. **Cenchrus echinatus** Linn. Spec. 1488. Schreb. Gram. t. 23 f. 1. Cav. Icon. V. t. 462. Humb. et Kunth Nov. Gen. I. 114. Kunth. Agrost. 166. — ⊙ — *Habitat in America calidiori, Barbaria et Luzonia.*

213. **Cenchrus tribuloides** Linn. Spec. 1489. Vahl Enum. II. 394. Kunth Agrost. 166. *Cenchrus spinifex* Cav. Icon. V. t. 461. *Cenchrus carolinianus* Walt. Flor. Car. 79. — ⊙ — *Habitat in America boreali et australi.*

785. Anthephora Schreb.

214. **Anthephora elegans** Schreber Gram. II. 105. t. 44. Palisot Agrost. 58. t. 13. f. 8. Kunth Agrost. 169. *Tripsacum hermaphroditum* Linn. f. Decad. 17. t. 9. *Colladoa monostachya* Persoon Encheir. I. 107. *Cenchrus laevigatus* Trinius Fund. 172. — ⊙ — *Habitat in Jamaica et Mexico.*

β. *Villosa. Anthephora villosa* Sprengel N. Entd. III. 14. Nees in Martius Flor. Brasil. II. 290. *Cenchrus villosus* Sprengel Syst. I. 301.

786. Lappago Schreb.

215. **Lappago racemosa** Willd. Spec. I, 484. Host Gram. I. t. 36. Sibth. Flor. Graec. II. t. 101. Kunth Agrost. 170. *Cenchrus racemosus* Linn. Spec. 1487. Schreb. Gram. t. 4. *Tragus racemosus* Hall. Helv. n. 1413. Desf. Flor. Atl. II. 386. DC. Flor. fr. II. 202. — ⊙ — *Habitat in Europa calidiore, Asia, Africa et America.*

Tribus IV. Stipaceae.

794. **Piptatherum** Palis.

216. **Piptatherum caerulescens** Palisot Agrost. 18. t. 5. f. 10. Kunth Agrost. 176. *Milium caerulescens* Schousboe Marocc. I. 34. Desfont. Flor. Atlant. 1. 66. t. 12. *Agrostis caerulescens* DC. Flor. fr. Suppl. 250. *Urachne caerulescens* Trinius Gram. unifl. 172. Link Hort. Berol. I. 93. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea et Atlante.*

217. **Piptatherum paradoxum** Palisot Agrost. 18. Kunth Agrost. 177. *Milium paradoxum* Linn. Spec. 90. Scopoli Flor. Carn. ed. 2. t. 1. Schreber Gram. I. t. 28. Host Gram. III. t. 23. *Agrostis paradoxa* Linn. Spec. edit. 1. 62. *Oryzopsis paradoxa* Nuttall in Journ. Academ. Philadelph. I. 125. *Urachne virescens* Trinius Gram. unifl. 173. Link Hort. Berol. I. 92. — ♃ — *Habitat in Europa australiore et Caucaso.*

218. **Piptatherum multiflorum** Palisot Agrost. 18. Kunth Agrost. 177. *Milium multiflorum* Cavanill. Demonstr. 36. *Agrostis miliacea* Linn. Spec. 91. Host Gram. III. t. 45. *Urachne parviflora* Trinius Gram. unifl. 173. *Urachne multiflora* Link Hort. Berol. I. 93. — ♃ — *Habitat in Europa australiore et Asia media.*

795. **Lasiagrostis** Link.

219. **Lasiagrostis Calamagrostis** Link Hort. I. 99. Kunth Agrost. 178. *Calamagrostis argentea* DC. Flor. fr. III. 25. *Calamagrostis speciosa* Host Gram. IV t. 45. *Stipa Calamagrostis* Wahlenb. Flor. Helv. 25. Trin. Gram. uniflor. 183. *Arundo speciosa* Schrad. Flor. Germ. I. t. 5. f. 8. *Agrostis Calamagrostis* Linn. Spec. 92. *Agrostis stipata* Koel. Gram. 77. — ♃ — *Habitat in Europa calidiore.*

798. **Stipa** Linn. Pfriemengras.

220. **Stipa pennata** Linn. spec. 115. E. B. t.

1356. Host Gram. IV. t. 33. Kunth Agrost. 179. — ♃ — *Habitat in collibus siccis Europae et Sibiriae.*

221. **Stipa juncea** Linn. Spec. 116. Sibth. Flor. Graec. I. 67. t. 85. Kunth Agrost. 179. — ♃ — *Habitat in aridis Europae meridionalis.*

222. **Stipa capillata** Linn. Spec. 116. Host Gram. III. t. 5. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 532. Kunth Agrost. 180. — ♃ — *Habitat in collibus Europae calidioris, Caucasi et Sibiriae.*

223. **Stipa gigantea** Lagasc. Elench. 3. Trin. Act. Petrop. 1830. I. 81. Kunth Agrost. 180. — ♃ — *Habitat in Hispania.*

224. **Stipa altaica** Trin. in Ledeb. Icon. t. 222. Ledeb. Flor. Altaic. I. 80. Kunth Agrost. 184. — ♃ — *Habitat in Sibiria altaica.*

225. **Stipa splendens** Trin. in Spreng. N. Entd. II. 54. Idem in Act. Petrop. 1830. I. 76. *Lasiagrostis? splendens* Kunth Agrost. 178. — ♃ — *Habitat in Sibiria baicalensi.*

226. **Stipa tortilis** Desf. Atl. I. t. 31. f. 1. Kunth Agrost. 180. *Stipa paleacea* Smith Prodr. Flor. Graec. I. 65. Sibth. Flor. Graec. I. t. 86. — ⊙ — *Habitat in Europa australi, Africa boreali et Capite bonae spei.*

227. **Stipa sibirica** Lam Ill. I. 158. Ledeb. Icon. plant. Ross. ill. t. 99. Flor. Altaic. I. 83. Kunth Agrost. 185. *Avena sibirica* Linn. Spec. 117. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

Tribus V. Agrostideae.

803. **Muehlenbergia** Schreb.

228. **Muehlenbergia diffusa** Willd. Spec. I. 320. Schreb. Gram. II. t. 51. Trin. Gram. uniflor. 188. Kunth Agrost. 200. *Dilepyrum minutiflorum* Mich. Flor. Bor. Amer. I. 40. *Dilepyrum diffusum et multiflorum* Beauv. — ♃ — *Habitat in Pensylvania et Virginia.*

229. **Muehlenbergia Willdenowii** Trin.

Gram. uniflor. t. 5. f. 3. *Achnantherum tenuifolium* Beauv. Agrost. 146. *Podosaemum tenuiflorum* Link Hort. I. 82. *Cinna tenuiflora* Link Enum. I. 71. *Trichochloa longiseta* Trin. Fundam. 117. *Agrostis tenuiflora* Willd. Spec. I. 364. Hort. Berol. t. 12. Enum. 95. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

808. **Cinna** Linn.

230. **Cinna mexicana** Link Enum. 1. 71. Kunth Agrost. 206. *Agrostis mexicana* Linn. Mant. 31. *Agrostis Cinna* Retz Observ. V. 18. *Trichochloa mexicana* Trinius Fundam. 117. *Podosaemum mexicanum* Link Hort. Berol. I. 84. *Mühlenbergia mexicana* Trinius Unifl. 189. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

231. **Cinna sobolifera** Link Enum. I. 71. *Agrostis sobolifera* Mühlenb. in Willd. Enum. 95. *Trichochloa sobolifera* Trinius Fund. 20. *Mühlenbergia sobolifera* Trinius Unifl. 189. *Podosaemum soboliferum* Link Hort. Berol. 1. 83. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

232. **Cinna filiformis** Link Enum. I. 70. Kunth Agrost. 207. *Muehlenbergia foliosa* Trin. Gram. uniflor. 190. *Trichochloa foliosa* Trin. Fund. 117. *Podosaemum foliosum* Link Hort. I. 83. *Agrostis filiformis* Willd. Enum. 95. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

809. **Sporobolus** R. Br.

233. **Sporobolus humifusus** Kunth Gram. I. 67. Agrost. 210. *Vilfa humifusa* Humb. et Kunth Nov. Gen. I. 137. *Agrostis humifusa* Roem. et Schult. Syst. II. 361. — ♃ — *Habitat in Cumana.*

234. **Sporobolus virginicus** Kunth Gram. I. 67. Agrost. 210. *Podosaemum virginicum* Link Hort. I. 85. *Vilfa virginica* Beauv. Agrost. 16. Trin. Icon. IV. t. 48. *Agrostis virginica* Linn. Spec. 34. Labill. Plant. Nov. Holl. I. t. 23. R. Br. Prodr. Flor. Nov. Holl. I. 170. — ♃ — *Habitat in America meridionali, Virginia, Capite bonae spei et Australasia.*

235. **Sporobolus tenacissimus** Palisot

Agrost. 26. Link Enum. I. 71. Kunth Agrost. 211. *Vilfa tenacissima* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 138. Trinius Ic. t. 60. *Agrostis tenacissima* Jacq. Collect. I. 85. Ic. rar. t. 26. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

236. **Sporobolus diander** Palisot Agrost. 26. Kunth Agrost. 213. *Vilfa diandra* Trinius Uniflor. 154. *Agrostis diandra* Retz. Observ. V. 19. Willdenow Spec. I. 371. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

237. **Sporobolus minutiflorus** Link Hort. Berol. I. 88. Kunth Agrost. 214. *Panicum tenuissimum* Martius ex Regensb. Denkschrift. III. 13. *Vilfa minutiflora* Trinius Unifl. 158. *Agrosticula muralis* Raddi Agrost. 33. t. 1. f. 2. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

810. **Agrostis** Linn. Straufsgras.

a. **Agrostis** Trin.

238. **Agrostis alba** Schrad. Flor. Germ. I. 209. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 508. Kunth Agrost. 219. *Agrostis stolonifera* Linn. Flor. Suec. n. 66. Flor. Dan. t. 564. *Agrostis diffusa et sylvatica* Host Gram. IV. t. 55. 58. — ♃ — *Habitat in pratis ad aquas Europae, Sibiriae et Sinus Nootka.*

α. Alba. Agrostis alba Linn. Spec. 93. *Agrostis stolonifera.* Host Gram. IV. t. 56.

β. Varia. Agrostis varia Host Gram. IV. t. 57. fig. sinistr.

239. **Agrostis stolonifera** Linn. herb. Smith. Brit. I. 80. Kunth Agrost. 219. *Agrostis verticillata* Vill. Delph. 74. Trin. Unifl. 195. Ejusd. Icon. III. t. 36. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

240. **Agrostis vulgaris** With. Brit. ed. 3. 132. Smith Brit. I. 79. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 505. Kunth Agrost. 220. *Agrostis frondosa* Tenore in Spreng. Pugill. II. 5. *Agrostis stolonifera* Poll. Pal. n. 71. Roth Germ. I. 32. — ♃ — *Habitat in pratis Europae et insulae St. Helenae.*

β. Rubra Agrostis rubra Linn. Spec. 92. *Agrostis decumbens* Host Gram. IV. t. 31.

5. Anemagrostis Trin.

241. **Agrostis Spica venti** Linn. Spec. 91. E. B. t. 951. Flor. dan. t. 853. Host Gram. III. t. 47. Kunth Agrost. 225. *Anemagrostis Spica venti* Trinius Fundam. 129 Gram. unifl. 215. *Apera Spica venti* Palisot Agrost. 31. — ⊙ — *Habitat in Europa et Sibiria.*

242 **Agrostis interrupta** Linn. Spec. 92. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 504. Kunth Agrost. 225. *Anemagrostis interrupta* Trin. Fundam. 118. Gram. unifl. 215. — ⊙ — *Habitat in Europa calidiore.*

243. **Agrostis tenuifolia** Bieb. Flor. I. 56. Trinius Gram. unifl. 205. Icon. II. t. 35. Kunth Agrost. 220. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

244. **Agrostis alpina** Scop. Carn. 60. DC. Flor. fr. III. 20. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 515. *Agrostis rupestris* Willd. Spec. I. 368. Host Gram. III. t. 50. *Trichodium rupestre* Schrad. Flor. Germ. I. 279. t. 3. f. 5. *Agrostis flavescens* Host Gram. IV. t. 52. *Avena aurata* All. Pedem. II. 255. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae.*

245. **Agrostis dispar** Mich. Flor. Bor. Amer. I. 52. Kunth Agrost. 224. *Trichodium elatum* Pursh Flor. Bor. Amer. I. 61. *Cornucopiae altissimum* Walt. Flor. Carol. 74. *Vilfa dispar* Beauv. Agrost. 16. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

246. **Agrostis Michauxii** Zucc. Cent. n. 22. Roem Coll. 123. Kunth Agrost. 229. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

811. Gastridium Palis. Linsengras.

247. **Gastridium australe** Beauv. Agrost. t. 6. f. 6. Roem. et Schult. Syst. I. 250. Trin. Gram. unifl. 168. Kunth Agrost. 230. *Milium lendigerum* Linn. Spec 91. Schreb. Gram. III. t. 24. Sibth. Flor. Graec. I. t. 65, Host Gram III. t. 24. *Agrostis australis* Linn. Mant. I. 30. *Agrostis panicea* Lam. Ill. n. 811. *Calamagrostis Schwabii* Spreng. Syst. I. 253. *Arundo Schwabii* Schult. Mant. III. 603. — ⊙ — *Habitat ad mare mediterraneum et in Chili.*

813. **Polypogon** Desf.

248. **Polypogon monspeliensis** Desf. Flor. Atl. I. 66. Willd. in Nov. Act. Soc. nat. cur. Berol. III. 442. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 497. Kunth Agrost. 232. *Alopecurus monspeliensis* Linn. Spec. 89. *Agrostis panicea* Willd. Spec. I. 128. *Phleum crinitum* Schreb. Gram. I. t. 20. Sibth. Flor. Graec. I. t. 62. *Phleum monspeliense* Koel. Gram. 57. — ⊙ — *Habitat in Europa mediterranea, Africa et Montevideo.*

249. **Polypogon maritimus** Willd. in Nov. Act. Soc. nat. cur. Berol. III. 443. DC. Cat. hort. Monsp. 134. Kunth Agrost. 233. *Polypogon tataricus* Fisch. Cat. 1812. 3. Bieb. Flor. Suppl. *Alopecurus paniceus* Linn. Spec. 90. — ⊙ — *Habitat in Europa mediterranea, Sibiria et India orientali.*

814. **Chaeturus** Link.

250. **Chaeturus fasciculatus** Link in Schrad. Journ. 1799. II. 313. Hort. I. 106. Trin. Gram. uniflor. 172. Kunth Agrost. 235. *Polypogon subspicatus* Willd. in Nov. Act. Soc. nat. Berol. III. 443. *Polypogon fasciculatus* Pers. Synops. I. 80. *Agrostis articulata* Brot. Flor. Lusit. I. 73. — ⊙ — *Habitat in Hispania, Lusitania.*

Tribus VI. Arundinaceae.

817. **Calamagrostis** Adans. Schilf.

251. **Calamagrostis littorea** DC. Flor. fr. VI. 255. Kunth Agrost. 237. *Calamagrostis laxa* Host Gram. IV. t. 43. *Calamagrostis glauca* Reichenb. Flor. exc. 27. *Arundo littorea* Schrad. Flor. Germ. I. t. 4. f. 2. *Arundo glauca* Bieb. Flor. I. 79. — ♃ — *Habitat ad fluvios Europae calidioris et Americae borealis.*

Radix diuretica.

252. **Calamagrostis epigeios** Roth Tent. Flor. Germ. II. 91. Host Gram. IV. t. 42. *Arundo epigeios* Linn. Spec. 120. E. B. t. 402. Mertens et Koch

Flor. Deutschl. I. 520. — ♃ — *Habitat ad aquas, paludes Europae et Sibiriae.*

253. **Calamagrostis Halleriana** DC. Flor. fr. Suppl. 256. Kunth Agrost. 238. *Calamagrostis varia* Host Gram. IV. t. 47. *Arundo Halleriana* Gaud. Agrost. I. 97. *Arundo Pseudo-Phragmites* Schrad. Flor. Germ. I. t. 4. f. 3. — ♃ — *Habitat in Germania, Helvetia et Sibiria.*

818. Deyeuxia Clar. Bergschilf.

254. **Deyeuxia montana** Poir. Ill. Suppl. t. 907. *Deyeuxia varia* Kunth Gram. I. 76. Agrost. 242. *Calamagrostis montana* Host Gram. IV. t. 46. *Arundo montana* Gaud. Agrost. I. 91. *Arundo varia* Schrad. Flor. Germ. t. 4. f 6. — ♃ — *Habitat in montanis Europae, Caucasi et Sibiriae.*

β. *Hostii. Calamagrostis sylvatica* Host Gram. IV. t. 48.

255. **Deyeuxia confinis** Kunth Gram. I. 76. Agrost. 243. *Calamagrostis confinis* Nutt. Gen. I. 46. *Arundo confinis* Willd. Enum. 127. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

256. **Deyeuxia acutiflora** Beauv. Agrost. 44. Kunth Agrost. 243. *Calamagrostis acutiflora* DC. Flor. fr. Suppl. 255. *Calamagrostis subulata* Dumort. Agrost. t. 9. f. 36. *Arundo acutiflora* Schrad. Flor. Germ. I. 217. — ♃ — *Habitat in Germania australi et Gallia.*

257. **Deyeuxia Langsdorffii** Kunth Gram. I. 77. Agrost. 243. *Calamagrostis Langsdorffii* Trin. Gram. uniflor. t. 4. f. 10. *Arundo Langsdorffii* Link Enum. I. 74. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

258. **Deyeuxia sylvatica** Kunth Gram. I. 77. Agrost. 243. *Calamagrostis sylvatica* DC. Flor. fr. Suppl. 253. *Calamagrostis pyramidalis* Host Gram. IV. t. 49. *Arundo sylvatica* Schrad. Flor. Germ. I. t. 4. f. 7. *Agrostis arundinacea* Linn. Spec. 91. — ♃ — *Habitat in sylvaticis subhumidis Europae et Sibiriae.*

259. **Deyeuxia aemula** Kunth Gram. I. 77. Agrost. 245. *Agrostis aemula* R. Brown Prodr. 245. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

821. **Arundo** Linn. Pfahlrohr.

260. **Arundo Donax** Linn. Spec. 120. Host Gram. IV. t. 38. DC. Flor. fr. III. 45. Kunth Agrost. 246. *Donax arundinaceus* Beauv. Agrost t. 16 et 19 *Scolochloa arundinacea* Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 529. — ♃ — *Habitat in Europa australi, Caucaso, Sibiria et Aegypto.*

β. *Variegata. Arundo versicolor* Mill dict. n. 3. *Officin. exolet.* Radix Donacis.

822. **Ampelodesmos** Link. Rebenrohr.

261. **Ampelodesmos tenax** Link Hort. I. 136. Kunth Agrost. 249. *Arundo Ampelodesmos* Cyrill. Neapol. II. t. 12. *Arundo tenax* Vahl Symb. II. 25. *Arundo mauritanica* Poir. Iter ed. Germ. II. 148. *Arundo festucoides* Desf. Flor. Atl. I. t. 34. *Donax tenax* Beauv. Agrost. 78. — ♃ — *Habitat in Africa boreali.*

824. **Phragmites** Trin. Rohr.

262. **Phragmites communis** Trin. Fundam. 134. Ledeb. Flor. Alt. I. 88. Kunth Agrost. 251. *Arundo Phragmites* Linn. Spec. 120. E. B. t. 401. Host Gram. IV. t. 39. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 528. *Czernya arundinacea* Presl Cyper. et Gram. Sicul. 22. — ♃ — *Habitat in aquis et palustribus Europae, Asiae, Americae et Novae Hollandiae.*

Officin. exolet. Radix Arundinis.

Tribus VII. Pappophoreae.

832. **Echinaria** Desf.

263. **Echinaria capitata** Desf. Atl. II. 385. Pers. Syn. I. 71. Kunth Agrost. 257. *Sessleria echinata* Host Gram. III. t. 8. *Cenchrus capitatus* Linn. Spec. 1488. Sibth. Flor Graec. I t. 100 *Panicastrella capitata* Mönch Meth. 206. — ☉ — *Habitat in Europa et Africa mediterranea.*

Tribus VIII. Chlorideae.

836. Cynodon Rich. Hundsgras.

264. **Cynodon Dactylon** Pers. Syn. I. 85. Kunth Agrost. 259. *Panicum Dactylon* Linn. Spec. I. 342. E. B. t. 850. Host Gram. II. t. 18. *Digitaria stolonifera* Schrad. Flor. Germ. I. t. 3. f. 9. *Paspalum umbellatum* Lam. Ill. I. 177. *Agrostis linearis* Retz Observ. IV. 19. *Chloris maritima* Trin. Gram. uniflor. 236. — ♃ — *Habitat in temperatis et calidis totius orbis.*

Var. β. *Lineare. Panicum lineare* Burm. Flor. ind. 25. t. 10. f. 2. Hujus speciei rhizoma in officinis Europae australioris nomine » Radicis Graminis « prostat.

837. Dactyloctenium Willd. Fingergras.

265. **Dactyloctenium aegyptiacum** Willdenow Enum. II. 1029. Kunth Agrost. 261. *Cynosurus aegyptius* Linn. Spec. 106. *Eleusine aegyptiaca* Persoon Encheir. I. 82. *Eleusine cruciata* Lam. Ill. t. 48. f. 2. — ⊙ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

266. **Dactyloctenium aristatum** Link Hort. Berol. I. 59. Kunth Agrost. 262. — ⊙ — *Habitat in Aegypto.*

839. Chloris Swartz.

267. **Chloris submutica** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 167. t. 50. Agrost. 263. *Eustachys submutica* Römer et Schultes Syst. II. 614. — ⊙ — *Habitat in Mexico et Brasilia.*

268. **Chloris ciliata** Swartz Flor. Ind. occid. I. 197. Nees in Mart. Flor. Brasil. II. 422. Kunth Agrost. 263. — ⊙ — *Habitat in India occidentali, Brasilia et Mexico.*

269. **Chloris polydactyla** Swartz Flor. Ind. occid. I. 99. Jacq. f. Eclog. Gram. t. 9. Kunth Agrost. 264. *Andropogon polydactylum* Linn. Spec. 1483. — ⊙ — *Habitat in America tropica.*

270. **Chloris barbata** Swartz Flor. Ind. occid.

I. 200. Jacq. f. Eclog. Gram. t. 8. Kunth Agrost. 264. *Andropogon barbatum* Linn. Mant. 302. — ⊙ — *Habitat in Asia tropica.*

271. **Chloris truncata** R. Brown Prodr. 186. Kunth Gram. t. 178. Agrost. 266. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia, insulis Philippinis et Timor.*

272. **Chloris Gayana** Kunth Gram. I. 89. 293. t. 58. Agrost. 267. — ♃ — *Habitat in Senegambia.*

273. **Chloris penicillata** Persoon Encheir. I. 87. Kunth Agrost. 268. *Cynosurus penicillatus* Vahl Symb. II 21. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

274. **Chloris gracilis** Durand Chlor. 10. Jacq. f. Eclog. t. 10. Kunth Agrost. 268. *Chloris durandiana* Schultes Mant. II. 341. — ⊙ — *Habitat in Panama.*

840. Leptochloa Palis.

275. **Leptochloa domingensis** Link Enum. I. 103. Trin. Fundam. 133. Nees in Mart. Flor. Brasil. II. 434. Kunth Agrost. 269. *Rabdochloa domingensis* Beauv. Agrost. 84. *Eleusine domingensis* Pers. Encheir. I. 87. *Leptostachys domingensis* Mey. Flor. Esseq. 74. *Cynosurus domingensis* Jacq. Icon. rar. I. 22. Miscell. II. 363. — ♃. — *Habitat in insulis Indiae orientalis et Mexico.*

276. **Leptochloa mucronata** Kunth Gram. 1. 91. Agrost. 270. *Eleusine mucronata* Michaux Flor. Bor. Am. I. 65. *Oxydenia attenuata* Nuttall Gen. Bor. Amer I. 76. — ⊙ — *Habitat in America boreali.*

277. **Leptochloa filiformis** Römer et Schultes Syst. II. 580. Kunth Agrost 270. *Eleusine filiformis* Persoon Encheir. I. 87. Jacq. f. Eclog. Gram. t. 4. *Leptostachys filiformis* Meyer Esseq. 74. *Oxydenia filiformis* Nnttall Gen. I. 76 — ⊙ — *Habitat in America tropica.*

278. **Leptochloa arabica** Kunth Gram. 1. 91. Agrost. 271. *Dinebra arabica* Jacq. Fragm. 77. t. 121. f. 1. Delile Aegypt. t. 11. f. 3. *Dactylis paspaloides* Willdenow Enum. 111. *Cynosurus retroflexus* Vahl Symb. II. 20. — ⊙ — *Habitat in Aegypto, Seneganbia, Arabia et India orientali.*

841. **Eleusine** Gärtn.

279. **Eleusine indica** Gaertner Carp. 1. 8. Lam. Ill. t. 48. f. 3. Trinius Ic. t. 71. Kunth Agrost. 272. *Cynosurus indicus* Linn. Spec. 106. — ⊙ — *Habitat inter tropicos totius orbis et in America boreali.*

280. **Eleusine Tocusso** Fresenius Index sem. hort. Francof. 1834. Mus. Senkenb. II. 141. — ⊙ — *Habitat in Abyssinia, ubi sub nomine Tocusso passim colitur.*

281. **Eleusine coracana** Gärtner Carp. I. 8. t. 1. f. 11. Roxburgh Flor. ind. I. 343. Trinius Ic. t. 70. Kunth Agrost. 273. *Cynosurus coracanus* Linn. Spec. 107. Schreber Gram. II. t. 35. — ⊙ — *Habitat in India orientali et Japonia.*

Semina esculenta. Decoctum seminum apud plebem Indiae multae in Cholera laudis.

282. **Eleusine rigida** Spreng. Cur. post. 36. Kunth Agrost. 273. *Cynosurus rigidus* Hort. Berolin. — ⊙ — *Patria ignota.*

846. **Spartina** Schreb.

283. **Spartina cynosuroides** Willd. Enum. 80. Roth. Cat. bot. III. 11. Kunth Agrost. 278. *Limnetis cynosuroides* Rich. in Pers. Syn. I. 72. *Trachynotia cynosuroides* Mich. Flor. Bor. Amer. I. 64. *Dactylis cynosuroides* Linn. Spec. 104. Linn. Fil. Fasc. I. t. 9. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

Tribus IX. Avenaceae.

857. **Deschampsia** Palis.

284. **Deschampsia caespitosa** Beauv. Agrost. t. 18. f. 3. Roem. et Schult Syst. II. 685. Kunth Agrost. 286. *Aira caespitosa* Linn. Spec. 96. Host Gram. II. t. 42. Flor. Dan. t. 240. *Campelia caespitosa* Link Hort. I. 122. — ♃ — *Habitat in Europa et Asia boreali.*

285. **Deschampsia juncea** Beauv. Agrost. 91. Kunth Agrost. 287. *Deschampsia juncea et media*

Roem. et Schult. Syst. II. 687. *Aira juncea* Vill. Flor. Delph. II. 86. *Aira media* Gouan. Ill. 3. Trin. in Act. Petrop. 1830. I. 57. *Schismus Villarsi et Gouani* Trin. Fund. 148. — ♃ — *Habitat in Gallia, Polonia et America boreali.*

859. **Aira** Linn. Schmele.

286. **Aira pulchella** Willd. Enum. 101. Trin. in Act. Petrop. 1830 I. 57. Kunth Agrost. 289. *Avena pulchella* Beauv. Agrost. 89. *Aira Tenorei* Gussone. Trin. l. c. 356. — ⨀ — *Habitat in Europa australi et Tauria.*

287. **Aira flexuosa** Linn. Spec. 96. Host Gram. II t. 43. Schreb. Gram. II. t. 30. E. B. t. 1519. Kunth Agrost. 290. *Avena flexuosa* Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 570 *Aira montana* Koel. Gram. 131. Flor. Dan. t. 1322. *Aira discolor* Thuill. Flor. Paris I. 39. *Deschampsia discolor* Roem. et Schult. Syst. II. 686. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Europae, Caucasi et Americae borealis.*

288. **Aira atropurpurea** Wahlenb. Flor. Lapp. 37. Kunth Agrost. 291. *Aira alpina* Vahl in Flor. Dan. t. 961. *Avena atropurpurea* Link Hort. I. 119. — *Habitat in Lapponia.*

289. **Aira brevifolia** Pursh Flor. Bor. Amer. I. 76. Spreng. Syst. I. 276. Kunth Agrost. 292. *Airopsis brevifolia* Roem. et Schult. Syst. II. 578. — ♃ — *Habitat ad Missuri.*

862. **Lagurus** Linn. Hasenschwanz.

290. **Lagurus ovatus** Linn. Spec. 119 Schreb. Gram. t. 19. f. 3. Host Gram. II. t. 46. Sibth. Flor. Graec. I. t. 90. E. B. t. 1334. Kunth Agrost. 295. — ⨀ — *Habitat in collibus siccis Europae australis et occidentalis, nec non Asiae.*

863. **Trisetum** Kunth.

291. **Trisetum pumilum** Kunth Gram. I. 102. Agrost. 297. *Avena pumila* Desf. Flor. Atl. I. 103. — ⨀ — *Habitat in Barbaria.*

292. **Trisetum rigidum** Roem. et Schult. Syst. II. 662. Trin. in Act. Potropol. 1830. I. 60. *Avena rigida* Bieb. Flor. I. 77. *Avena brevifolia* Spreng. Syst. I. 334. *Arundo Wilhelmi* Ledeb. in Act. Petrop. 593. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

293. **Trisetum argentum** Roem. et Schult. Syst. II. 665. Kunth Agrost. 298. *Avena argentea* Willd. Enum. 125, *Avena distichophylla* Host Gram. II. t. 53. *Avena disticha* Lam. Encycl. I. 330. — ♃ — *Habitat in alpibus Tyrolis, Helvetiae, Carinthiae, Carnioliae.*

294. **Trisetum distichophyllum** Beauv. Agrost. 88. Kunth Agrost. 298. *Trisetum brevifolium* Roem. et Schult. Syst. II. 665. *Avena distichophylla* Vill. Flor. Delph. II. t. 4. f. 4. *Avena brevifolia* Host Gram. III. t. 40. — ♃ — *Habitat in alpibus Tyrolis, Vallesiae et Delphinatus.*

295. **Trisetum flavescens** Beauv. Agrost. 88. Roem. et Schult. Syst. II. 663. Kunth Agrost. 298. *Avena flavescens* Linn. Spec. 118. Schreb. Gram. I. t. 9. Host Gram. III. t. 38. E. B. t. 952. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, Asiae et Americae borealis.*

296. **Trisetum alpestre** Beauv. Agrost. 299. Trin. in Act. Petropol. 1830. I. 61. *Avena alpestris* Host Gram. III. t. 39. Kunth Agrost. 299. — ♃ — *Habitat in alpibus Austriae, Styriae.*

297. **Trisetum tenue** Roem. et Schult. Syst. II. 657. Trin. in Act. Petrop. 1830. I. 62. Kunth Agrost. 298. *Trisetum striatum* Pers. Synops. I. 97. *Avena tenuis* Mönch Method. 195. Host Gram. II. t. 55. *Avena dubia* Leers Flor. Herborn. t. 9. f. 3. *Ventenatia bromoides et avenacea* Koel. Gram. 273. 274. *Bromus triflorus* Poll. Flor. Palat. n. 119. — ⊙ — *Habitat in collibus apricis Europae calidioris et Iberiae.*

864. **Avena** Linn. Hafer.

298. **Avena brevis** Roth Flor. Germ. I. 40. II. 108. Host Gram. III. t. 42. Kunth Agrost. 301. — ⊙ — *Habitat in Europa media.*

299. **Avena sativa** Linn. Spec. 118. Host Gram. II. t. 59. Kunth Agrost. 301. — ⊙ — *Colitur passim in Europa.*

β. *Nigra.*

300. **Avena orientalis** Schreber Spicileg. 52. Host Gram. III. t. 44. Kunth Agrost. 302. — ⊙ — *Colitur in Europa media et australi.*

301. **Avena strigosa** Schreber Spicileg. 52. Host Gram. II. t. 56. E. B. t. 1266. Kunth Agrost. 302. — ⊙ — *Habitat in Europa.*

302. **Avena nuda** Linn. Spec. 118. Host Gram. III. t. 43. Link Hort. Berol. I. 110. Kunth Agrost. 302. — ⊙ — *Culta in Europa.*

303. **Avena fatua** Linn. Spec. 118. Schreber Gram. I. t. 15. Host Gram. II. t. 58. Flor. dan. t. 1629. E. B. t. 2221. Kunth Agrost. 302. — ⊙ — *Crescit in agris sterilibus et inter segetes macras Europae et Caucasi.*

304. **Avena hirsuta** Roth Catalect. III. 19. Kunth Agrost. 302. — ⊙ — *Habitat in Europa mediterranea et Caucaso.*

305. **Avena sterilis** Linn. Spec. 118. Jacq. Ic. rar. t. 23. Host Gram. II. t. 57. Kunth Agrost. 303. — ⊙ — *Habitat inter segetes Europae australis.*

β. *Alba.*

306. **Avena fragilis** Linn. Mant. 326. Schreber Gram. t. 24. f. 3. Host Gram. II. t. 54. Sibthorp Flor. Graec. t. 88. Kunth Agrost. 303. *Gaudinia fragilis* Palisot Agrost. 95. t. 19 f. 5. — ⊙ — *Habitat in Europa australi.*

307. **Avena geminiflora** Kunth Gram. 103. 299. t. 61. Agrost. 303. *Avena coarctata* Desfont. Catalog. Hort. Paris. 1829. p. 22. *Bromus coarctatus* Hornem. Hort. Hafn. *Arthrostachya coarctata* Link Hort. Berol. I. 151. *Gaudinia geminiflora* Gay msc. — ⊙ — *Patria ignota.*

308. **Avena versicolor** Vill. Flor. Delph. II. t. 4. f. 5. Willd. Spec. I. 452. Kunth Agrost. 300. *Avena Scheuchzeri* All. Flor. Pedem. n. 2259. Host Gram.

II. t. 52. — ♃ — *Habitat in alpibus elatis Europae mediae.*

309. **Avena pubescens** Linn. Spec. 1665. E. B. t. 1640. Kunth Agrost. 300. *Avena sesquitertia* Linn. Mant. Host Gram. II. t. 50. *Trisetum pubescens* Roem. et Schult. Syst. II. 662. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, Tauriae et Sibiriae.*

310. **Avena pratensis** Linn. Spec. 119. Host Gram. II. t. 51. E. B. t. 1204. Flor. Dan. t. 1083. Kunth Agrost. 300. — ♃ — *Habitat in pratis siccis Europae et Sibiriae.*

β *Bromoides. Avena bromoides* Linn. Spec. 1666.

311. **Avena sempervirens** Vill. Flor. Delph. II. t. 5. Host Gram. t. 41. DC. Flor. fr. III. 35. Kunth Agrost. 301. *Avena sedenensis* DC. Synops. 126. *Avena fallax* Roem. et Schult. Syst. II. 672. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae et Sibiriae.*

312. **Avena planiculmis** Schrad. Flor. Germ. I. t. 6. f. 2. Kunth Agrost. 301. *Avena latifolia* Host Gram. IV. t. 32. *Helicotrichum planiculme* Bess. in Reichenb. Flor. exc. 140. — ♃ — *Habitat in subalpinis Carpatorum et Sudetis.*

865. **Arrhenatherum** Palis. Wiesenhafer.

313. **Arrhenatherum avenaceum** Beauv. Agrost. t. 11. f. 5. Roem. et Schult. Syst. II. 496. Kunth Agrost. 307. *Arrhenatherum elatius* Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 546.

α. *Nodis glabris. Avena elatior* Linn. Spec. 117. Host Gram. II. t. 49. *Holcus avenaceus* Scop. Flor. Carn. n. 1239.

β. *Nodis villosis. Avena elatior* Schreb. Gram. I. 25. *Avena bulbosa* Willd. Holcus bulbosus Schrad. Flor. Germ. I, 248. Host Gram. IV. t. 30.

871. **Danthonia** DC.

314. **Danthonia provincialis** DC. Flor. fr. III. 33. Trin. Icon. VI. t. 17. Kunth Agrost. 312. *Danthonia calycina* Reichenb. Flor. exc. 52. *Avena calycina* Vill. Flor. Delph. II. t. 2. f. 9. *Avena stricta* Host

Flor. Austr. I. 127. — ♃ — *Habitat in montanis et alpinis Europae mediae et Tauriae.*

872. **Uralepis** Nutt.

315. **Uralepis cuprea** Kunth Gram. I. t. 68. Agrost. 318. *Poa quinquefida* Pursh Flor. Bor. Amer. I. 81. *Eragrostis tricuspis* Trin. in Act. Petrop. VI. 414. *Triodia cuprea* Jacq f. Eclog. Gram. II. t. 16. *Tridens quinquefida* Schult. Mant. II. 333. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

Tribus X. Festucaceae.

Subtribus 1. Bromeae.

875. **Sesleria** Ard.

316. **Sesleria caerulea** Arduino Spec. II. 18. t. 6. f. 3—5. E. B. t. 1613. Host Gram. II. t. 98. Kunth Agrost. 321. *Cynosurus caeruleus* Linn. Spec. 106. — ♃ — *Habitat in pratis Europae totius.*

317. **Sesleria cylindrica** DC. Synops. 134. Kunth Agrost. 322. *Cynosurus cylindricus* Balbis Addit. 86. *Sesleria* argentea Savi Bot. Etrusc. I. 68. — ♃ — *Habitat in Gallia meridionali et Italia.*

318. **Sesleria tenuifolia** Schrader Flor. Germ. I. 272. t. 6. f. 4 Kunth Agrost. 322. *Sesleria juncifolia* Sufren in Host Gram. IV. t. 22. — ♃ — *Habitat in Istria et Dalmatia.*

319. **Sesleria elongata** Host Gram. II. 69. t. 97. Kunth Agrost. 322. — ♃ — *Habitat in Istria et Helvetia.*

876. **Poa** Linn. Rispengras.

320. **Poa laxa** Haenke Sudet. 118. Host Gram. III. t. 15. Wahlenb. Carp. 22. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1; 599. Kunth Agrost. 349. *Poa flexuosa* Smith E. B. t. 1123. *Poa elegans* DC. Flor. fr. III. 62. — ♃ — *Habitat in montibus Europae totius.*

321. **Poa cenisia** Allioni Auct. 40 DC. Flor. fr. III. 720. Kunth Agrost. 350. *Poa distichophylla* Gaudin Agrost. I. 199. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 603. — ♃ — *Habitat in monte Cenisio et in Carinthia.*

322. **Poa alpina** Linn. Spec. 99. Host Gram. II. t. 67. E. B. t. 1003. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 606. Kunth. Agrost. 350. — ♃ — *Habitat in subalpinis Europae et Caucasi; nec non in America boreali et antarctica.*

β. *Collina. Poa collina* Host Gram. II. t. 66.

γ. *Mollineri. Poa Mollineri* Balbis Miscell. t. 5. f. 1.

323. **Poa sudetica** Haenke Sudet. 120. Host Gram. III. t. 13. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 609. Kunth Agrost. 351. — ♃ — *Habitat in montibus Europae et Caucasi.*

324. **Poa hybrida** Gaudin Agrost. 1. 215. Römer et Schult. Syst. II. 533. Link Hort. Berolin. I. 185. Kunth Agrost. 351. — ♃ — *Habitat in monte Jura et in Sudetis.*

325. **Poa bulbosa** Linn. Spec. 102. Host Gram. II. t. 62. E. B. t. 1072. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 609. Kunth Agrost. 352. — ♃ — *Habitat in Europa, Caucaso, Oriente et Sibiria.*

326. **Poa trivialis** Linn. Spec. 99. Host Gram. II. t. 62. E. B. t. 1072. Flor. dan. t. 1444. Mertens et Koch Deutschl. Flor I. 611. Kunth Agrost. 352. — ♃ — *Habitat in temperatis hemisphaerae borealis.*

327. **Poa pratensis** Linn. Spec. 99. Host Gram. II. t. 61. E. B. t. 1073. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 612. Kunth Agrost. 352. — ♃ — *Habitat passim in Europa, Caucaso et Sibiria.*

β *Angustifolia. Poa angustifolia* Linn. Spec. 99. Leers Flor. Herborn. t. 6. f. 3.

328. **Poa viridis** Schreber Gram. Mühlenb. Descrip. Gram. 138. Kunth Agrost. 353. *Poa virens* Jacq. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

329. **Poa fertilis** Host Gram. III. 10. t. 14. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 614. Kunth

Agrost. 352. — ♃ — *Habitat in Europa media, Sibiria et America boreali.*

330. **Poa nemoralis** Linn. Spec. 102. Flor. dan. t. 749. E. B. t. 1265. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 615. Kunth Agrost. 353. — ♃ — *Habitat in Europa, Sibiria, Caucaso et America boreali.*

ζ. *Glauca.* *Poa glauca* Smith E. B. t. 1720.

η. *Montana.*

331. **Poa sterilis** Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 62. Link Enum. 1. 86. Kunth Agrost. 354. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

332. **Poa caesia** Smith Flor. Brit. I. 103. *Poa Gaudini* Römer et Schult. II 548. Kunth Agrost. 355. *Poa aspera* Gaudin. Agrost. helv. I. 198. Link Hort. Berol. I. 177. — ♃ — *Habitat in Scotia et Helvetia.*

333. **Poa compressa** Linn. Spec. 101. Host Gram. II. t. 70. E. B. t. 365. Flor. dan. t. 742. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 621. Kunth Agrost. 355. — ♃ — *Habitat in Europa, Caucaso, Sibiria et America boreali.*

334. **Poa scariosa** Lagasca Elench. 3. Kunth Agrost. 364. — ♃ — *Habitat in Hispania.*

335. **Poa arundinacea** Link Hort. Berolin. I. 176. Kunth Agrost. 365. *Aira arundinacea* Linn. Spec. 95. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

336. **Poa dura** Scop. Flor. Carn. n. 101. Host Gram. II. t. 73. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 592. Trin. in Act. Petrop. VI. 391. *Sesleria dura* Kunth Gram. I. 110. Agrost. 323. *Cynosurus durus* Linn. Spec. 105. *Festuca dura* Vill. Delph. II. 94. *Sclerochloa dura* Beauv. Agrost. 93. — ⊙ — *Habitat in siccis Europae et Caucasi.*

337. **Poa littoralis** Gouan Monsp. 470. Lam. Ill. t. 45. f. 5. Kunth Agrost. 324. Poa pungens Bieb. Flor. I 65. *Dactylis littoralis* Willd. Spec. I. 488. Host Gram. IV. t. 28 *Dactylis maritima* Schrad. Flor. Germ. I. t. 6. f. 1. *Triticum supinum* Schrank in Act. Ratisb. 1818. 162. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea et Sibiria.*

338. **Poa leptostachya** R. Br. Prodr. Nov. Holl. I. 180. Kunth Agrost. 347. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

339. **Poa annua** Linn. Spec. 99. Host Gram. II. t. 64. E. B. t. 1141. Mert. et Koch. Flor. Deutschl. I. 598. Kunth Agrost. 349. — ⊙ — *Habitat in Europa, Africa, America et Asia boreali.*

β. *Supina.* *Poa supina* Schrad. Flor. Germ. I. 289. Host Gram. IV. t. 27.

340. **Poa persica** Trin. in Act. Petrop. VI. 373. Kunth Agrost. 358. — ♃ — *Habitat in Persia.*

341. **Poa maritima** Huds. Flor. Angl. 42. E. B. t. 1140. Flor. Dan. t. 251. *Poa arundinacea* Mönch Method. 186. *Glyceria maritima* Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 588. *Festuca thalassica* Kunth Agrost. 394. *Hydrochloa maritima* Hartm. Gram. Suec. 8. — ♃ — *Habitat ad mare et in salinis Europae et Sibiriae.*

342. **Poa rigida** Linn. Spec. 101 Host Gram. II. t. 74. Desf. Flor. Atl. I. 74. E. B. t. 1371. Mert. et Koch. Flor. Deutschl. I. 593. *Glyceria rigida* Smith Engl. Flor. 119. *Festuca rigida* Kunth Gram. I. 129. Agrost. 392. *Megastachya rigida* Beauv. Agrost. 74. *Megastachya pulchella* Roem. et Schult. Syst. II. 591. — ⊙ — *Habitat in regione mediterranea.*

343. **Poa procumbens** Curt. Flor. Lond. VI. t. 11. E. B. t. 532. Trin. in Act. Petrop. VI. 391. *Poa rupestris* With. Bot. Arr. t. 26. *Glyceria procumbens* Smith Engl. Flor. 119. *Festuca procumbens* Kunth Gram. I. 129. Agrost. 393. *Sclerochloa procumbens* Beauv. Agrost. 98 — ⊙ — *Habitat in Anglia et Hollandia.*

344. **Poa mexicana** Lagasc. Elench. 3. Kunth Agrost. 331. *Poa capillaris* Link Enum. I. 88. *Eragrostis mexicana* Link Hort. I. 190. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

345. **Poa Eragrostis** Linn. Spec. 100. Host Gram. II. t. 69. Schreb. Gram. II. t. 38. Sibth. Flor. Graec. I. t. 73. Kunth Agrost. 332. *Eragrostis poaeoides* Beauv. Agrost. 71. *Eragrostis minor* Host Flor. Austr. I. 135. — ⊙ — *Habitat in Europa media et australi, Asia et America boreali.*

346. **Poa megastachya** Koel. Gram. I. 181. Humb. et Kunth Nov. Gen. I. 158. Kunth Agrost. 333. *Poa Eragrostis* Cav. Icon. I. 63. *Briza Eragrostis* Linn. Spec. 103. *Eragrostis major* Host Gram. IV. t. 24. *Megastachya Eragrostis* Beauv. Agrost. 74. —⊙— *Habitat in Europa australi, Africa boreali et America.*

347. **Poa polymorpha** Willd in Act. Soc. nat. Berol. IV. 194. Kunth Agrost. 345. *Eragrostis polymorpha* Roem. et Schult. Syst. II. 575. —⊙— *Habitat in India orientali et insulis adjacentibus.*

878. Glyceria R. Br. Schwaden.

348. **Glyceria aquatica** Smith Engl. Flor. 116. Kunth Agrost 367. *Glyceria spectabilis* Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 586. *Poa aquatica* Linn. Spec. 98. Host Gram. II. t. 60. E. B. t. 1315. Flor. Dan. t. 920. *Hydrochloa aquatica* Hartm. Gram. Suec. 8. Link Hort. I. 173. —♃— *Habitat in aquis Europae, Asiae et Novae Hollandiae.*

349. **Glyceria Michauxii** Kunth Gram. I. t. 85. Ejusd. Agrost. 367. *Poa striata* Mich. Flor. I. 389. *Poa nervata* Willd. Spec. I. 389. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 79. *Poa lineata* Pers. syn. II. 89. —♃— *Habitat in Pensylvania, Virginia.*

350. **Glyceria delawarica.** — *Festuca? delawarica* Kunth Gram. I. 129. Agrost. 394. *Poa delawarica* Link Hort. I. 174. —♃— *Habitat in America boreali.*

881. Catabrosa Palis. Herzschwaden.

351. **Catabrosa aquatica** Beauv. Agrost. t. 19. f. 8. Roem. et Schult. Syst. II. 696. Kunth Agrost. 369. *Colpodium aquaticum* Trin. in Act. Petrop. VI. 395. *Glyceria airoides* Reichenb. Flor. exc. 45. *Glyceria aquatica* Smith Engl. Flor. 118. *Molinia aquatica* Wib. Flor. Werth. 116. *Aira aquatica* Linn. Spec. 95. Host Gram. II. t. 41. E. B. t. 1557 *Poa airoides* Koel. Gram. 194. —♃— *Habitat in Europa, Caucaso, Sibiria et America boreali.*

883. **Briza** Linn. Zittergras.

352. **Briza maxima** Linn. Spec. 103 Jacq. Observ. III. t. 60. Host Gram. II t. 30. Sibth. Flor. Graec. I. t. 76. Trin. in Act. Petrop. VI. 362. Kunth Agrost. 371. — ⊙ — *Habitat in Europa meridionali, Capite bonae spei et India orientali.*

353. **Briza media** Linn. Spec. 103. Flor. dan. t. 258. E. B. t. 340. Host Gram. II. t. 29. Trinius in Act. Petropolit. VI. 361. Kunth Agrost. 371. — ♃ — *Habitat in Europa et Tauria.*

354. **Briza minor** Linn. Spec. 102 E. B. t. 1316. Host Gram. II. t. 28 Sibth. Flor. Graec. I. t. 74. Trin. in Act. Petrop. VI. 362. Kunth Agrost. 372. *Briza virens* β. DC. Flor. fr. III. 67. *Briza aspera* Knapp t. 61. — ♃ — *Habitat in Europa australi, Africa, America meridionali.*

355. **Briza geniculata** Thunb Prodr. I. 21. Flor. Capens. I. 414. Kunth Agrost. 372. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

885. **Calotheca** Kunth.

356. **Calotheca elegans** Beauv. Agrost. t. 17. f. 7. Kunth Agrost. 374. *Calotheca dilatata* Link Hort. I. 157. *Calotheca poaeformis* Spreng. Syst. I 348. *Bromus brizoides* Lam. Ill. I. 193. — ♃ — *Habitat in Montevideo.*

887. **Melica** Linn. Perlgras.

357. **Melica ciliata** Linn. Spec. 97. Host Gram. II. t. 12. Kunth Agrost. 375. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Europae, Caucasi et Sibiriae.*

358 **Melica Bauhini** Allioni Auct. 43. Host Gram. IV. t. 23. Kunth Agrost. 376. *Melica pyramidalis* Desfont. Flor. atlant. I. 72. — ♃ — *Habitat in Europa australi et in Barbaria.*

359. **Melica nutans** Linn. Spec. 98. Schreber Gram. II. t. 6. f. 2. E. B. t. 1059. Host Gram. II. t. 10. Kunth Agrost. 376. *Melica montana*

Hudson Flor. Angl. 37. — ♃ — *Habitat in montanis sylvaticis Europae fere totius, Orientis et Sibiriae.*

360. **Melica uniflora** Retz Observ. I. 10. Host Gram. II. t. 11. Kunth Agrost. 377. *Melica Lobelii* Villars Delph. II. 19. t. 3. f. 3. *Melica nutans* Lam. Illustr. n. 957. t. 44. — ♃ — *Habitat in Europa et Oriente.*

361. **Melica altissima** Linn. Spec. 98. Host Gram. II. t 9. Kunth Agrost. 377. *Melica sibirica* Lam. Illustr. n. 955. — ♃ — *Habitat in Europa orientali, Caucaso et Sibiria.*

888. **Molinia** Moench. Binsengras.

362. **Molinia coerulea** Moench Meth. 183. Koel. Gram. 145. Beauv. Agrost. t. 14. f. 6. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 583. Kunth Agrost. 379. *Melica coerulea* Linn. Mant. II. 325. E. B. t. 750. Host Gram. II. t. 8. *Enodium coeruleum* Gaud. Agrost. I. 145. *Festuca coerulea* DC. Flor. fr. III. 46. *Aira coerulea* Linn. Spec. 95. Flor. Dan. t. 239. — ♃ — *Habitat in pratis humidis, sylvaticis Europae.*

β. *Major. Molinia littoralis* Host Flor. Aust. I. 118. *Molinia altissima* Link Hort. I. 197.

363. **Molinia serotina** Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 585. Kunth Agrost. 380. *Festuca serotina* Linn. Spec. 111. Host Gram. II. t. 92. *Diplachne serotina* Link Hort. I. 155. *Melica nodosa* Pill. et Mitterb. Iter. 143. *Bromus strictus* Scop. Carn. II. n. 114. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

889. **Koeleria** Pers.

a. **Airochloa** Link.

364. **Koeleria cristata** Pers. Syn. I. 97. DC. Hort. Monsp. 116. Kunth Agrost. 381. *Aira cristata* Linn. Spec. 94. E. B. t. 648. *Poa cristata* With. Bot. Arrang. 145. Host Gram. II. t. 75. *Dactylis cristata* Bieb. Flor. I. 67. *Airochloa cristata* Link. Hort. I. 127. — ♃ — *Habitat in siccis Europae, Caucasi et Sibiriae.*

365. **Koeleria glauca** DC. Cat. Hort. Monsp. 116. Fries Novit. Flor. Suec. II. 26. Kunth Agrost. 381. *Aira glauca* Spreng. Cat. Hall. Fl. dan. t. 1566. *Dactylis lobata* Bieb. Flor. I. 67. *Koeleria lobata* Roem. et Schult Syst. II. 620. — ♃ — *Habitat passim in Europa media et boreali, Tauria et Sibiria.*

366. **Koeleria vallesiaca** Gaud. Agrost. I. 149. DC. Cat. Hort Monsp. 117. Kunth Agrost 382. *Aira vallesiaca* All Auct. 40. *Airochloa vallesiaca* Link Hort. I. 127. — ♃ — *Habitat in Vallesia.*

367. **Koeleria setacea** DC. Cat. Hort. Monsp. 118. Kunth Agrost. 382. *Festuca splendens* Pourr. in Act. Tolos. 3. *Poa pectinata* Lam. ill. I. 183. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

b. **Collinaria** Erh.

368. **Koeleria villosa** Pers. syn. I. 97. DC. Cat. Hort. Monsp. 118. Kunth Agrost. 382. *Koeleria pubescens* Beauv. Agrost. 85. Phalaris pubescens Lam. Encycl. I. 91 DC. Flor fr. n. 1487. *Aira pubescens* Vahl Symb. III. 9. Desf. Flor. Atl. II. 446. *Alopecurus littoreus* All. Ped. n. 2151. *Airochloa villosa* Link Hort. I. 128. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

369. **Koeleria phleoides** Pers. Syn. I. 97. DC. Cat. Hort. Monsp. 119. Kunth Agrost. 383. *Festuca phleoides* Vill. Flor. Delph. II. t. II. f. 7. Desf. Flor. Atl. I t. 23. Host Gram. III t. 21. *Trisetum phleoides* Trin. in Act. Petrop. 1830. I. 65. *Poa phleoides* Lam. ill. n. 976. *Festuca cristata* Linn. Spec. 111. — ☉ — *Habitat in siccis Europae australis, Mauritaniae et Tauriae.*

370. **Koeleria brachystachya** DC. Cat. Hort. Monsp. 120. Kunth Agrost. 383. *Bromus cristatus* Spreng. *Trisetum phleoides* var. Trin in Act. Petrop. 1830. I. 65. — ☉ — *Habitat in Pyrenaeis.*

371. **Koeleria dactyloides** Reichenb. Flor. exc. 140. Kunth Agrost. 384. *Aira dactyloides* Roch. Banat. t. 1. f. 3. — ♃ — *Habitat in Banato.*

890. **Schismus** Palis.

372. **Schismus marginatus** Beauv. Agrost. t. 15. f. 4. Link Hort. I. 134. Kunth Agrost. 385. *Festuca calycina* Linn. Amoen. III. 400. Linn. Spec. 110. Cavanill. Icon. I. t. 44. *Schismus fasciculatus* Trin. Fundament. 148. — ⊙ — *Habitat in Gallia meridionali, Hispania et Capite bonae spei.*

892. **Dactylis** Linn.

373. **Dactylis glomerata** Linn. Spec. I. 404. Host Gram. II. t. 94. E. B. t. 335. Flor. Dan. t. 743. Kunth Agrost. 386. *Festuca glomerata* All. Pedem. n. 2239. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, Sibiriae et Americae borealis.*

374. **Dactylis abbreviata** Bernh. Hort. Erf. Link Hort. I. 153. Kunth Agrost. 387. — ♃ — *Patria?*

894. **Cynosurus** Linn. Hundsschwanz.

a. **Cynosurus** Palis.

375. **Cynosurus cristatus** Linn. Spec. 105. Schreb. Gram. t. 8. f. 1. E. B. t. 316. Host Gram. II. t. 96. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 632. Kunth Agrost. 388. — ♃ — *Habitat in pratis Europae.*

b. **Chrysurus** Palis.

376. **Cynosurus echinatus** Linn. Spec. 105. Host Gram. II. t. 95. E B. t. 1333. Sibth. Flor. Graec. I. t. 78. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I 632. Kunth Agrost. 388 *Chrysurus echinatus* Palisot Agrost. 123. — ⊙ — *Habitat in siccis Europae australis, Caucasi et Americae meridionalis.*

895. **Lamarckia** Moench. Goldähre.

377. **Lamarckia aurea** Moench Meth. 201. Koel. Gram. 376. Kunth Agrost 389. *Chrysurus aureus* Beauv. Agrost. 123. *Chrysurus Cynosuroides* Pers. Synops. I. 80. *Cynosurus aureus* Linn. Spec. 107. Host

Gram. III. t. 4. Sibth. Flor. Graec. I. t. 79. —⊙— *Habitat in regione mediterranea et Oriente.*

899. **Festuca** Linn. Schwingel.

378. **Festuca divaricata** Desf. Flor. Atl. I. t. 22. Kunth Agrost. 391. *Sclerochloa articulata* Link Enum. I. 90. *Dactylis memphitica* Spreng. Hort. Hallens. add. I. 20. *Dinebra divaricata* Roem. et Schult. Syst. II. 712. —⊙— *Habitat in regione mediterranea.*

379. **Festuca Hostii** Kunth Gram. I. 129. Agrost. 393. *Festuca palustris* Seenus Iter. 72. *Glyceria capillaris* Wahlb. Flor. Gothob. *Glyceria festucaeformis* Heynhold in Reichenb. Flor. exc. 45. *Poa festucaeformis* Host Gram. III. t. 17. —♃— *Habitat in Europa australi, Caucaso et Sibiria.*

380. **Festuca unioloides** Kunth Gram. I. 129. Agrost. 394. *Brachypodium unioloides* Link Enum. I. 95. *Triticum unioloides* Ait. Hort. Kew. I. 122. *Poa sicula* Jacq. Icon. rar. II. t. 303. *Cynosurus siculus* Jacq. Observ. II. t. 43. *Briza cynosuroides* Scop. Delic. II. t. 11. —♃— *Habitat in Italia, Sicilia et Barbaria.*

381. **Festuca gracilis** Kunth Gram. I. 129. Agrost. 395. *Triticum tenellum* Linn. Spec. 127. —♃— *Habitat in Gallia meridionali.*

382. **Festuca tenuiflora** Schrad. Flor. Germ. I. 345. Kunth Agrost. 395. *Triticum tenellum* Host Gram. II. t. 26. *Triticum Nardus* DC. Flor. fr. III. 87. *Brachypodium tenuiflorum et tenellum* Roem. et Schult. Syst. II. 745. —⊙— *Habitat in Europa australi.*

383. **Festuca uniglumis** Soland. in Ait. Hort. Kew. I. 108. E. B. t. 1430. Host Gram. IV. t. 64. Kunth Agrost. 396. *Vulpia membranacea* Link Hort. I. 147. *Vulpia uniglumis* Reichenb. Flor. excurs. 37. *Mygalurus uniglumis* Link Hort. I. 147. *Lolium bromoides* Huds. Flor. Angl. 55. —⊙— *Habitat in siccis Europae calidioris.*

384. **Festuca Myurus** Linn. Spec. 109. Host Gram. II. t. 93. E. B. t. 1412. Kunth Agrost. 396. *Vulpia Myurus* Gmelin Flor. Bad. I. 215. *Vulpia Pseudo-*

Myurus Reichenb. Flor. excurs. 37. *Mygalurus caudatus* Link Enum. I. 115. —⊙— *Habitat in siccis, sterilibus Europae.*

385. **Festuca bromoides** Linn. Spec. 110. E. B. t. 1411. Fl. Dan. t. 1444. Kunth Agrost. 396. *Festuca sciuroides* Roth Tent. Flor. Germ. II. 130. *Bromus dortonensis* All. Flor. Pedem. II. 249. *Vulpia bromoides* Gmel. Flor. Badens. I. 215. *Vulpia sciuroides et bromoides* Reichenb Flor. excurs. 37. —⊙— *Habitat in Europa et insulis Maclovianis.*

386. **Festuca delicatula** Lagasc. Varied. II. 19. Kunth Agrost. 397. *Mygalurus delicatulus* Link Enum. I. 92. *Vulpia delicatula* Link Hort. I. 148. —⊙— *Habitat in Hispania.*

387. **Festuca geniculata** Willd. Enum. 118. Kunth Agrost. 397. *Festuca stipoides* Desf. Flor. Atl. I. 90. *Bromus stipoides* Linn. Mant. 557. *Bromus geniculatus* Linn. Mant. 33. Schreb. Gram. II. t. 31. *Mygalurus geniculatus* Link Enum. I. 92. *Vulpia geniculata* Link Hort. I. 148. *Vulpia ligustica* Reichenb. Flor. excurs. 140. —⊙— *Habitat in regione mediterranea.*

388. **Festuca Alopecurus** Schousb. Descript. 40. Kunth Agrost. 398. *Festuca ciliata* Link in Schrad. Journ. II. 315. *Bromus barbatus* Savi Flor. Etrusc. II. 61. *Mygalurus alopecuroides* Link Enum. I. 92. *Vulpia Alopecurus* Link Hort. I. 147. —⊙— *Habitat in Europa australi et Africa boreali.*

389. **Festuca ovina** Linn. Spec. 108. Host Gram. II. t. 84. E. B. t. 585. Kunth Agrost. 398. *Festuca paludosa* Gaud. Agrost. I. 229. —♃— *Habitat in pratis, collibus et muris Europae, Sibiriae et sinus Nootka.*

β *Tenuifolia. Festuca tenuifolia* Sibth. Flor. Oxon. n. 138.

γ. *Major. Festuca duriuscula* Linn. Spec. 108. Host Gram. II. t. 83. E. B. t. 470. *Festuca stricta* Host Gram. II. t. 86. *Festuca dura* Host Gram. II. t. 87.

δ. *Mutica.*

ε. *Villosa. Festuca hirsuta* Host Gram. II. t. 83.

390. **Festuca glauca** Schrad. Flor. Germ.

I. 322. Mertens et Koch. Flor. Deutschl. I. 649. Kunth Agrost. 400. — ♃ — *Habitat in arenosis et rupestribus Europae.*

β. *Pallens.* *Festuca pallens* Host Gram. II. t. 38.

γ. *Viridis.*

391. **Festuca pannonica** Wulf. in Host Gram. IV. t. 62. Kunth Agrost. 401. — ♃ — *Habitat in siccis Austriae et Pannoniae.*

β. *Viridis.*

392. **Festuca vaginata** Waldst. et Kit. in Willd. Enum. 116. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 652. Kunth Agrost. 401. — ♃ — *Habitat in Hungaria et Germania.*

393. **Festuca Fenas** Lagasc. Elench. 4. Kunth Agrost. 401. *Festuca tenax* Link. Enum. I. 87. — ♃ — *Habitat in Hispania.*

394. **Festuca amethystina** Host Gram. II. t. 89. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 653. — ♃ — *Habitat in collibus arenosis Europae mediae.*

395. **Festuca rubra** Linn. Spec. 109. Host Gram. II. t. 82. E. B. t. 2056. Kunth Agrost. 401. — ♃ — *Habitat in Europa et Sibiria.*

β. *Villosa.* *Festuca dumetorum* Linn. Spec. 109.

γ. *Lanuginosa.* *Festuca cinerea* DC. Flor. fr. III. 51.

396. **Festuca nigrescens** Lam. Encycl. II. 460. DC. Flor. fr. VI. 266. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 657. Kunth Agrost. 402. *Schoenodorus nigrescens* Roem. et Schult. Syst. II. 705. — ♃ — *Habitat in Helvetia, Sibiria.*

397. **Festuca heterophylla** Haenke in Jacq. Collect. II. 93. Host Gram. III. t. 18. Kunth Agrost. 402. *Festuca nemorum* Leyss. in Act. Soc. nat. Hal. I. 368. — ♃ — *Habitat in montanis nemorosis Europae.*

398. **Festuca aurata** Gaud. Agrost. I. 234. Kunth Agrost. 399. *Schoenodorus auratus* Roem. et Schult. Syst. II. 705. — ♃ — *Habitat in alpibus Helvetiae.*

399. **Festuca alpestris** Roem. et Schult.

Syst. II. 722. Kunth Agrost. 402. *Festuca alpina* Host Gram. IV. t. 63. — ♃ — *Habitat in alpibus Tyrolis.*

400. **Festuca rhaetica** Sut. Flor. Helv. I. 68. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 661. Kunth Agrost. 402. *Festuca pilosa* Gaud. Agrost. I. 276. *Festuca poaeformis* Host Gram. II. t. 81. *Schoenodorus poaeformis* Roem. et Schult. Syst. II. 705. — ♃ — *Habitat in alpibus Germaniae australis, Helvetiae, Siciliae et in Carpathis.*

401. **Festuca elatior** Linn. Spec. 111. Curt. Flor. Lond. t. 7. E. B. t. 1593. Kunth Agrost. 404. *Festuca arundinacea* Schreb. Spic. 57. *Bromus arundinaceus* Roth Tent. Flor. Germ. II. 141. *Bromus littoreus* Retz Flor. Scand. ed. II. n. 140. Host Gram. I. t. 8. *Schoenodorus elatior* Beauv. Agrost. 99. — ♃ — *Habitat in pratis Europae et Sibiriae.*

402. **Festuca borealis** Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 664. Kunth Agrost. 404. *Festuca arundinacea* Liljebl. Flor. ed. 2. *Arundo festucacea* Willd. Enum. 126. *Schoenodorus arundinaceus* Roem. et Schult. Syst. II. 700. — ♃ — *Habitat in Germania et Ostergothia.*

403. **Festuca pratensis** Huds. Flor. Angl. 37. E. B. t. 1592. Flor. Dan. t. 1323. Kunth Agrost. 404. *Festuca elatior* Linn. Flor. Suec. 32. Host Gram. II. t. 79. Schreb. Gram. I. t. 2. *Bromus pratensis* Spreng. Syst. I. 359. *Schoenodorus pratensis* Beauv. Agrost. 99. — ♃ — *Habitat in Europae et Sibiriae graminosis.*

404. **Festuca loliacea** Hudson Flor. angl. ed. 1. 38. E. B. t. 1821. Kunth Agrost. 404. *Poa loliacea* Koeler Gram. 207. *Lolium festucaceum* Link Hort. Berol. I. 273. *Brachypodium loliaceum* Link Hort. Berol I. 42. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

405. **Festuca Drymeja** Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 670. Kunth Agrost. 405. *Festuca montana* Sternb. et Hoppe in Abhandl. d Regensb. Gesellsch. 1818. 95. *Schoenodorus sylvaticus* Roem. et Schult. Syst. II. 702. — ♃ — *Habitat in sylvaticis montanis Europae mediae.*

406. **Festuca sylvatica** Vill. Flor. Delph. II. 105. Host Gram. IV. t. 60. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 669. Kunth Agrost. 405. *Festuca Calamaria* Smith Brit. Flor. I. 121. Host Gram. Aust. IV. t. 60. *Poa trinervata* Schrad. Spicil. 3. Flor. Dan. t. 1145. *Poa sylvatica* Poll. Palat. n. 87. *Schoenodorus calamarius* Roem. et Schult. Syst. II. 701. — ♃ — *Habitat in sylvis Europae.*

407. **Festuca spadicea** Gouan Illustr. 4. Linn. Mant. 732. Host Gram. III. t. 20. Kunth Agrost. 406. *Poa spadicea* Koel. Gram. 202. *Poa Gerardi* All. Flor. Pedem. n. 2201. *Anthoxanthum paniculatum* Linn. Spec. 40. *Schoenodorus spadiceus* Roem. et Schult. Syst. II. 700. — ♃ — *Habitat in Europa media.*

408. **Festuca varia** Haenke in Jacq. Collect. II. 94. Host Gram II. t. 90. Kunth Agrost. 405. *Festuca flavescens* Gaud. Agrost. I. 272. Waldst. et Kit. in Host Gram. III. t. 19. *Festuca Eskia* Ramond in DC. Flor. fr. III. 52. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae et Caucasi.*

409. **Festuca Scheuchzeri** Gaud. Agrost. I. 267. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 668. Kunth Agrost. 406. *Festuca pulchella* Schrad. Flor. Germ. I. t. 5. f. 5. *Festuca nutans* Host Gram. IV. t 61. *Schoenodorus Scheuchzeri et nutans* Roem. et Schult. Syst. II. 703. — ♃ — *Habitat in Europa media.*

410. **Festuca gigantea** Vill. Flor. Delph. II. 110. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 671. Kunth Agrost. 407. *Bromus giganteus* Linn. Spec. 114. Host Gram. I t. 6. Schreb. Gram. I. t. 11. — ♃ — *Habitat in humidis, dumetosis Europae et Sibiriae.*

411. **Festuca nutans** Spreng. ex Willdenow Enum. 116. Kunth Agrost. 407. *Poa nutans* Link Enum. 1. 86. *Festuca obtusa* Sprengel Mant. 1. 34. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

412. **Festuca scabra** Vahl Symb. II. 21. Kunth Agrost. 409. *Festuca aspera* Poir. Encycl. Suppl. II. 635. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

413. **Festuca pubescens** Willd. Enum.

Suppl. 6. Link Hort. I. 141. Kunth Agrost. 409. *Festuca kitaibeliana* Schult. Mant. II. 398. — ♃ — *Habitat in Hungaria.*

414. **Festuca Hemipoa** Delile in Spreng. Cur. poster. 36. Kunth Agrost. 411. — ♃ — *Habitat in Gallia australi.*

900. **Bromus** Linn. Trespe.

415. **Bromus inermis** Poll. Flor. Palat. n. 111. Schreb. Gram. I. t. 13. Host Gram. I. t. 9. *Festuca inermis* DC. Flor. fr. n. 1581. *Festuca speciosa* Schreb. Spic. 59. *Schoenodorus inermis* Roem. et Schult. Syst. II. 701. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, Caucasi et Sibiriae.*

416. **Bromus secalinus** Linn. Spec. 112. Host Gram. I. t. 12. E. B. t. 1171. Kunth Agrost. 413. — ☉ — *Habitat inter segetes Europae, Caucasi.*

417. **Bromus velutinus** Schrad. Flor. Germ. I. t. 6. f. 3. Kunth Agrost. 413. *Bromus grossus* DC. Synops. 132. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 680. *Bromus multiflorus* E. B. t. 1884. *Bromus nitidus* Dumort. Agrost. 119 — ☉ — *Habitat in Europa media et australi.*

418. **Bromus racemosus** Linn. Spec. 114. E. B. t. 1079. Kunth Agrost. 413. *Bromus hordeaceus* Linn. Spec. ed. I. 77. *Bromus simplex* Gaud. Agrost. I. 296. *Bromus multiflorus* Roth Tentam. Flor. Germ. II. 134. — ☉ ⊙ — *Habitat in Europa.*

419. **Bromus mollis** Linn. Spec. 112. Host Gram. I. t. 19. Schreb. Gram. t. 6. f. 1. E. B. t. 1078. Flor. Dan. t. 1324. Kunth Agrost. 413. — ⊙ — *Habitat in siccis Europae, Asiae borealis, Capitis bonae spei et Americae australis.*

420. **Bromus confertus** Bieb. Flor. I. 71. Jacq. f. Eclog. Gram. t. 14. Kunth Agrost. 414. — ☉ — *Habitat in Iberia.*

β. *Spicis glabris.*

421. **Bromus wolgensis** Jacq. f. Eclog. Gram. t. 15. Kunth Agrost. 414. *Bromus hirsutus* Schrank

in Act. Ratisb. 1818. 161. —⊙— *Habitat in Tauria, et in deserto ad mare Caspicum.*

422. **Bromus asper** Murr. Flor. Goetting. 42. Linn. Suppl. 111. Host Gram. I. t. 7. E. B. t. 1172. Kunth Agrost. 414. *Bromus montanus* Scop. Flor. Carn. n. 117. *Bromus nemorosus* Vill. Flor. Delph. II. 117. *Festuca aspera* Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 673. —♃— *Habitat in dumetis montanis Europae, Caucasi et Sibiriae.*

423. **Bromus squarrosus** Linn. Spec. 112. E. B. t. 1885. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 685. Kunth Agrost. 414. —⊙— *Habitat in Europa, Africa et Asia boreali.*

424. **Bromus commutatus** Schrad. Flor. Germ. I. 353. Kunth Agrost. 414. —⊙— *Habitat in Germania.*

425. **Bromus patulus** Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 685. Kunth Agrost. 415 *Bromus multiflorus* Host Gram. I. t. 11. —⊙— *Habitat in Germania et Gallia.*

426. **Bromus vestitus** Schrad. Anal. ad Flor. Capens. 2. Kunth Agrost. 415. *Bromus capensis* Steud. in Flora 1829. 491. —⊙— *Habitat in Capite bonae spei.*

427. **Bromus divaricatus** Rhode. Lois. in Journ. de Bot. II. 214. Kunth Agrost. 415. *Bromus lanuginosus* Poir. Encycl. Suppl. I. 703. —⊙— *Habitat in Gallia.*

428. **Bromus alopecuroides** Poir. Iter. II. 100. Kunth Agrost. 415. *Bromus contortus* Desf. Flor. Atl. I. t. 25. *Bromus Alopecurus* Vahl Symb. II. 22. —⊙— *Habitat in Barbaria et Hispania.*

429. **Bromus lanceolatus** Roth Catalect. I. 18. Kunth Agrost. 415. —⊙— *Habitat ad mare Caspicum.*

β *Hirsutissimus.*

430. **Bromus Schraderi** Kunth Agrost. 416. *Ceratochloa pendula* Schrad. Ind. Semin. Hort. Götting. 1830. —⊙— *Habitat in Carolina.*

431. **Bromus Willdenowii** Kunth Gram. I.

34. Agrost. 416. *Festuca unioloides* Willd. Hort. Berol. I. t. 3. Ceratochloa unioloides Beauv. Agrost. t. 15. f. 7. — ⊙ — *Habitat in Carolina et Montevideo.*

432. **Bromus arduennensis** Kunth Gram. I. 134. Agrost. 416. *Bromus polystachyus* Desf. Cat. Hort. Paris. 389. *Libertia arduennensis* Lejeune in Nov. Act. Bonn. XII. t. 65. *Michelaria bromoidea* Dumort. Agrost. t. 16 — ⊙ — *Habitat in provincia Leodiensi.*

433. **Bromus purgans** Linn. Spec. 113. Kunth Agrost. 417. — ♃ — *Habitat in Pensylvania, Canada.*

434 **Bromus catharticus** Vahl. Symb. II. 22. Kunth Agrost. 417. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

435. **Bromus pendulinus** Schrad in N. Journ. IV. 70. Kunth Agrost. 417. *Festuca pendulina* Spreng. Syst. I. 356. — ⊙ — *Habitat in insulis fortunatis.*

436. **Bromus canadensis** Mich. Fl. B. Amer. I. 65. Kunth Agrost. 417. — ♃ — *Habitat in Canada.*

437 **Bromus arvensis** Linn. Spec. 113. Host Gram. I. t. 14. E. B. t. 920. Kunth Agrost. 417. *Bromus versicolor* Poll. Flor. Palat. I. 109. — ⊙ — *Habitat ad agros et vias Europae.*

438. **Bromus erectus** Huds. Flor. Angl. 49. E. B. t. 471. Flor. Dan. t. 1384. Kunth Agrost. 418. *Bromus agrestis* Host Gram I. t. 10. *Bromus pseudo-arvensis* Koel. Gram. 241. *Bromus perennis* Vill. Flor. Delph II. 121. *Festuca montana* Savi Flor. Pisan. I. 118. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 673. — ♃ — *Habitat in Europa et Caucaso.*

439. **Bromus sterilis** Linn Spec. 113. Host Gram. I. t. 16. E. B. t. 1030. Flor. Dan. t. 1325 Kunth Agrost. 418. *Bromus distichus* Moench Method. 192. — ⊙ — *Habitat in siccis sterilibus Europae et Orientis.*

440. **Bromus longiflorus** Willd. Enum. Suppl. 6. Kunth Agrost. 419. — ♃ — *Patria?*

441. **Bromus tectorum** Linn. Spec. 114. Host Gram. I. t. 15. Sibth. Flor. Graec. I. t. 82. Kunth Agrost. 419 — ⊙ — *Habitat in sterilibus et cultis Europae et Asiae borealis.*

442. **Bromus laxus** Horn. Hort. Hafn. II.

954. Link Hort. I. 170. Kunth Agrost. 419. — ♃ — *Habitat in montibus Saxoniae.*

443. **Bromus ciliatus** Linn. Spec. 113. Kunth Agrost. 419. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

444. **Bromus rigidus** Roth in Roem. et Uster. Diar. bot. fasc. 10. 21. DC. Flor. fr. VI. 278. Kunth Agrost. 419. *Bromus rubens* Host Gram. I. t. 18. *Bromus madritensis* Vahl Symbol. II. 23. — ⊙ — *Habitat in Europa australi.*

445. **Bromus madritensis** Linn. Spec. 114. Host Gram. I. t. 17. Kunth Agrost. 419. *Bromus diandrus* Curt. Flor. Londin. t. 70. E. B. t. 1006. *Bromus muralis* Huds. Flor. Angl. 50. *Festuca madritensis* Desf. Flor. Atl. I. 91. — ⊙ — *Habitat in sterilibus Europae australis et Africae borealis.*

446. **Bromus rubens** Linn. Spec. 114. Sibth. Flor. Graec. I. t. 83. Kunth Agrost. 420. *Festuca rubens* Pers. Synops. I. 94. — ⊙ — *Habitat in Hispania, Graecia et Aegypto.*

447. **Bromus scoparius** Linn. Amoen. acad. IV. 266. Kunth Agrost. 420. *Bromus purpurascens* Delile Illustr. 4. *Bromus rubens* Cav. Icon. I. t. 45. f. 2. — ⊙ — *Habitat in Hispania, Gallia, Oriente et Africa boreali.*

448. **Bromus angustifolius** Horn. Hort. Hafn. Suppl. 13. Kunth Agrost. 420. *Bromus stenophyllus* Link Enum. I. 94. — ♃ — *Patria?*

449. **Bromus jubatus** Tenor. Flor. Neap. 10. Kunth Agrost. 421. *Bromus Tenorianus* Schult. Mant. II. 360. — ♃ — *Habitat in Italia.*

902. **Uniola** Linn.

450. **Uniola latifolia** Mich. Flor. Bor. Amer. I. 71. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 82. Kunth Agrost. 424. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

903. **Diarrhena** Palis. Maystrespe.

451. **Diarrhena americana** Beauv. Agrost. 141. t. 25. f. 11. Kunth Agrost. 425. *Diarina sylvatica*

Rafinesque. *Roemeria Zea* Roem. et Schult. Syst. I. 287. *Festuca diandra* Mich. Flor. Bor. Americ. I. t. 10. *Corycarpus arundinaceus* Zea in Act. Matr. 1806. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

Subtribus 2. Bambuseae.

904. **Arundinaria** Rich. Baumrohr.

452. **Arundinaria glaucescens** Palisot Agrost. 144. Kunth Agrost. 426. *Ludolfia glaucescens* Willden. in Berlin. Verhandl. nat. Fr. 1808. p. 320. *Panicum glaucescens* Lam. Dict. IV. 749. *Panicum arborescens* Linn. Flor. Zeylan 43. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

909. **Bambusa** Schreb. Bambosrohr.*

453. **Bambusa arundinacea** Willdenow Spec. II. 245. Roxburgh Plant. Corom. I. 56. t. 79. Kunth Agrost. 431. *Arundo Bambos* Linn. Spec. 120. — 5 — *Habitat in Asia tropica.*

Tribus XI. Hordeaceae.

912. **Lolium** Linn. Lolch.

454. **Lolium perenne** Linn. Spec. 122. Schreb. Gram. II. t. 37. E. B. t. 315. Flor. Dan. t. 747. Host Gram. I. t. 25. Kunth Agrost. 436. — ♃ — *Habitat in Europa, Caucaso et America boreali.*

455. **Lolium temulentum** Linn. Spec. 122. Flor. dan. t. 160. Schreber Gram. II. t. 36. E. B. t. 1124. Kunth Agrost. 437. — ⊙ — *Habitat in temperatis totius orbis.*

456. **Lolium multiflorum** Lam. Fl. fr. III. 621. DC Fl. fr. III. 90. Kunth Agrost. 436. — ⊙ — *Habitat in Gallia.*

457. **Lolium arvense** Withering Arrangm. III. 168. E. B. t. 1125. Host Gram. III. t. 25. Mer-

tens et Koch Flor. Germ. 1. 715. Kunth Agrost. 436. *Lolium complanatum* Schrader N. Journ. IV. 73. *Lolium maximum* Willdenow Spec. I. 462. —⊙— *Habitat in Europa et Asia media.*

913. **Triticum** Linn.

a. **Spelta** Weizen.

458. **Triticum vulgare** Vill. Flor. Delph. II. 153. Host Gram. III. t. 26. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 696. Kunth Agrost. 438. *Triticum sativum* Lam. Encycl. II. 554. —⊙⊙— *Habitat apud Baschkiros.*

a. Aestivum. Triticum aestivum Linn. spec. 126. —⊙—

β. Hybernum. Triticum hybernum Linn. spec. 126. *Triticum compactum* Host Gram. IV. t. 7. —⊙—

459. **Triticum turgidum** Linn. spec. 126. Host Gram. III. t. 28. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 696. Kunth Agrost. 438. —⊙— *Patria ignota.*

β. Album.

γ Compositum. Triticum compositum Linn. Suppl. 477. Host Gram. III. t. 27.

460. **Triticum durum** Desf. Atl. I. 114. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 697. Kunth Agrost. 439. —⊙— *Colitur in Barbaria et Europa australi.*

β. Hordeiforme. Triticum hordeiforme Host Gram. IV. t. 5.

461. **Triticum villosum** Host Gram. IV. t. 6. —⊙— *Colitur in Europa australi.*

β. Nigricans.

γ. Nigrum.

462. **Triticum polonicum** Linn. spec. 127. Host Gram. III. t. 31. Mert. et Koch Deutschl Flor. I. 697 Kunth Agrost. 439. —⊙— *Patria ignota. Colitur in Europa media.*

463. **Triticum Spelta** Linn. Spec. 127. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 698. Kunth Agrost. 439. *Triticum Zea* Host Gram. III. t. 29. —⊙⊙— *Patria ignota. Colitur in Europa.*

β. Muticum.

γ. *Nigrum.*
δ. *Rufum.*

464. **Triticum monococcum** Linn. Spec. 127. Host Gram. III. t. 32 Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 700. Kunth Agrost. 439. —⊙— *Habitat in Tauria et Caucaso.*

465. **Triticum dicoccum** Schrank Flor. Bav. 389. Schübl. Cereal. 29. f. 2. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 699. Kunth Agrost. 439. *Triticum Spelta* Host Gram. III t 30. —⊙⊙— *Patria ignota. Colitur passim in Europa.*

β. *Atratum. Triticum atratum* Host Gram. IV. t. 8.

466. **Triticum villosum** Beauv. Agrost. 103. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 700. Kunth Agrost. 440. *Agropyrum villosum* Link Hort. I. 31. *Secale villosum* Linn. Spec. 124. Sibth. Flor. Graec. I. t. 97. Host Gram. II. t. 47. —⊙— *Crescit in Europa australi et Oriente.*

467. **Triticum bicorne** Forsk. Descr. 26. Delil. Flor. Aegypt. t. 15. f. 1. —⊙— *Habitat in Aegypto.*

b. **Agropyrum** Palis. Quecke.

468. **Triticum repens** Linn. Spec. 128. Schreb. Gram. II. t. 26. Host Gram. II. t. 21. Kunth Agrost. 440. *Agropyrum repens* Palis Agrost. 102. Roem. et Schult. Syst. II. 754. — ♃ — *Habitat in cultis Europae totius, Sibiriae et Americae borealis.*

β. *Aristatum.* γ. *Firmum* Presl Flor. cech.

469. **Triticum rupestre** Link Enum. I. 98. Kunth Agrost. 441. *Agropyrum ramosum* Link Hort. Berol. 1. 38. — *Patria ignota.*

470. **Triticum littorale** Host Gram. IV. t. 9. Mertens et Koch Deutschl Flor. I. 708. Kunth Synops. 441. *Agropyrum littorale* Reichenb. Flor. Germ. 140. — ♃ — *Habitat in littorali adriatico.*

Var. β Muticum.

471. **Triticum densiflorum** Willdenow Enum. 135. Kunth Agrost. 441. *Agropyrum densiflorum*

Roemer et Schult. Syst. II. 733. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

472. **Triticum sibiricum** Willdenow Enum. 135. Kunth Agrost. 441. *Agropyrum sibiricum* Roemer et Schultes Syst. II. 756. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

473. **Triticum variegatum** Fischer in Sprengel Pugill. II. 21. Link Enum. I. 97. Kunth Agrost. 441. *Agropyrum variegatum* Roemer et Schultes Syst. 759. — ♃ — *Patria ignota.*

474. **Triticum dasyanthum** Sprengel Syst. 1. 36. Kunth Gram. t. 90. Agrost. 441. *Agropyrum dasyanthum* Ledebour in Schult. Mant. II. 410. — ♃ — *Habitat ad Borysthenem.*

475. **Triticum imbricatum** Steven in Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 88. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 709. Kunth Agrost. 442. *Agropyrum imbricatum* Roemer et Schultes Syst. II. 757. — ♃ — *Habitat in Iberia, Tauria, Sibiria.*

476. **Triticum cristatum** Schreb. Gram. XII. t. 23. f. 2. Host Gram. II. t. 24. Kunth Agrost. 443. *Bromus cristatus* Linn. Amoen. acad. II. 339. Spec. 115. *Agropyrum cristatum* Roem. et Schult. II. 758. — ♃ — *Habitat in Hispania, Pannonia, Tauria et Sibiria.*

477. **Triticum pectinatum** Bieb. Flor. I. 87. Willd. Enum. 135. Kunth Agrost. 443. *Triticum cristatum* Pers. Syn. I. 109. *Agropyrum pectiniforme* Roem. et Schult. Syst. II. 758. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

478. **Triticum desertorum** Fisch. in Link Enum. I. 97. Ledeb. Illustr. t. 246. Kunth Agrost. 443. *Agropyrum desertorum* Schult Mant. II. 412. Link Hort I. 35. — ♃ — *Habitat ad fluvium Irtysch.*

479. **Triticum prostratum** Linn. Suppl. 114. Aiton. Hort. Kew. I. 121. Kunth Agrost. 443. *Secale prostratum* Pallas It. I. 485. Jacq. Hort Vindob. III. t. 45. *Agropyrum prostratum* Roemer et Schultes Syst. II. 757. — ⊙ — *Habitat in Europa australi et in Oriente.*

480. **Triticum junceum** Linn. Spec. 108.

Host Gram. III. t. 33. E. B. t. 814. Flor. Dan. t. 916. Sibth. Flor. Graec. I. t. 99. Kunth Agrost. 444. *Bromus truncatus* Scop. Flor. Carn. n. 121. *Triticum farctum* Vivian. Fragm. I. t. 26. *Agropyrum junceum* Beauv. Agrost. 102. — ♃ — *Habitat in Europa, Tauria et Caucaso.*

481. **Triticum canium** Schreb. Spicileg 51. Host Gram. II. t. 25. Mertens et Koch Flor. Deutschl. 1. 709. *Elymus caninus* Linn. Flor. Suec. 2. 112. *Agropyrum caninum* Roem. et Schult. Syst. II. 756. — ♃ — *Habitat in Europa et Sibiria.*

482. **Triticum giganteum** Retz Observ. 7. Roth Catalect. 1. 22. *Agropyrum giganteum* Roemer et Schultes Syst. II. 753. — ♃ — *Habitat in Europa media.*

483. **Triticum squarrosum** Roth Neue Beitr. I. 128. Kunth Agrost. 444. *Triticum patulum* Willd. Enum. 134. *Secale pungens* Pers. Syn. I. 108. *Triticum Buonapartis* Spreng. I. Nachtr. 40. *Triticum planum* Desf. Cat. Hort. Paris. 16. *Agropyrum patulum* Trin. Fund. 152. *Agropyrum squarrosum* Link Hort. Berol. I. 32. — ⊙ — *Habitat in Aegypto.*

484. **Triticum muricatum** Link Enum. I. 97. Kunth Agrost. 443. *Agropyrum muricatum* Schult. Mant. II. 414. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

485. **Triticum pungens** Pers Syn. I. 109. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 704. Kunth Agrost. 444. *Agropyrum repens* Roem. et Schult Syst II. 253. (excl. var. β.) - ♃ — *Habitat in Germania australi et Gallia.*

486. **Triticum glaucum** Desf. Cat. Hort. Paris. 16. DC. Flor. fr. VI. 281. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 705. *Triticum intermedium* Host Gram. II. t. 22. *Triticum rigidum* Schleich. *Agropyrum glaucum* Roem. et Schult. Syst. II. 752. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Germaniae, Helvetiae, Austriae.*

β. *Puberulum.*

487. **Triticum rigidum** Schrad. Ind. Semin. Hort. Goetting. DC. Flor. fr. VI. 282. Schrad. Flor. Germ. I. 392. Kunth Agrost. 445. *Triticum elongatum*

Host Gram. II. t. 23. *Triticum giganteum* Retz **Observ. bot.** Pugill. 7. *Triticum pilosum* Seenus Reis. 71. *Agropyrum rigidum et giganteum* Roem. et Schult. Syst. II. 752. — ♃ — *Habitat in siccis arenosis Europae mediae.*

c. Brachypodium Palis.

488. **Triticum pinnatum** Moench Flor. Hass. n. 102. DC. Flor. fr. VI. 283. Kunth Agrost. 445. *Triticum bromoides* Wib. et Weber. Flor. Holsat. 11. *Bromus pinnatus* Linn Spec. 115 Host Gram. I. t. 22. E. B. t. 730. *Festuca pinnata* Moench Method. 191. *Brachypodium pinnatum* Beauv. Agrost. t. 19. f. 3. Mert. et Koch Flor. Deutschl. I. 692. — ♃ — *Habitat in collibus et dumetis Europae et Sibiriae.*

489. **Triticum caespitosum** DC. Cat. Hort. Monsp. 153. Flor. fr. VI. 284 Kunth Agrost. 446. *Bromus ramosus* Linn. Mant. 34. Sibth. Flor. Graec. I. t. 84 *Bromus Plukenetii* All. Flor. Ped. n. 2283. Host Gram. IV. t. 19. *Brachypodium ramosum* Roem. et Schult. Syst. II. 737. *Brachypodium Plukenetii* Link Hort. I. 49 — ♃ — *Habitat in Europa australi, Oriente et Barbaria.*

490. **Triticum ciliatum** DC. Fl. fr. III. 85. Kunth Agrost. 447. *Bromus distachyus* Linn. Spec. 115. Host Gram. I. t. 20. *Bromus ciliatus* Lam. Flor. fr. III. 609. *Festuca monostachya* Poiret It. II. 98. Desfont. Flor atlant. I. t. 24. *Brachypodium distachyon* Roem. et Schult Syst. II. 741. *Trachynia distachya* Link Hort. Berolin. I. 43 — ⊙ — *Habitat in siccis Europae australis, Barbariae et Orientis.*

491. **Triticum asperum** DC. Catalog. Hort. Monsp. 153. Kunth Agrost. 447. *Festuca rigida* Roth Catalect. I. 12. *Brachypodium asperum* Roemer et Schultes Syst. II. 742. *Brachypodium rigidum* Link Enum. I. 96. *Trachynia rigida* Link Hort. Berolin. I. 43. — ⊙ — *Habitat in Hispania.*

914. Secale Linn. Roggen.

492. **Secale Cereale** Linn. Spec. 124. Willd.

Spec. I. 471. Host Gram. II. t. 48. Kunth Agrost. 449. — ⊙ ⊙ ♃ — *Habitat in desertis ad mare Caspicum.*

β. *Perenne.*

γ. *Archangelicum.*

δ. *Multiculme.*

493. **Secale fragile** Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 93. Kunth Agrost. 449. *Secale spontaneum* Catalog. Hort. Gorenk. *Secale sylvestre* Host Gram. IV. t. 11. *Secale campestre* Schultes österr. Flor. I. n. 437. — ⊙ — *Habitat in Hungaria, Podolia et Tauria.*

915. Elymus Linn. Haargras.

a. Psammochloa E.

494. **Elymus arenarius** Linn Spec. 122. Schreb. Gram. II. t. 40. E. B. t. 1672. Host Gram. IV. t. 12. Kunth Agrost. 450. — ♃ — *Habitat in sterilibus arenosis Europae et Sibiriae.*

495. **Elymus geniculatus** Curt. Obs. 46. Smith Brit. I. 153. E. B. t. 1586. With. Bot. Arr. t. 2. f. 26. Kunth Agrost. 450. — ♃ — *Habitat in littoribus Angliae, Hollandiae.*

496. **Elymus sabulosus** Bieb. Flor. I. 81. Willd. Enum. 130. Kunth Agrost. 451. *Elymus giganteus* Willd. Enum. 130. *Elymus racemosus* Lam. ill. I. 207. *Elymus macrostachys* Schrad. Journ. 1800. II. 196. — ♃ — *Habitat in Tauria, Caucaso et Sibiria.*

b. Elymus.

497. **Elymus sibiricus** Linn. Sp. 123. Schreb. Gram. I. t. 21. f. 1. Willd. Spec. I. 468. Kunth Agrost. 451. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

β. *Ramosus. Elymus ramosus* Desf. Cat. 17. 387. *E. racemosus* Poir. Suppl. 2. 546.

498. **Elymus canadensis** Linn. Spec. 123. Willd. Spec. I. 468. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 89. Kunth Agrost. 451. *Elymus philadelphicus* Linn. Spec. 122. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

499. **Elymus virginicus** Linn. Spec. 123. Willd. Spec. I. 469. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 89. Kunth Agrost. 451. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

500. **Elymus striatus** Willd. Spec. I. 470. Ejusd. Enum. 131. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 89. Kunth Agrost. 451. *Elymus hordeiformis* Hort. Paris. Roem. et Schult. Syst. II. 779. — ♃ — *Crescit in America boreali.*

501. **Elymus europaeus** Linn. Mant. 35. Willd. Spec. I. 470. E. B. t. 1317. Host Gram. I. t. 28. Kunth Agrost. 452. *Secale villosum* Huds. Flor. Angl. I. 46. *Hordeum europaeum* All. Ped. II. 60. — ♃ — *Habitat in sylvaticis montanis Europae et Caucasi.*

502. **Elymus Caput Medusae** Linn. Spec. 123. Schreb. Gram. t. 24. f. 2. Willd. Spec. I. 470. Kunth Agrost. 452. — ⊙ — *Habitat in Lusitania, Hispania, Pannonia.*

503. **Elymus crinitus** Schreb. Gram. t. 24. f. 1. Host Gram. I. t. 27. Sibth. Flor. Graec. I. t. 96. Kunth Agrost. 452. *Hordeum crinitum* Desf. Flor. Atl. I. 113. *Elymus intermedius* Bieb. Flor. I. 82. — ⊙ — *Habitat in Europa austro-orientali et Africa boreali, locis sterilibus.*

504. **Elymus junceus** Fisch. in Act. Mosc. I. 45. c. tab. Ledeb. Flor. Alt. I. 119. Kunth Agrost. 453. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

505. **Elymus subulatus** Forsk. Arab. 26. Kunth Agrost. 454. — ♃ — *Habitat in Aegypto.*

916. Gymnostichum Schreb.

506. **Gymnostichum Hystrix** Schreber Gram. t. 47. *Elymus Hystrix* Linn. Spec. 124. Jacq. Ic. rar. t. 305. *Asprella Hystrix* Willd. Enum. 132. Kunth Agrost. 454. — ♃ — *Habitat in Oriente et America boreali.*

917. Hordeum Linn. Gerste.

507. **Hordeum vulgare** Linn. Spec. 125.

Host Gram. III. t. 34. Willd. Enum. 1037. Kunth Agrost. 455. — ⊙⊙ — *Habitat in Sicilia et Tataria.*

β. *Coeleste. Hordeum coeleste* Viborg Cereal t. 1.

δ. *Nigrum.* Willd. Enum. 1037.

γ. *Hibernum.*

ζ. *Tortile.*

508. **Hordeum hexastichum** Linn. Spec. 125. Viborg. Cereal. t. 2. Host Gram. III. t. 35. Kunth Agrost. 455. — ⊙⊙ — *Patria ignota. Colitur.*

509. **Hordeum distichum** Linn. Spec. 125. Viborg Cereal. t. 3. Willd. Enum. 1038. Host Gram. III. t. 36. Kunth Agrost. 455. — ⊙ — *Habitat in Tataria.*

β. *Nudum* Arduin in Schult. Mant. 2. 437.

510. **Hordeum Zeocriton** Linn. Spec. 125. Schreb. Gram. t. 17. Willd. Enum. 1038. Host Gram. I. t. 37. Kunth Agrost. 455. *Zeocriton commune* Beauv. Agrost. 182. — ⊙ — *Colitur in Europa.*

511. **Hordeum bulbosum** Linn. Spec. 125. Sibth. Flor. Graec. I. t. 98. Host Gram. IV. t. 13. Kunth Agrost. 455. *Hordeum strictum* Desf. Flor. Atl. I. 113. Moris. Histor. III. t. 6. f. 7. — ♃ — *Habitat in Italia, Oriente et Africa boreali.*

512. **Hordeum pratense** Huds. Flor. Angl. 56. E. B. t. 409. Kunth Agrost. 455. *Hordeum secalinum* Schreb. Specil. 148. Host Gram. I. t. 33. Trin. Icon. I. t. 3. *Hordeum nodosum* Linn. Spec. 126. *Hordeum maritimum* Flor. Dan. t. 630. — ♃ — *Habitat in Europa, Asia et America.*

513. **Hordeum murinum** Linn. Spec. 126. Host Gram. I. t. 32. Flor. Dan. t. 629. E. B. t. 1971. Kunth Agrost. 456. *Zeocriton murinum* Beauv. Agrost. 115. — ⊙ — *Habitat in ruderatis, ad vias Europae, Orientis, Africae et Americae australis.*

514 **Hordeum maritimum** With. Bot. Arr. 172. Host Gram. I. t. 34. E. B. t. 1205. Flor. Dan. t. 1632. Kunth Agrost. 456. *Hordeum rigidum* Roth Cat. I. 24. *Hordeum geniculatum* All. Ped. t. 91. f. 3. *Hordeum chilense* Roem. et Schult. Syst. II. 796. *Zeocriton maritimum et rigidum* Beauv. Agrost. 115. — ⊙ —

Habitat in Europa, in Asia occidentali et America meridionali.

918. Aegilops Linn.

515. **Aegilops ovata** Linn. Spec. 1489. Host Gram. II. t. 5. Sibthorp Flor. graec. t. 93. Kunth Agrost. 458. *Aegilops geniculata* Roth Catalect. I. 121. —⊙— *Habitat in Europa australi.*

516. **Aegilops triaristata** Willd. Spec. IV. 943. Kunth Agrost. 458. —⊙— *Habitat in Hispania, Gallia et Italia.*

517. **Aegilops triuncialis** Linn. Spec. 1489. Schreber Gram. t. 10. Host Gram. II. t. 6. Kunth Agrost. 458. —⊙— *Habitat in Gallia australi et Dalmatia.*

518. **Aegilops squarrosa** Linn. Spec. 1489. Schreber Gram. t. 27. f. 2. Kunth Agrost. 458. *Triticum Aegilops* Palisot Agrost. 103. —⊙— *Habitat in Oriente.*

519. **Aegilops caudata** Linn. Spec. 1489. Kunth Agrost. 458. *Aegilops cylindrica* Host Gram. III. t. 7. Sibthorp Flor. Graec. t. 95. —⊙— *Habitat in Hungaria, Italia et Graecia.*

Tribus XII. Rottboelliaceae.

921. Psilurus Trin.

520. **Psilurus nardoides** Trin. Fund. 93. Mertens et Koch. Flor. Deutschl. I. 283. Kunth Agrost. 461. *Nardus aristata* Linn. Spec. 78. *Monerma monandra* Beauv. Agrost. 117. *Asprella nardiformis* Host Gram. IV. t. 29. *Nardus incurva* Gouan. Hort. 33. —⊙— *Habitat in Europa australi.*

922. Lepturus R. Br.

a Myurus.

521. **Lepturus incurvatus** Trin. Fund. 123. Mertens et Koch Flor. Deutschl. I. 723. Kunth Agrost.

462. *Rottboellia incurvata* Linn. Suppl. 114. Sibth. Flor. Graec. I. t. 91. E. B. t. 760. Host Gram. I. t. 23. *Aegilops incurvata* Linn. Spec. 1490. —⊙— *Habitat in Europa, Oriente et Africa boreali.*

β. *Micrurus.*

522. **Lepturus subulatus** Kunth Gram. I. 751. Ejusd. Agrost. 462. *Rottboellia subulata* Savi Bot. Etrusc. I. 27. DC. Flor. fr. VI 281. *Monerma subulata* Beauv. Agrost. 117. *Rottboellia cylindrica* Willd. Spec. I. 464. —⊙— *Habitat in humidis Italiae et Galliae meridionalis.*

γ. *Pholiurus* Trin.

523. **Lepturus pannonicus** Kunth Gram. I. 151. Ejusd. Agrost. 462. *Pholiurus pannonicus* Trin. Fund. 131. *Rottboellia pannonica* Host Gram. I. t. 24. Willd. Enum. 129 *Rottboellia biflora* Roth Beitr. I. 121. —⊙— *Habitat in palustribus Galliae, Pannoniae et Rossiae australis.*

927. Rottboella R. Br.

524. **Rottboella exaltata** Linn. Suppl. 114. R. Brown Prodr. 206. Roxburgh Corom. t. 157. Kunth Agrost. 466. — ♃ — *Habitat inter tropicos Asiae et Novae Hollandiae.*

930. Tripsacum Linn.

525. **Tripsacum monostachyum** Willd. Hort. Berol. I t. 1 Ejusd. Spec. IV. 202. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 88. Kunth Agrost. 469. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

526. **Tripsacum dactyloides** Linn. Spec. 1378. Lam ill. t. 750. Beauv. Agrost. t. 22. f. 1. Kunth Agrost. 469. — ♃ — *Habitat in America boreali et insulis Indiae occidentalis.*

Tribus XIII. Andropogoneae.

933. **Perotis** Ait.

527. **Perotis latifolia** Aiton Hort. Kew. ed. 1. I. 85. Willdenow Spec. I. 324. Kunth Gram. t. 92. Agrost. 470. *Anthoxanthum indicum* Linn. Spec. 40. *Saccharum spicatum* Linn Spec. 79. — ♃ — *Habitat in India orientali et in Capite bonae spei.*

Radix diuretica.

939. **Saccharum** Linn. Zuckerrohr.

528. **Saccharum officinarum** Linn. Spec. 79. Willdenow Spec. 1. 381. Tussac Flor. antill. I. t. 23. Hooker Bot. Miscell. I. 95. t. 26. Kunth Agrost. 474. — ♃ — *Colitur inter tropicos totius orbis.*

940. **Imperata** Cyrill. Walzenrohr.

529. **Imperata arundinacea** Cyrill. Ic. II. t. 11. Kunth Agrost. 477. *Imperata cylindrica* Palisot Agrost. 7. t. 5. f. 1. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 536. *Saccharum cylindricum* Lam. Dict. I. 588. t. 40. f. 2. *Lagurus cylindricus* Linn. Spec 120. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea, Senegambia, Capite bonae spei, India orientali et Chili.*

942. **Erianthus** Rich. Ravennarohr.

530. **Erianthus Ravennae** Palisot. Agrost. 14. Römer et Schultes Syst. II 323. Kunth Agrost. 479. *Saccharum Ravennae* Linn. Syst. 88. Willdenow Spec. I, 322. Host Gram. III. t. 1. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 537. *Andropogon Ravennae* Linn. Syst. 1481. *Rhipidium Ravennae* Trinius Fund. 169. — ♃ — *Habitat in littoribus maris adriatici et caspici.*

948. **Apluda** Linn.

531. **Apluda aristata** Linn. Spec. 1487. Schreber Gram. II. t. 42. Willdenow Spec. IV. 938.

Lam. Ill. t. 841. f. 2. Kunth Agrost. 516. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

950. Andropogon Linn.

532. **Andropogon Allionii** DC. Flor. fr. III. 97. Humb. et Kunth Nov. Gen. I. 185. Kunth Agrost. 486. *Andropogon contortum* All. Flor. Pedem. t. 91. f. 4. *Heteropogon Allionii* Roem. et Schult. Syst. II. 835 — ♃ — *Habitat in regione mediterranea et Mexico.*

533. **Andropogon fuscatus** Muehlb. in Willd. Spec. IV. 919. Kunth Agrost. 492. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

534. **Andropogon lanceolatus** Roxburgh Flor. ind. 1. 262. Kunth Agrost. 498. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

535. **Andropogon pertusus** Willd. Spec. IV. 922. R. Brown prodr 201. Roxburgh Flor. ind. 1. 263. Kunth Agrost. 498. *Holcus pertusus* Linn. Mant. 301. — ♃ — *Habitat in India orientali et Nova Hollandia.*

536. **Andropogon Bladhii** Retz Observ. II. 27. Willdenow Spec. IV. 920. Roxburgh Flor. ind. I. 263. Kunth Agrost. 498. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

537. **Andropogon Ischaemum** Linn. Spec. 1483. Host Gram. II. t. 2. Jacq. Flor. Austr. t. 384. Schreb. Gram. t. 33. Kunth Agrost. 499. *Andropogon angustifolius* Smith Prodr. Flor. Graec. I. 47. — ♃ — *Habitat in Europa calidiore, Caucaso, Capite bonae spei et India orientali, in pratis siccis.*

538. **Andropogon provincialis** Lam. Encycl. I. 376. DC. Flor. fr. III. 96. Kunth Agrost. 499 *Andropogon Ischaemum* Herb. Linn. — ♃ — *Habitat in Gallia australi.*

539. **Andropogon comosus** Spreng. Nov. prov. 5. Syst. 1. 287. Link Enum. 1. 106. Kunth Agrost. 500. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

540. **Andropogon Sorghum** Brot. Flor. Lusit. I. 88. Kunth Agrost. 501. *Sorghum vulgare* Pers.

Synops. I. 101. Host Gram. IV. t. 2. *Holcus Sorghum* Linn. Spec. 1484. — Moorhirse —☉— *Habitat in India orientali.*

β. *Nigrum. Andropogon niger* Kunth Agrost. 501.

γ. *Rubrum.*

541. **Andropogon cernuus** Roxb. Flor. Ind. I. 273. Kunth Agrost. 501. *Sorghum cernuum* Willd. Enum. 1036. Host Gram. IV. t. 3. *Holcus cernuus* Willd. Spec. IV. 490. —☉♃— *Colitur in Bengalia.*

542. **Andropogon halepensis** Sibthorp Flor. Graec. t 68. Mertens et Koch Deutschl. Fl. I. 542. Kunth Agrost. 502. *Holcus halepensis* Linn. Spec. 1485. Schreber Gram. t. 18. Host Gram. 1. t. 1. *Blumenbachia halepensis* Koeler Gram. 29. *Sorghum halepense* Persoon Encheir. 1. 101. —♃— *Habitat in Europa australi, Oriente et inter tropicos Asiae et Americae.*

Radix Smilaci asperae L. succedanea, in officinis Italiae sub nomine Gramignone et Smilace dolce servatur.

543. **Andropogon strictus** Host Gram. I. t. 2. Kunth Agrost. 503. *Saccharum strictum* Spreng. Pugill. II. 16. *Rhipidium strictum* Trin. Fund. 169. —♃— *Habitat in Hungaria, Gallia australi et Oriente.*

544. **Andropogon avenaceus** Michaux Flor. Bor. Amer. 1. 58. Willdenow Spec. IV. 907. Kunth Agrost. 503. —♃— *Habitat in America boreali.*

545. **Andropogan nutans** Linn. Spec. 1480. Kunth Agrost. 504. —♃— *Habitat in America boreali et Jamaica.*

546. **Andropogon Gryllus** Linn. Spec. 1480. Host Gram. II. t. 1. Sibth. Flor. Graec. I. t. 67. Kunth Agrost. 504. *Andropogon paniculatus* Lam. Ill. t 840. f. 1. *Holcus Gryllus* R. Br. Prodr. Flor. Nov. Holland. I. 199. *Chrysopogon Gryllus* Trin. Fund. 188. —♃— *Habitat in regione mediterranea, India orientali et Nova Hollandia.*

547. **Andropogon Nardus** Linn. Spec. 1482. Kunth Agrost. 506. *Andropogon citriadorus* Hort. Paris. —♃— *Habitat in India orientali.*

Offic. exolet. Nardus indica sive Spica Nardi spuria.

951. **Ischaemum** Linn.

548. **Ischaemum rugosum** Willden. Spec. IV. 940. Kunth Agrost. 513. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

Ordo IX. Cyperaceae.

957. **Carex** Michel. Rietgras.

549. **Carex Davalliana** Sm. in Linn. Transact. V. 266. E. B. t. 2123. Kunth Cyper. 369. *Carex dioeca* Willd. Prodr. 36. Host Gram. I. t. 41. Schk. Caric. t. Q. W. f. 2. — ♃ — *Habitat in pratis humidis Europae occidentalis.*

550. **Carex pulicaris** Linn. Spec. II. 1380. Host Gram. IV. t. 75. Schk. Caric. t. A. f. 3. E. B. t. 1051. Kunth Cyper. 370. — ♃ — *In pratis paludosis Europae.*

551. **Carex divisa** Huds. Flor. Angl. 405. Schk. Car. t. R. Vv. f. 61. E. B. t. 1096. DC. Flor. fr. III. 105. Kunth Cyper. 372. excl. syn. — ♃ — *In palustribus ad lacus Europae et Caucasi.*

552. **Carex schoenoides** Host Gram. I. t. 45. DC. Flor. fr. III. 104. Willd. Spec. IV. 226. *Carex austriaca* Schk. Caric. II. t. Qqq. f. 157. *Carex divisa* Kunth Cyper. 372. p. part. — ♃ — *Crescit in collibus siccis Europae calidioris.*

553. **Carex stenophylla** Wahlb. in Act. Holm. 1803. 142. Willd. Spec. IV. 218. Kunth Cyper. 374. *Carex glomerata* Host Gram. I. t. 44. *Carex juncifolia* Schk. Caric. I. t. G. Ji. f. 32. — ♃ — *Habitat in arenosis, sterilibus, siccis Europae et Asiae occidentalis.*

554. **Carex arenaria** Linn. Spec. II. 1381. Schk. Caric. I. t B Dd. f. 6 E. B. t. 928. Host Gram. I. t. 49 DC. Flor. fr. III. 103. Kunth Cyper. 376. — ♃ — *Crescit in arenosis sterilibus Europae et Americae borealis passim.*

Officin. exolet. Radix Sassaparillae germanicae s. Graminis majoris v. rubri.

555. **Carex intermedia** Good. in Linn. Trans. II. 154. Schk. Caric. I. t. B. f. 7. Host Gram. I. t. 60. E. B. t. 2042. Kunth Cyper. 376. *Carex disticha* Huds. Flor. Angl. 403. — ♃ — *Habitat ad aquas Europae et Sibiriae.*

556. **Carex stipata** Mühlb. msc. Schk. Car. II. t. Hhh. f. 132. Willd. Spec. IV. 233. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 35. Kunth Cyper. 382. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

557. **Carex vulpina** Linn. Spec. II. 1382. Schk. Caric. I. II. t. C. f. 10. Host Gram. I. t. 56. E. B. t. 307. Gaud. Agrost. II. 91. Kunth Cyper. 383. excl. syn. p. part. — ♃ — *Ad fossas et in pratis palustribus Europae, Asiae et Americae borealis.*

β *Nemorosa. Carex nemorosa* Rebent. Prodr. 71. Host Gram. IV. t. 81.

558. **Carex muricata** Linn. Spec. II. 1382. Schk. Caric. I. II. t. E. Dd. f. 22. Host Gram. I. t. 54. E. B. t. 1096. Gaud. Agrost. II. 93. Kunth Cyper. 384. — ♃ — *Habitat in pratis et nemoribus Europae, Americae et Asiae borealis.*

β. *Loliacea. Carex loliacea* Schreb. Specileg. 64. Schk. Caric. II. t. Dddd. f. 186.

559. **Carex nubigena** Don Prodr. Flor. Nep. 42. Nees in Wight Bot. 120. Kunth Cyper. 385. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

560. **Carex divulsa** Good. in Linn. Trans. II. 160. Schk. Caric. I. II. t. Dd. Ww. f. 89. Host Gram. I. t. 55. E. B. t. 629. Gaud. Agrost. I. 95. Kunth Cyper. 385. — ♃ — *Habitat in nemorosis Europae, Asiae et Americae borealis.*

561 **Carex rosea** Schk. Caric. II. t. Zzz. f. 179. Willd. Spec. IV. 237. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 36. Kunth Cyper. 386. — ♃ — *Crescit in America boreali.*

562. **Carex retroflexa** Mühlb. msc. Schk. Caric. II. t. Kkk. f. 140. Willd. Spec. IV. 235. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 35. Kunth Cyper. 386. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

563. **Carex multiflora** Mühlb. msc. Schk.

Caric. II. LII. f. 144. Willd. Spec. IV. 243. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 36. Kunth Cyper. 387. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

564. **Carex leiorrhyncha** C. A. Mey. Cyper. nov. t. 9. Kunth Cyper. 388. *Carex nemorosa* Hort. Berol. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

565. **Carex paniculata** Linn. Spec. II. 1383. Host Gram. I. t. 58. Schk. Caric. I. t. D. f. 20 et II. 1. Ttt. f. 163. E. B. t. 1064. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 36. Kunth Cyper. 389. — ♃ — *Habitat in paludibus Europae et Americae borealis.*

566. **Carex cyperoides** Linn. Syst. 703. Host Gram. I. t. 43. Schk. Caric. I. II. t. A. f. 5. Willd. Spec. IV. 215. Ledeb. Flor. Alt. IV. 206. Kunth Cyper. 392. — ⨀ — *Habitat in Europa media et Sibiria, ad lacus, fluvios.*

567. **Carex leporina** Linn. Spec. 1381. Flor. Dan. t. 294. Schk. Caric. II. t. Fff. f. 129. Host Gram. IV. t. 80. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 36. Kunth Cyper. 393. *Carex approximata* Hoppe exsicc. DC. Flor. VI. 290, — ♃ — *Habitat in alpibus Europae, in America et Asia boreali.*

568. **Carex Heleonastes** Linn. Suppl. 414. Schk. Caric. I. II. t. Ii. f. 97. Willd. Spec. IV. 288. Kunth Cyper. 393. — ♃ — *Habitat in Sveciae, Salisburgi et Bavariae paludibus.*

569. **Carex brizoides** Linn. Spec. II. 1388. Schk. Caric. I. t. C. U. f. 12. Host Gram. I. t. 47. Willd. Spec. IV. 233 Gaud. Agrost. II. 102. Kunth Cyper. 394. — ♃ — *Habitat in nemoribus Europae.*

570. **Carex Schreberi** Willd. in Act. Acad. Berol. 1794. 38. Host Gram. I. t. 46. Schk. Caric. I. II. t. B. f. 9. Willd. Spec. IV. 225. Gaud. Agrost. II. 109. Kunth Cyper. 395. — ♃ — *Habitat in graminosis siccis Europae, Asiae.*

571. **Carex ovalis** Good. in Linn. Trans. II. 148. Host Gram. I. t. 51. Flor. Dan. t 1115. Schk. Caric. I. II. t. B. f. 8. E. B. t. 306. Kunth Cyper. 395. *Carex leporina* Linn. Flor. Suec. Gaud. Agrost.

II. 105. — ♃ — *Habitat in pratis humidis Europae et Americae borealis.*

572. **Carex scoparia** Schk. Car. II. t. Xxx. f. 175. Willd. Spec. IV. 230. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 37. Kunth Cyper. 396. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

573. **Carex foenea** Willd. Enum. II. 957. Mühlb. Gram. 227. Kunth Cyper. 397. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

574. **Carex lagopodioides** Schk. Caric. II. t. Yyy. f. 177. Willd. Spec. IV. 230. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 37. Mühlb. Gram. 226. Kunth Cyper. 398. *Carex tribuloides* Wahlenb. in Act. Holm. 1803. p. 145. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

575. **Carex straminea** Schk. Caric. I. t. G. f. 34 et II. t. Xxx. f. 174. Willd. Spec. IV. 242. Mühlb. Gram. 229. Kunth Cyper. 398. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

576. **Carex stellulata** Good. in Linn. Trans. II. 144 Schk. Caric. I. II. t. C. f. 14. Host Gram. I. t. 53. E. B. t. 806. DC. Flor. fr. III. 112. Gaud. Agrost. II. 100. Kunth Cyper. 399. *Carex echinata* Hoffm. Germ. 326. Host Syn. 505. — ♃ — *Habitat in pratis palustribus Europae, ad mare Caspicum et in America boreali.*

577. **Carex festucacea** Schk. Caric. II. t. Www. f. 173. Willd. Spec. IV. 242. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 38. Mühlb. Gram. 249. Kunth Cyper. 401. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

578. **Carex canescens** Linn. Flor. Suec. 754. Spec. plant. II. 1383. Flor. Dan. t. 285. *Carex curta* Good. in Linn. Trans. II. 145. Host Gram. I. t. 48. Schk. Caric. I. II. t. C. f. 13. Kunth Cyper. 403. — ♃ — *Habitat in pratis humidis Europae, Asiae et Americae borealis.*

579. **Carex Boenninghauseniana** Weihe ex Kunth Cyper. 404. *Carex guestphalica* Hort. — ♃ — *Habitat in Guestphalia.*

580. **Carex remota** Linn. Spec. II. 1382. Host

Gram. I. t. 52. E. B. t. 832. Schk. Caric. I. II. t. E. f. 23. Flor. Dan. t. 370. Gaud. Agrost. II. 99. Kunth Cyper. 404. —♃— *Habitat in humidis umbrosis Europae, Asiae et Americae arcticae.*

581. **Carex caespitosa** Linn. Spec. II. 1388. Host Gram. I. t. 91. Schk. Caric. I. II. t. Aa et Bb. f. 85. E. B. t. 1507. Flor. Dan. t. 1281. Gaud. Agrost. I. 119. Kunth Cyper. 411. —♃— *Habitat in pratis palustribus Europae, Asiae borealis et Americae arcticae.*

582. **Carex acuta** Good. in Linn. Trans. II. 203. E. B. t. 580. Schk. Caric. I. II. t. Ee et Ff. f. 92. Host Gram. I. t. 95. Gaud. Agrost. II. 123. Kunth Cyper. 412. —♃— *Habitat ad aquas et paludes Europae, Caucasi et Americae borealis.*

583. **Carex stricta** Good. in Linn. Trans. II. 196. t. 21. f. 9. Schk. Caric. I. II. t. V. f. 73. Host Gram. I. t. 94. E. B. t. 914. DC. Fl. fr. III. 144. Kunth Cyper. 414. —♃— *Habitat in fossis Europae et Americae arcticae.*

584. **Carex maritima** Vahl in Act. Soc. hist. nat. Hafn. II. 13. Retz Prodr. n. 1173. Schk. Caric. II. t. W. f. 74. Flor. Dan. t. 703. Kunth Cyper. 416. —♃— *Crescit in littoribus Norvegiae, Islandiae.*

585. **Carex rupestris** All. Pedem. t. 92. f. 1. Schk. Caric. II. t. Nnnn. f. 200. Kunth Cyper. 426. *Carex petraea* Schk. Caric. II. Kkk. f. 139. Host Gram. IV. t. 76. —♃— *Habitat in alpibus Europae et Dahuriae.*

586. **Carex Buxbaumii** Wahlb. in Act. Holm. 1803. 163. Willd. Spec. IV. 252. Schk. Caric. II. 45. Reichenb. Flor. exc. 62. *Carex polygama* Schk. Caric. I. t. X. Gg. f. 76. —♃— *Habitat in Europae mediae et borealis et Americae paludibus.*

587. **Carex formosa** Dewey in Sillim. Amer. Journ. VIII. 98. t. B. f. 6. Kunth Cyper. 430. —♃— *Habitat in America boreali.*

588. **Carex atrata** Linn. Spec. II. 1386. Schk. Caric. II. t. X. f. 77. Flor. Dan. t. 158. Host Gram. I. t. 88. E. B. t. 2044. Reichb. Flor. exc. 62. Gaud.

Agrost. II. 114. Kunth Cyper. 433. — ♃ — *Habitat in alpibus montibusque Europae, Asiae et Americae borealis.*

589. **Carex aterrima** Hoppe in Denksch. d. Regensb. bot. Gesellsch. 1815. t. 3. f. o. p. q. Kunth Cyper. 434 *Carex nigra* Schk. Caric. II. 38. t. Aaa. f. 115. — ♃ — *Habitat in summis alpibus Carinthiae et Salisburgiae.*

590. **Carex nigra** All. Ped. n. 2310. DC. Flor. fr. III. 113. Reichb. Flor. exc. 62. Kunth Cyper. 435. *Carex parviflora* Host Gram. I. t. 87. Schk. Caric. II. t. LIII. f. 197. Willd. Spec. IV. 253. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae, in Caucaso et America boreali.*

591. **Carex montana** Linn. Flor. Suec. 845. Host Gram. I. t. 66. Schk. Caric. I. II. t. F. f. 29. Flor. Dan. t. 1769. Gaud. Agrost. II. 129. *Carex collina* Willd. Spec. IV. 260. Kunth Cyper. 437. — ♃ — *In montibus Europae nemorosis.*

592. **Carex praecox** Jacq. Flor. Aust. t. 446. Host Gram. I. t. 68. Schk. Caric. I. II. t. F. f. 27. DC. Flor. fr. III. 115. E. B. t. 1099. Flor. Dan. t. 1527. Kunth Cyper. 439. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, Asiae et Americae borealis.*

593. **Carex longifolia** Host Gram. IV. t. 85. *Carex umbrosa* Kunth Cyper. 439. p. parte. Schk. Caric. II. t. Ffff. f. 190. *Carex polyrrhiza* Wallr. Sched. crit. 492. — ♃ — *Habitat in nemorosis Germaniae et Galliae.*

594. **Carex pilulifera** Linn. Spec. II. 1385. Schk. Car. I. II. t. I. f. 39. E. B. t. 885. DC. Flor. fr. III. 117. Host Gram. IV. t. 84. Kunth Cyper. 439. — ♃ — *Habitat in nemoribus Europae occidentalis.*

595. **Carex tomentosa** Linn. Mant. 123. Schk. Caric. I. II. t. F. f. 28. E. B. t. 2046. Host Gram. I. t. 82. Gaud. Agrost. II. 127. Kunth Cyper. 440. — ♃ — *Habitat in pratis palustribus Europae et Asiae occidentalis.*

596. **Carex supina** Wahlb. in Act. Holm 1803. 158. Willd. Spec. IV. 265. Schk. Caric. II. 51. Kunth Cyper. 444. *Carex campestris* Host Gram. IV. t. 88.

Carex glomerata Schk. Caric. — ♃ — *Crescit in collibus apricis Europae mediae et Asiae occidentalis.*

597. **Carex nitida** Host Gram. I. t. 71. Willd. Spec. IV. 284. DC. Flor. fr. VI. 279. Gaud. Agrost. II. 162. *Carex verna* Schk. Caric. I. II. t. L. f. 46. Kunth Cyper. 445. p. part. — ♃ — *Habitat in collibus siccis arenosis Europae mediae et Sibiriae.*

598. **Carex flava** Linn. Spec. II. 1384. Host Gram. I. t. 63. Schk. Caric. I. II. t. H. f. 36. E. B. t. 1294. Gaud. Agrost. II. 147. Reichenb. Flor. exc. 70. Kunth Cyper. 446. excl. var. γ. — ♃ — *Habitat in pratis humidis et paludibus Europae et Americae borealis.*

β. *Patula. Carex patula* Host Gram. I. t. 64.

599. **Carex Oederi** Retz. Schkuhr Caric. I. t. F. f. 26. Host Gram. I. t. 65. E. B. t. 1773. Reichenb. Flor. exc. 70. *Carex flava* γ. Kunth Cyper. 446. — ♃ — *Habitat in palustribus Europae.*

600. **Carex extensa** Good. in Linn. Trans. II. 175. t. 21. f. 7. Schk. Caric. I. II. t. V. et Xx. f. 72. Flor. Dan. t 1709. Host Gram. I. t. 73. E. B. t. 833. Kunth Cyper. 447. — ♃ — *Habitat in Europa, Tauria et Africa boreali.*

601. **Carex diluta** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. II. 388. Kunth Cyper. 448. — ♃ — *Habitat in Iberia et Caucaso.*

602. **Carex distans** Linn. Spec. II. 1387. Flor. Dan. t. 1049. Schk. Caric. I. II. t. T. et Yy. f. 68. E. B. t. 1234. Host Gram. I. t. 77. Gaud. Agrost. II. 151. Kunth Cyper. 449. — ♃ — *Crescit in pratis palustribus Europae, Asiae occidentalis et Americae borealis.*

603 **Carex Hostiana** DC. Cat. 88. Reichenb. Flor. exc. 66. Kunth Cyper. 450. *Carex fulva* Host Gram. IV. t. 95. — ♃ — *Habitat loca palustria Austriae.*

604. **Carex Hornschuchiana** Hoppe Caric. 76. Reichenb. Flor. exc. 65. Kunth Cyper. 451. — Carex binervis Wahlb. in litt. — ♃ — *Habitat in pratis palustribus Germaniae.*

605. **Carex granularis** Mühlb. msc. Schk. Caric. II. t. Vvv. f. 169. Willd. Spec. IV. 279. Pursh

Flor. Bor. Amer. I. 42. Mühlb. Gram. 247. Kunth Cyper. 457. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

606. **Carex pallescens** Linn. Spec. II. 1386. Host Gram. I. t. 74. Schk. Caric. I. II. t. Kk. f. 99. E. B. t. 2185. Flor Dan. t. 1050. Reichenb. Flor. exc. 66. Gaud. Agrost. II. 159. Kunth Cyper. 458. — ♃ — *Habitat in pratis humidis sylvaticis Europae, ad mare caspicum et in America boreali.*

607. **Carex glauca** Scop. Carn. n. 1157. Schk. Caric. II. 80. Reichenb. Flor. exc. 66. Kunth Cyper. 459. *Carex flacca* Schreb. Spicil. 150. Host Gram. I. t. 90. Schk. Caric. I. t. O. P. f. 57. *Carex recurva* Huds. Flor. Angl. 413. E. B. t. 1506. — ♃ — *Habitat in palustribus, praeprimis sylvaticis, Europae et Americae borealis.*

608. **Carex panicea** Linn. Spec. II. 1387. Flor. Dan. t. 261. Host Gram. I. t. 79. Schk. Caric. I. II. t. Ll. f. 100. E. B. t. 1505. Reichenb. Flor. exc. 66. Kunth Cyper. 460. — ♃ — *Habitat in pratis humidis Europae, Asiae et Americae borealis.*

609. **Carex ustulata** Wahlb. in Act. Holm. 1803. 156. E. B. t. 2400. Wahlb. Lapp. 238. Flor. Dan. t. 1590. Reichenb. Flor. exc. 69. Kunth Cyper. 462. *Carex atrofusca* Schk. Caric. I. t. Y. f. 82. — ♃ — *Habitat in alpibus et montibus Europae, Asiae et Americae borealis.*

610. **Carex frigida** All. Ped. n. 2344. Willd. Spec. IV. 275. Host Gram. IV. t. 90. *Carex fuliginosa* Schk Caric. I. II. t. Cc. f. 47. *Carex approximata* All. Ped. n. 2313 Schk. Caric. II. t. Iii. f. 137. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae, in Asia et America antarctica.*

611. **Carex firma** Host Syn. 509. Ejusd. Gram. I. t. 75. Schk. Caric. I. t. O. Y. f. 54. Willd. Spec. IV. 286. Reichenb. Flor. exc. 68. Kunth Cyper. 464. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae.*

612. **Carex ferruginea** Schk. Caric. II. t. M. f. 48. DC. Flor. fr. II. 123. Reichenb. Flor. exc. 68. Kunth Cyper. 464. *Carex varia* Host Gram. I. 59.

t. 80 *C. saxatilis* All. Ped. n. 2332. — ♃ — *In alpibus Europae mediae.*

613. **Carex tenuis** Host Gram. IV. t. 92. *Carex brachystachys* Schrank Bav. I. 294. Schk. Caric. I. 98. II. t. P. f. 58. Kunth Cyper. 467. *Carex compressa* Kit. in Willd. Spec. IV. 276. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae.*

614. **Carex juncea** Willd. Enum. Suppl. 63. Link Enum. II 381. Kunth Cyper. 468. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

615. **Carex maxima** Scop. Carn. n. 1166. *Carex pendula* Huds. Flor. Angl. 411. Host Gram. I. t. 100. E. B. t. 2315. Kunth Cyper. 469. *Carex agastachys* Ehrh. Phyt. n. 19. — ♃ — *Habitat in nemorosis humidis Europae mediae et australis, in Tauria.*

616. **Carex sylvatica** Huds. Flor. Angl. 411. Flor. Dan. t. 404. E B. t. 995. Host Gram. I. t. 84. *Carex drymeja* Linn. Suppl. 414. Kunth Cyper. 470. — ♃ — *Habitat in nemorosis subhumidis Europae, Asiae et Americae borealis.*

617. **Carex capillaris** Linn. Spec. II. 1386. Schk. Caric. I. II. t. O. f. 56. Host Gram. I. t. 62. Wahlb. Flor. Lapp. 238. Gaud. Agrost. IV. 177. Kunth Cyper. 472. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae, in demissis Asiae et Americae arcticae.*

618. **Carex digitata** Linn. Spec. II. 1384. Host Gram. I. t. 60. Schk. Caric. I. II. t. H. f. 38. E. B. t. 615. Flor. Dan t. 1466. Gaud. Agrost. II. 142. Kunth Cyper. 473. — ♃ — *Habitat in nemoribus Europae, Tauriae et Caucasi.*

619. **Carex ornithopoda** Willd. Spec. IV. 255 Flor. Dan. t. 1405. Gaud. Agrost. II. 144. Kunth Cyper. 473. *Carex pedata* All. Ped. n. 2320. Host Gram. I. t. 61. Schk. Caric. I. t. H. f. 37. — ♃ — *Habitat in subalpinis Europae mediae et in montanis borealis.*

620. **Carex alba** Scop. Carn. n. 1148. All. Ped. n. 2322. Host Gram. I. t. 59. Schk. Caric. I. II. t. O. f. 54. Gaud. Agrost. II. 145. Kunth Cyper. 474.

— ♃ — *Habitat in montanis nemorosis Europae mediae et Americae borealis.*

621. **Carex humilis** Leyss. Flor. Hall. n. 952. Host Gram. I. t. 67. Reichenb. Flor. exc. 62. *Carex clandestina* Good. in Linn. Trans. II. 167. Schk. Caric. I. II. t. K. f. 43. Kunth Cyper. 476. — ♃ — *Habitat in collibus sterilibus apricis Europae et Asiae occidentalis.*

622. **Carex Michelii** Host Syn. 507. Ejusd. Gram. I. t. 72. Schk. Caric. I. II. t. P. et Vv. f. 58. Reichenb. Flor. exc. 67 Kunth Cyper. 476. — ♃ — *Habitat in nemorosis Europae mediae et meridionalis nec non Caucasi.*

623. **Carex depauperata** Good. in Linn. Trans. II. 181. Schk. Caric. II. 66. Willd. Spec. IV. 278. E. B. t. 1098. Kunth Cyper. 477. — ♃ — *Habitat in Anglia, Gallia, Italia.*

624. **Carex alpestris** All. Ped. n. 2329. Reichenb. Flor. exc. 65. Kunth Cyper. 479. *Carex gynobasis* Vill. Delph. II. 207. Schk. Car. I. t. G. f. 35. *Carex diversiflora* Host Gram. I. t. 70. — ♃ — *Habitat in montanis Europae calidioris et ad mare Caspicum.*

625. **Carex filiformis** Linn. Spec. II. 1385. Schk. Caric. I. II. t. K. f. 45. Host Gram. I. t. 86. E. B. t. 904. Flor. Dan. t. 379. Kunth Cyper. 484. — ♃ — *Habitat in palustribus Europae mediae et borealis et Americae septemtrionalis.*

626. **Carex hirta** Linn. Spec. II. 1389. Host Gram. I. t. 96. Schk. Caric. II. t. Uu. f. 108. E. B. t. 685. Gaudin Agrost. II. 178. Kunth Cyper. 485. — ♃ — *Habitat in humidis et siccis Europae, Tauriae et Caucasi.*

627. **Carex hordeiformis** Host Gram. I. t. 76. *Carex secalina* Wahlb. in Act. Holm. 1803. 151. Schk. Car. II. t. S. f. 65. Kunth Cyper. 486. — ♃ — *In humidis, ad lacus Europae mediae et Tauriae.*

628. **Carex paludosa** Good. in Trans. Linn. II. 202. Schk. Caric. I. II. t. Oo et Vv. f. 101. Host Gram. I. 68. t. 92. E. B. t. 807. Gaud. Agrost. II. 182. Kunth Cyper. 487. *Carex acutiformis* Ehrh. Gram.

30. — ♃ — *Habitat in palustribus Europae, Caucasi, Nepaliae et Brasiliae.*

629. **Carex nutans** Host Gram. I. t. 83. Schk. Caric. II. t. Qqqq. f. 205. Ledeb. Flor. Alt. IV. 220. Reichenb. Flor. exc. 69. Kunth Cyper. 488. — ♃ — *Crescit in humidis palustribus, ab Austria ad Tatariam montesque altaicos.*

630. **Carex riparia** Curt. Flor. Lond. IV. t. 60. Schk. Caric. I. II. t. Qq et Rr. f. 105. E. B. t. 579. DC. Flor. fr. III. 130. Gaud. Agrost. II. 184. Kunth Cyper. 489. *Carex crassa* Ehrh. Beitr. IV. 43. Host Gram. I. t. 93. — ♃ — *Crescit ad aquas Europae et Asiae occidentalis.*

631. **Carex laevigata** Sm. in Linn. Trans. V. 272. Schk. Caric. II. t. Sss. f. 162. E. B. t. 1387. Willd. Spec. IV. 295. Kunth Cyper. 493. — ♃ — *Habitat in Anglia, Gallia et Lusitania.*

632. **Carex ampullacea** Good. in Linn. Trans. II. 207. Host Gram. I. t. 99. Schk. Caric. I. II. t. Tt. f. 107. DC. Flor. fr. III. 136. E. B. t. 780. Kunth Cyper. 494. — ♃ — *Crescit in aquosis, paludibus Europae, Asiae occidentalis et Americae borealis.*

633. **Carex rostrata** Mühlb. msc. Schk. Caric. II. t. Hhh. f. 134. Willd. Spec. IV. 282. Kunth Cyper. 496. *Carex tentaculata* Mühlb. msc. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 41. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

634. **Carex folliculata** Linn. Spec. II. 1387. Schk. Caric. I. II. t. N. f. 52. Willd. Spec. IV. 281. Pursh Flor. Bor. Amer. I. 42. Kunth Cyper. 498. — ♃ — *Habitat in Pensylvania, Virginia et Carolina.*

635. **Carex Pseudo-Cyperus** Linn. Spec. II. 1387. Schk. Caric. I. II. t. Mm. f. 102. Host Gram. I. t. 85. E. B. t. 242. Reichenb. Flor. exc. 70. Kunth Cyper. 501. — ♃ — *Habitat in aquis stagnantibus Europae, Americae borealis et Novae Hollandiae.*

636. **Carex! vesicaria** Linn. Spec. II. 1388. (excl. β.) Host Gram. I. t. 98. Schk. Caric. I. II. t. Ss. f. 106. E. B. t. 779. Gaud. Agrost. II. 187. Kunth

Cyper. 494. — ♃ — *Habitat in palustribus Europae, Asiae et Americae borealis.*

637. **Carex Ecklonii** Nees in Linnaea X. 203. Kunth Cyper. 517. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

961. Elyna Schrad.

638. **Elyna spicata** Schrad. Germ. I. 155. Mert. et Koch Deutschl. Flor. I. 457. Ledeb. Flor. Alt. IV. 235. Kunth Cyper. 533. *Carex Bellardi* All. Ped. t. 92. f. 2. Host Gram. IV. t. 77. Schk. Caric. I. t. D. f. 16. — ♃ — *Habitat in alpibus europaeis summis, lapponicis, altaicis et caucasicis.*

980. Cladium P. Br. Schneide.

639. **Cladium Mariscus** R. Br. Prodr. 236. Kunth Cyper. 303. *Cladium germanicum* Schrad. Germ. I. t. 5. f. 7. Mert. et Koch Deutschl. Flora I. 360. *Schoenus Mariscus* Linn. Spec. I. 62. Host Gram. III. t. 53. E. B. t. 950. — ♃ — *Habitat in paludibus Europae, Asiae, Capitis bonae spei, Jamaicae et Novae Hollandiae.*

995. Fuirena Rottb.

640. **Fuirena umbellata** Rottboell Gram. 70. t. 19. f. 3. Vahl Enum. II. 383. Kunth Cyper. 185. — ♃ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

997. Ficinia Schrad.

641. **Ficinia scariosa** Nees in Linnaea. IX. 292. Kunth Cyper. 251. *Scirpus trigynus* Linn. Mant. 180. *Scirpus bulbosus* Rottb. Gram. 46. t. 16. f. 2. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

998. Fimbristylis Vahl.

642. **Fimbristylis globulosa** Wall. cat. n. 3518. Kunth Cyper. 231. *Fimbristylis umbellaris* Vahl

Enum. II 291. *Scirpus globulosus* Retz Obs. VI. 19. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

999. Isolepis R. Br.

643. **Isolepis Holoschoenus** Roem. et Schult. Syst. 2. 115. Kunth Cyper. 200. *Scirpus Holoschoenus* Linn. Spec. I. 72. Host Gram. 3. t. 62. E. B. t. 1612. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 441. *Scirpus romanus* Linn. Spec. I. 72. Jacq. Flor. Austr. t. 448. — ♃ — *Habitat in Europa calidiori, Asia et Africa boreali.*

644. **Isolepis setacea** R. Br. Prodr. 222. Kunth Cyper. 193. *Scirpus setaceus* Linn. Spec. I. 73. Host Gram. 3. t. 44 et 65 E. B. t. 1693. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 440. — ♃ — *Crescit in inundatis Europae et Asiae occidentalis.*

645. **Isolepis pygmaea** Kunth Cyper. 191. *Isolepis pumila* Link Hort. I. 285. *Scirpus leptaleus* Koch in Flora. *Isolepis leptalea* Schult. Mant. II. 62. —⊙— *Habitat ad aquas Europae meridionalis.*

646. **Isolepis prolifera** R. Brown Prodr. 223. Kunth Cypr. 201. *Scirpus prolifer* Rottboell Gram. 55. t. 17. f. 2. Cyperus prolifer Hort. Berolin. 1828. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei et Nova Hollandia.*

1000. Scirpus Linn. Simse.

647. **Scirpus compressus** Pers. Syn. 1. 66. Mertens et Koch Deutschl. Flora 1. 446. *Scirpus Caricis* Retz Prodr. n. 64, Host Gram. 3. t. 57. *Schoenus compressus* Linn. Spec. 1. 65. E. B. t. 791. *Blysmus compressus* Panzer in Link Hort. I. 278. Kunth Cyper. 328. — ♃ — *Ad aquas Europae et Asiae.*

648. **Scirpus lacustris** Linn. Spec. 1. 72. Host Gram. 3. t. 61. E B. t. 66. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 433. Kunth Cyper. 164. — ♃ — *Habitat in aquis Europae, Asiae et Americae borealis.*

Officin. exolet. Radix Scirpi majoris sive Junci maximi.

649. **Scirpus mucronatus** Linn Spec. 1. 73. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 436 Kunth Cyp.

161. *Scirpus glomeratus* Scop. Carn. n. 63. Host Gram. 4. t. 68. — ♃ — *Crescit in inundatis Europae calidioris, Asiae et Novae Hollandiae.*

650. **Scirpus maritimus** Linn. Flor. Suec. 39. Schk. Handb. 1. t. 8. E. B. t. 542. Host Gram. 3. t. 67. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 443. Kunth Cyper. 167. — ♃ — *Ad aquas et paludes per totum orbem, excepta America meridionali.*

651. **Scirpus sylvaticus** Linn. Spec. 1. 75. E. B. t. 919 Host Gram. 3. t. 68. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 444. Kunth Cyper. 171. — ♃ — *Crescit in locis humidis Europae, Asiae et Americae borealis.*

652. **Scirpus acicularis** Linn. Spec. I. 71. Host Gram. 3. t. 60. E. B. t. 749. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 428. *Eleocharis acicularis* Brown Prod. 224. Kunth Cyper. 141. — ⊙ — *In inundatis Europae, Asiae et Americae borealis.*

653. **Scirpus palustris** Linn. Spec. 1. 70. Host Gram. 3. t. 35. E. B. t. 131. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 425. *Eleocharis palustris* R. Br. Prodr. 244. Kunth Cyper. 147. — ♃ — *Habitat in palustribus totius fere orbis.*

1001. **Eriophorum** Linn. Wollgras.

654. **Eriophorum vaginatum** Linn. Spec. 76. E. B. t. 373. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 453. Kunth Cyper. 177. *Eriophorum cespitosum* Host Gram. 1. t. 39. Schrad. Germ. 1. 150. — ♃ — *Habitat in uliginosis Europae et Americae borealis.*

655. **Eriophorum angustifolium** Roth N. Beitr. 1. 94. E. B. t. 564. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 455. Kunth Cyper. 178. *Eriophorum polystachyum* Poll. Pal n. 52. Host Gram. 1. 48. — ♃ — *Crescit in palustribus Europae et Americae borealis.*

656. **Eriophorum latifolium** Hoppe Taschenb. 1800. 108 Host Gram. 4. t. 73. Mertens et Koch Deutschl. Flor. 1. 454 Kunth Cyper. 178. — ♃ — *Habitat in paludosis Europae, Asiae et Americae borealis.*

1003. **Cyperus** Linn. Cypergras.

a. **Cyperus** L.

657. **Cyperus conglomeratus** Rottb. Gram. t. 15. f. 7 Vahl Enum. II. 339. Link Hort. I. 308. *Cyperus vulgaris* Sieb. herb. Maurit. n. 14. Kunth Cyper. 4. *Cyperus globosus* All. Auct. 49. — ⊙ — *Habitat in Asia meridionali, Italia et insula Mauritii.*

658. **Cyperus flavescens** Linn. Spec. 68. Host Gram III. t. 72. Flor Dan. t. 1682. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 420. Kunth Cyper. 5. — ⊙ — *Habitat in palustribus et aquosis Europae, Africae et Americae borealis.*

659. **Cyperus Eragrostis** Vahl Enum. II. 322. Kunth Cyper. 7. *Cyperus nitidus* Lam. Ill. I. 145. — ♃ — *Habitat in Africa et India orientali.*

660. **Cyperus mucronatus** Rottboell Gram, 19. t. 8. f. 4. Retz Observ. V. 10. Kunth Cyper. 17. — ♃ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

661. **Cyperus macrostachyos** Lam. Illustr. I. 147. Vahl Enum. II. 349. *Cyperus puncticulatus β. macrostachyus* Kunth Cyper. 16. — ♃ — *Habitat in Asia tropica.*

662. **Cyperus pannonicus** Jacq. Flor. Austr. V. App. 24. t. 6. Linn. Suppl. 103. Vahl Enum. II. 307. *Cyperus mucronatus β* Kunth Cyper. 18. — ♃ — *Habitat in Austria et Hungaria.*

663. **Cyperus pygmaeus** Rottboell Gram. 20. t. 14. f. 4. 5 Vahl Enum. II. 313. Kunth Cyper. 18. — ⊙ — *Habitat in India orientali et Aegypto.*

664. **Cyperus Monti** Linn. Suppl. 102. Host Gram. IV. t. 67. *Cyperus serotinus* Rottboell Gram. 31. Kunth Cyper. 19. — ♃ — *Habitat ad aquas Europae meridionalis et Caucasi.*

665. **Cyperus alopecuroides** Rottb. Gram. t. 8. f. 2. Vahl Enum. II 368. Kunth Cyper. 19. — ♃ — *Habitat in India orientali, Nova Hollandia et Africa boreali.*

666. **Cyperus compressus** Linn. Spec. 68.

Rottb. Gram. 27. t. 9. f. 3. Kunth Cyper. 23. —♃— *Habitat inter tropicos totius orbis.*

667. **Cyperus patulus** Kit. in Host Gram. III. t. 74. Bieb. Flor. Suppl. 47. Kunth Cyper. 24. *Cyperus incarnatus* Link Hort. I. 306. — ♃ — *Crescit in Hungaria calidiori, Italia, Sicilia, Graeciae insulis.*

668 **Cyperus erythraeus** Schrader in Schultes Mant. II. 477. Link Hort. Berol. I. 304. Kunth Cyper. 27. *Cyperus rubescens* Link Enum. I. 44. - ♃— *Patria ignota.*

669. **Cyperus viscosus** Aiton Hort. Kew. ed. 1. I. 79. Jacq. Ic. rar. t. 295. Kunth Cyper. 28 —♃— *Habitat in India occidentali et Mexico.*

670. **Cyperus flabelliformis** Rottb. Gram. t. 12. f. 2. Vahl Enum. II. 322. Kunth Cyper. 32. — ♃ — *Habitat in Arabia.*

671. **Cyperus alternifolius** Linn. Mant. 28. Jacq. Icon. rar. II. t. 298. Kunth Cyper. 33. —♃— *Habitat in Madagascaria.*

672. **Cyperus fuscus** Linn. Spec. 69. Host Gram. III. t. 73. Flor. Dan. t. 179. Sibth. Flor Graec. I. t. 48. Mert. et Koch Deutschl. Flor. I. 421. Kunth Cyper. 37. — ⊙ — *Crescit ad paludes et fossas Europae, Africae et Asiae borealis.*

673. **Cyperus difformis** Linn. Spec. 67. Rottb. Gram. t. 9. f. 2. Sibth. Flor. Graec. I. t. 46. Kunth Cyper. 38. *Cyperus protractus* Sieb. Link Hort. I. 105. —⊙— *Habitat in Europa et Asia australi, Nova Hollandia et Africa.*

674. **Cyperus Iria** Linn. Spec. 67. Vahl Enum. II. 360. Kunth Cyper. 38. *Cyperus chrysomelinus* Link Hort. Berol. I. 305. — ♃ — *Habitat in Asia tropica.*

675. **Cyperus vegetus** Willd. Spec. I. 283. Kunth Cyper. 40. *Cyperus compressus* Jacq. Hort. Vind. III. t. 12. — ♃ — *Habitat in America calidiori.*

676 **Cyperus reflexus** Vahl Enum. II. 299. Kunth Cyper. 42. *Cyperus Sellowii* Link Hort. Berolin. I. 307. — ♃ — *Habitat in Montevideo.*

677. **Cyperus tuberosus** Rottboell Gram.

28. t. 7. f. 1. Vahl Enum. II. 340. Kunth Cyper. 50. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

678. **Cyperus articulatus** Linn. Spec. 66. Rottboell Gram. 26. Vahl Enum. II. 301. Kunth Cyper. 53. — ♃ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

679. **Cyperus tenuiflorus** Rottb. Gram. t. 14. f. 1. Jacq. Icon. rar. II. t. 296. Kunth Cyper. 57. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei et India orientali.*

680. **Cyperus longus** Linn. Spec. 67. Jacq. Icon. rar. II. t. 297. Host Gram. III. t. 76. E. B. t. 1309. Kunth Cyper. 60. — ♃ — *Habitat in aquis Europae calidioris, Africae borealis et Indiae orientalis.*

β. *Thermalis. Cyperus thermalis* Dumort.

Officin. exolet. Radix Cyperi longi.

681. **Cyperus Papyrus** Linn. Spec. 70. Vahl Enum. II. 365. Kunth Cyper. 64. *Papyrus Antiquorum* Willdenow in Abhandl. Berlin. Academ. 1816. p 70. — ♃ — *Habitat in paludibus Abyssiniae, Aegypti, Syriae et Siciliae.*

682. **Cyperus venustus** R. Brown Prodr. 68. Nees in Linnaea IX. 285. Kunth Cyper. 68. *Papyrus venustus* Nees in Linnaea X. 138. *Cyperus auricomus* Sieber ex Sprengel Syst. I. 230. Link Hort. Berolin. II. 320. *Cyperus xanthocomus* Link Hort. Berolin. II. 320. — ♃ — *Habitat in Asia et Africa tropica, in Capite bonae spei et Nova Hollandia.*

683. **Cyperus procerus** Vahl herb. Roth Cat. III. 5. Kunth Cyper. 72. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

684. **Cyperus prolixus** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. I. 206. Ejusd. Cyper. 79. *Cyperus Schottii* Hort. Berol. Comostemum Schottii Nees in Linnaea IX. 283. — ♃ — *Habitat in Brasilia et Nova Granada.*

685. **Cyperus kyllingioides** Vahl Enum. II. 312. Kunth Agrost. 94. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

b. **Mariscus** Vahl.

686. **Cyperus aggregatus.** *Mariscus aggregatus* Willd. Enum. 70. Kunth Cyper. 119. — ♃ — *Patria ignota.*

687. **Cyperus ovularis.** *Mariscus ovularis* Vahl Enum. II. 374. Kunth Cyper. 121 *Schoenus umbellatus* Jacq Collect. I. 113. Ic. rar. t. 10. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

688. **Cyperus capensis.** *Mariscus capensis* Schrader Analect. 13. Nees in Linnaea V. 520. IX. 286. X. 139. Kunth Cyper. 122. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

c. Kyllingia Linn.

689. **Cyperus cruciformis.** *Kyllingia cruciformis* Schrader in Schultes Mant. II. 137. Kunth Cyper. 131. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

690. **Cyperus triceps.** *Kyllingia triceps* Linn. Suppl. 104. Vahl Enum. II. 381. Kunth Cyper. 133. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

691. **Cyperus Kyllingia.** *Kyllingia monocephala* Linn. Suppl. 104. Rottboell Gram. t. 4. f. 4. Kunth Cyper. 129. *Schoenus cephalotes* Jacq. Hort. Vindob. I. 42. t. 97. — ♃ — *Habitat passim inter tropicos veteris orbis.*

Ordo XII. Commelynaceae.

1028. Commelyna Dill.

a. Commelyna R. Br.

692. **Commelyna africana** Linn. Spec. 60. Schmiedel Analys. t. 30. Curt. Bot. Mag. t. 1314. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

693. **Commelyna longicaulis** Jacq. Collect. III. 234. Ic. rar. t. 294. — ♃ — *Habitat ad Caracas.*

694. **Commelyna tuberosa** Linn. Spec. 61. Schmiedel Analys. t. 49. Redouté Liliac. t. 108. Bot. Mag. t. 1695. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

695. **Commelyna communis** Linn. Spec. 60. Schmiedel Analys. t. 40. 41. *Commelyna vulgaris* Redouté Liliac. t. 206. — ⊙ — *Habitat in America tropica.*

696. **Commelyna caroliniana** Walter Carolin. 68. Römer et Schultes Syst. I. 532. Mant. I. 338. — ♃ — *Habitat in Carolina.*

697. **Commelyna Karwinskii** Martius Index Sem. Hort. Monac. 1839. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

698. **Commelyna rubens** Redouté Liliac. t. 367 Martius Index Sem. Hort. Monac. 1839. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

699. **Commelyna variabilis** Schlechtend. Index Sem. Hort. Hall. 1838. n. 6. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

700. **Commelyna orchioides** Booth ex Lindley in Bot. Reg. 1838. App. 53. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

δ. Aneilema R. Br.

701. **Commelyna nudiflora** Linn. Flor. Zeylon. 31. Mant. 177. Römer et Schultes Syst. I. 587. Mant. I. 339. *Tradescantia malabarica* Linn. Spec. 412. — ⊙ — *Habitat in India orientali.*

1028. **Tinantia** Scheidw.

702 **Tinantia fugax** Scheidweiler in Otto et Dietrich Gartenzeit. VII. 1839. n. 46. p. 365. *Commelyna rosea* Schlechtend. Index Sem. Hort. Hall. 1838. n. 5. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

1031. **Tradescantia** Linn.

703. **Tradescantia erecta** Jacq. Collect. IV. 114. Ic. rar. t. 354. Sims Bot. Mag. t. 1340. Redouté Liliac. t. 239. Schultes f. Syst. VII. 1060. *Tradescantia undulata* Vahl Act. Soc. h. n. Havn. II. 3. 27. t. 3. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

704 **Tradescantia Crassula** Link et Otto Ic. rar. I. 13. t. 7. Hooker in Bot. Mag. t. 2935. Schultes f. Syst. VII. 1166. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

705. **Tradescantia virginica** Linn. Spec. 411 Redouté Liliac. t. 95. Schultes f. Syst. VII. 1173. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

β. *Alba.* γ. *Rubra.*

706. **Tradescantia pilosa** Lehmann Index Sem. Hort. Hamb. 1827. p. 16. Schultes f. Syst. VII. 1174. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

707. **Tradescantia discolor** Héritier Sert. 8. t. 12. Smith Ic. pict. 10. t. 10. Sims Bot. Mag. t. 1192. Redouté Liliac. t. 168. Schultes f. Syst. VII. 1174. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1032. Cyanotis Don.

708. **Cyanotis cristata** Schultes f. Syst. VII. 1150. *Tradescantia cristata* Jacq. Hort. Vindob. t. 137. Bot. Mag. t. 1435. *Commelina cristata* Linn. Spec. 62. — ⊙ — *Habitat in Asia tropica, ad arborum vetustarum truncos.*

1033. Campelia L. C. Rich.

709. **Campelia Zanonia** L. C. Rich. Anal. fr. 46. Schultes f. Syst. VII. 1179. *Zanonia bibracteata* Sternberg in Flora 1822. p. 162. *Commelina Zanonia* Linn. Spec. 61. Redouté Liliac. t. 192. *Tradescantia Zanonia* Swartz Flor. Ind. occid. I. 604. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1034. Dichorisandra Mik.

710. **Dichorisandra thyrsiflora** Mikan Delect. t. 3. Lindley in Bot. Reg. t. 682. Schultes f. Syst. VII. 1187. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

Ordo XIII. Alismaceae.

Subordo I. Juncagineae.

1039. Triglochin Linn.

711. **Triglochin palustre** Linn. Spec. 482. E. B. t. 366. Hook. Flor. Lond. t. 98. Schultes f. Syst. VII. 1582. — ♃ — *Habitat in uliginosis et paludosis regionum temperatarum hemisphaerae borealis.*

712. **Triglochin Barrelierii** Loisl. Flor. gall. ed. 1. p. 725. Schultes f. Syst. VII. 1583. — ♃ — *Habitat in maritimis regionis mediterraneae orientalis.*

713. **Triglochin laxiflorum** Gussone Prodr. Flor. sic. I. 451. Schultes f. Syst. VII. 1584. — ♃ — *Habitat in maritimis Siciliae et Corsicae.*

714. **Triglochin bulbosum** Linn. Mant. 226. Jacq. Collect. Suppl. 102. Ic. rar. t. 454. Ker in Bot. Mag. t. 1445. Schultes f. Syst. VII. 1584. — ♃ — *Habitat in Capite bonae Spei.*

715. **Triglochin montevidense** Sprengel Syst. II. 145. Schultes f. Syst. VII. 1586. — ♃ — *Habitat in America australi extratropica.*

716. **Triglochin maritimum** Linn. Spec. 483. E. B. t. 255 Flor. dan. t. 306. Hooker Flor. Lond. t. 99. Schultes f. Syst. VII. 1588. — ♃ — *Habitat in maritimis Europae totius et Americae borealis, nec non in lacubus salsis Hungariae et Asiae borealioris.*

Subordo II. Alismeae.

1041. **Alisma** Juss. Froschlöffel.

717. **Alisma Plantago** Linn. Spec. 486. Schkuhr Handb. t. 102. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 631. — ♃ — *Habitat in fossis et aquis stagnantibus Europae totius.*

Offic. exolet. Radix et herba Plantaginis aquaticae.

1042. **Sagittaria** Linn. Pfeilkraut.

718. **Sagittaria sagittaefolia** Linn. Spec. 1410. Schkuhr Handb. t. 298. Koch Synops. 670. — ♃ — *Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae totius.*

Offic. exolet. Folia Sagittariae.

Ordo XIV. Butomaceae.

1044. **Butomus** Tournef. Blumenbinse.

719. **Butomus umbellatus** Linn. Spec. 532. Schkuhr Handb. t. 111. — ♃ — — Δ — *Habitat in fossis et aquis lente fluentibus Europae totius.*
Offic. exolet. Radix et Semen Junci floridi.

1045. **Hydrocleis** L. C. Rich.

720. **Hydrocleis Humboldtii** Endl. *Limnocharis Humboldtii* L. C. Richard in Annal. Mus. I. 369. t. 19. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 248. Hooker in Bot. Mag. t. 3248. Lindley in Bot. Reg. t. 1640. — ♃ — Δ — *Habitat in fossis Americae tropicae et australis extratropicae.*

Ordo XV. Juncaceae.

1047. **Luzula** DC. Hainsimse.

721. **Luzula maxima** Willdenow Enum. 393. *Luzula sylvatica* Bicheno in Linn. Transact. XII. 331. t. 9. f. 3. Schultes f. Syst. VII. 255. *Juncus sylvaticus* Hudson Flor. Angl. 151. E. B. t. 737. *Juncus maximus* Retz Fl. scand. ed. 2. n. 434. — ♃ — *Habitat in montanis sylvaticis Europae totius.*

722. **Luzula pediformis** DC. Fl. fr. III. 16. Schultes f. Syst. VII. 277 *Juncus pediformis* Villars Delph. II. 838. t 6. — ♃ — *Habitat in montibus Delphinatus, Sabadiae et Pyrenaeorum.*

1049. **Juncus** DC. Simse.

a. Juncus.

723. **Juncus effusus** Linn. Spec. 464. E B. t. 836. Flor. dan. t. 1096. Schultes f. Syst. VII. 178. — ♃ — *Habitat in humidis herbidis totius orbis.*
— Radix diuretica.

724. **Juncus glaucus** Sibthorp Flor. oxon. 113. E. B. t. 665. Schultes f. Syst. VII. 181. —♃— *Habitat in uliginosis Europae totius.*

725. **Juncus balticus** Deth. Willdenow in Berlin. Magaz. 1809. p. 298. Schultes f. Syst. VII. 184. *Juncus helodes* Link Enum I. 305. —♃— *Habitat in littoribus arenosis maris baltici et atlantici.*

726. **Juncus fusco-ater** Schreber in Schweig. et Körte Flor Erlang. 149. Schultes f. Syst. VII. 197. —♃— *Habitat ad margines paludum Europae totius.*

727. **Juncus lamprocarpos** Ehrh. Calam. n. 126. E. B. t. 2143. Schultes f. Syst. VII. 199. *Juncus adscendens* Host Gram. III. t. 87. —♃— *Habitat in herbidis udis Europae totius, Tauriae et Sibiriae.*

728. **Juncus acutiflorus** Ehrh. Calam. 66. Schultes f. Syst. VII 202. *Juncus sylvaticus* Willdenow Spec. II. 211. Host Gram. III. t. 86. —♃— *Habitat in coenosis sylvaticis Europae mediae et australis.*

729. **Juncus bufonius** Linn. Spec. 466. Host Gram. III t. 90. Schultes f. Syst. VII. 226. —☉— *Habitat in inundatis sabulosis totius orbis terrarum.*

730. **Juncus tenuis** Willdenow Spec. II. 214. Schultes f. Syst. VII. 231. —♃— *Habitat in America boreali.*

b. **Marsippospermum.**

731. **Juncus acutus** Linn. Spec. 463. E. B. t. 1614. Schultes f. Syst. VII. 245. —♃— *Habitat in arenosis maritimis Britanniae et regionis mediterraneae.*

732. **Juncus maritimus** Lam. Dict. III. 264. E. B. t. 1725. Schultes f. Syst. VII. 246. —♃— *Habitat in paludosis maritimis regionum extratropicarum utriusque hemisphaerii.*

733. **Juncus trifidus** Linn. Spec. 465. E. B. t. 1482. Schultes f. Syst. VII. 249. —♃— *Habitat in alpibus Europae et Americae borealis.*

*Astelieae.

1051. **Astelia** Banks et Sol.

734. **Astelia Banksii** R. Brown Prodr. 291. in not. A. Cunningh. in Bot. Mag. Comp. II. 374. *Astelia Richardi* Endlicher in Annal. d. Wiener Mus. I. 162. *Hamelinia Veratroides* A. Richard Flor. Nov. Zeel. 158. t. 24. — ♃ — *Habitat in Nova Zeelandia boreali, in truncis arborum parasitica.*

**Xerotideae.

1056. **Xerotes** R. Br.

735. **Xerotes rigida** R. Brown Prodr. 261. *Lomandra rigida* Labillard. Nov. Holl. I. 93. t. 120. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

Ordo XVI. Melanthaceae.

Tribus I. Veratreae.

1062. **Tofieldia** Huds.

736. **Tofieldia palustris** Hudson Flor. Angl. 157. E. B. t. 536. Schultes f. Syst. VII. 1578. *Anthericum calyculatum* Linn. Spec. 447. Flor. dan. t. 36. — ♃ — *Habitat juxta paludes Europae mediae, borealis et arcticae.*

1066. **Schoenocaulon** A. Gray. Läusesamen.

737. **Schoenocaulon officinale** Endlicher msc. *Asagraea officinalis* Lindley in Bot. Reg. 1839. t. 33. *Veratrum officinale* Schlechtend. in Linnaea VI. 45. Guimpel et Schlechtend. Preuss. Pharm. I. 183.

t. 97. Hayne Arzneigew. XIII. t. 27. — ♃ — *Habitat in Mexico prope Vera Crux, et in rupibus Andium, incolis vulgo » Sabadilla. «*

Ex hac planta » Semina Sabadillae « officinarum.

738. **Schoenocaulon caricifolium** Asa Gray in Hooker ad Beechey 388. in not. *Veratrum caricifolium* Schlechtend. Index Sem. hort. Hall. 1838. ex Linnaea Litterat. Bericht XIII. 100. — ♃ — *Habitat in montibus calcareis Mexici, prope los Baños de Grande, ubi fructiferam legit C. Ehrenberg et ad Schlechtendalium misit.*

» Gregarium, foliis longissimis (bipedalibus), auguste linearibus, caule fructifero multo longioribus, prostratis; caulibus fructiferis erectis v. basi adscendentibus, apice racemum brevem (bipollicarem) ferentibus, floribus luteis, capsulis inflato-ovoideis. « Schlecht. l. c.

» Ab hac quoque specie *Sabadillae* semina colligi possunt, differunt enim capsulae ejus ab iis V. officinalis, quod paullo majores et crassiores sunt. « Schlecht. l. c.

1067. **Veratrum** Tournef. Germer.

739. **Veratrum nigrum** Linn. Spec. 1479. Jacq. Flor. austr. t. 336. Schkuhr Handb. t. 341. Redouté Liliac. t. 416. Sims Bot. Mag. t. 963. Schultes f. Syst. VII. 1552. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae mediae.*

740. **Veratrum album** Linn. Spec. 1479. Jacq. Flor. austr. t. 335. Schkuhr Handb. t. 341. Redouté Liliac. t. 447. Nees Plant. offic. XV. t. 24. Schultes f. Syst. VII. 1554. — ♃ — *Habitat in pratis subalpinis et alpinis Europae totius.*

Officin. Radix Hellebori albi.

741. **Veratrum Lobelianum** Bernhardi in Trommsdorf Journ. XVI. 206. Nees Plant. offic. XV. t. 25. Schultes f. Syst. VII. 1555. — ♃ — *Habitat in pratis montanis et subalpinis, solo calcareo.*

1067. **Leimanthium** Willd.

742. **Leimanthium virginicum** Willdenow in Berl. Magaz. II. 24. *Melanthium virginicum* Gronov.

Virgin. 59. *Helonias virginica* Sims in Bot. Mag. t. 985. — ♃ — *Habitat in Virginia.*

1068. **Zygadenus** L. C. Rich.

743. **Zygadenus glaberrimus** L. C. Richard in Michaux Flor. Bor. Amer. I. 214. t. 22. Schultes f. Syst. VII. 1559. *Helonias glaberrima* Link Enum. 348. — ♃ — *Habitat in humidis Virginiae et Carolinae inferioris.*

Tribus II. Colchiceae.

1085. **Bulbocodium** Linn.

a. **Merendera** Ram.

744. **Bulbocodium caucasicum.** *Bulbocodium trigynum* Adam apud Web. et Mohr Catalect. I. 49. *Merendera caucasica* Bieberst. Flor. Taur. Cauc. I. 293. Plant. ross. 1. t. 60. Schultes f. Syst. VII. 1524. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Iberia.*

b. **Eubulbocodium.**

745. **Bulbocodium vernum** Linn. Spec. 422. Curtis Bot. Mag. t. 153. Redouté Liliac. t. 197. Schultes f. Syst. VII. 1134. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

1086. **Colchicum** Tournef. Zeitlose.

746. **Colchicum autumnale** Linn. Spec. 485. E. B t 133. Flor. dan. t. 1642. Schkuhr Handb. t. 101. Hayne Arzneigew. IV. t. 45. Schultes f. Syst. VII. 1511. — ♃ — *Habitat in pratis humidiusculis Europae totius.*

Officin. Radix, flores et semina Colchici.

747. **Colchicum Bertolonii** Steven in Mem. soc. nat. Mosq. VII. 72. Schultes f Syst VII. 1519.

Colchicum montanum Bertoloni Amen. 25. Visiani Plant. dalm. 54. t. 6. f. 1. non Linn. — ♃ — *Habitat in collibus Dalmatiae, Liguriae et Siciliae.*

Ordo XVII. Pontederiaceae.

1088. Pontederia Linn.

748. **Pontederia crassipes** Martius et Zucc. Nov. gen. et sp. I. 9. t. 4. Schultes f. Syst. VII. 1137. *Pontederia azurea* Hooker in Bot. Mag. t. 2932. — ♃ Δ — *Habitat in aquis stagnantibus Guianae, Brasiliae et Bonariae.*

749. **Pontederia cordata** Linn. Spec. 412. Redouté Liliac. t. 72. Sims Bot. Mag. t. 1156. Schultes f. Syst. VII. 1141. — ♃ Δ — *Habitat in rivulis Americae borealis et tropicae.*

Ordo XVIII. Liliaceae.

Subordo I. Tulipaceae.

1090. Erythronium Linn. Hundszahn.

750. **Erythronium Dens canis** Linn. Spec. 437. Jacq. Flor. austr. Suppl. t. 750. Redouté Liliac. t. 194. Schkuhr t. 92. Schult. f. Syst. VII. 372. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Europae australioris, Tauriae et Sibiriae.*

Officin. exolet. Radix Dentis Canis, aphrodisiaca, anthelmintica, fecula nutritiva scatens.

1091. Tulipa Linn.

751. **Tulipa suaveolens** Roth Catalect. I. 45. Redouté Liliac. t. 111. Schult. f. Syst. VII. 374. — β. *pubescens* Willd. Enum. Suppl. 17. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

752. **Tulipa Gesneriana** Linn. Spec. 438. Ker Bot. Reg. t. 380. Schultes f. Syst. VII. 376. — ♃ — *Habitat in Cappadocia et in desertis maris Caspici.*

753. **Tulipa Oculus Solis** St. Amand Soc. Agr. d'Agen. I. 75. Redouté Liliac. t. 219. Schultes f. Syst. VII. 377. — ♃ — *Habitat in Gallia australi et Italia.*

754. **Tulipa praecox** Tenore Flor. Neap. I. 170. t. 32. Schultes f. Syst. VII. 378. *Tulipa Raddii* Reboul Tulip. 5. — ♃ — *Habitat in Italia passim.*

755. **Tulipa Clusiana** Venten. in Redouté Liliac. t. 37. Sibthorp Flor. graec. t. 329. Ker in Bot. Mag. t. 1390. Schultes f. Syst. VII. 380. *Tulipa praecox* Cav. Descr. 448. *Tulipa persica praecox* Clus. Cur. post. 9. — ♃ — *Habitat in Europa mediterranea.*

756. **Tulipa sylvestris** Linn. Spec. 438. Flor. dan. t. 375. E. B. t. 63 Schkuhr t. 93. Redouté Liliac. t. 165. Schultes f. Syst. VII. 381. — ♃ — *Habitat in pomariis et pratis nemorosis Europae totius.*

1092. **Orythyia** Don.

757. **Orythyia uniflora** Don in Sweet Fl. Gard. t. 336. *Orinthogalum uniflorum* Laxmann in Act. Petropolit. XVIII. 529. t. 6. f. 3. *Gagea uniflora* Schultes f. Syst. 553. — ♃ — *Habitat in montibus altaicis.*

1093. **Gagea** Salisb.

758. **Gagea lutea** Schult. f. Syst. VII. 538. *Ornithogalum luteum* Linn. Spec. 439. E. B. t. 21. — ♃ — *Habitat in sepibus et nemorosis Europae totius et Sibiriae.*

Offic. exolet. Radix Ornithogali.

759. **Gagea arvensis** Schultes f. Syst. VII. 547. *Ornithogalum arvense* Persoon in Usteri Annal. XI. 8. t. 1. f. 2. *Ornithogalum villosum* Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 274. — ♃ — *Habitat in arvis Europae totius et Asiae temperatae.*

1094. Lloydia Salisb.

760. **Lloydia serotina** Salisbury msc. Reichenb. Flor. excurs. 102. *Nectaribothrium striatum* Ledebour Flor. alt. II. 36. *Anthericum serotinum* Linn. Spec. 444. E. B. t. 793. Jacq. Flor. austr. App. t. 38. Schultes f. Syst. VII. 427. *Phalangium serotinum* Lam. et DC. Fl. fr. III. 210. Redouté Liliac. t. 270. *Ornithogalum striatum* Willd. Spec. II. 112. — ♃ — *Habitat in Europa media, Caucaso et Sibiria.*

1095. Cyclobothra Don.

761. **Cyclobothra lutea** Lindley in Bot. Reg. t. 1663. — ♃ — *Habitat in California.*

1096. Fritillaria Linn.

a. Fritillaria Tournef.

762. **Fritillaria Meleagris** Linn. Spec. 436. Jacq. Flor. Austr. App. t. 32. Flor. Dan. t. 972. Schultes f. Syst. VII. 395. — ♃ — *Habitat in pratis humidiusculis Europae mediae et Caucasi.*

763. **Fritillaria lutea** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. I. 191. Plant. ross. I. t. 41. Schultes f. Syst. VII. 394. *Fritillaria latifolia* γ lutea Sims Bot. Mag. t. 1538. *Fritillaria collina* Adam in Web. et Mohr Beitr. 50. — ♃ — *Habitat in Caucasi monte Kasbek, et in alpibus Ossetiae.*

764. **Fritillaria latifolia** Willd. Spec. II. 92. Redouté Liliac. t. 51 Schultes f. Syst. VII. 392. — ♃ — *Crescit in collibus herbidis Europae australis et Caucasi.*

765. **Fritillaria racemosa** Smith in Rees Cyclop. Bot. Mag. t 952. 1216. Schultes f. Syst. VII. 391. *Fritillaria pyrenaica* Ker Bot. Mag. n. 1538. in not. non Linn. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Tauria.*

766. **Fritillaria tulipaefolia** Bieberst. Flor. Taur. cauc. 1. 270. Ic. Plant. ross. I. t. 21. Schultes

f. Syst. VII. 387. *Fritillaria caucasica* Adam in Web. et Mohr Beitr. 1. 51. — ♃ — *Habitat in Tauria, Caucaso et Siberia.*

767. **Fritillaria persica** Linn. Spec. 436. Redouté Liliac. t. 67. Sims Bot. Mag. t. 1537. Schultes f. Syst. VII 386. *Lilium Susianum* Clus. Pann. 129. — ♃ — *Habitat in Persia. Anno 1581 primum Vindobonae floruit, in horto Dominae de Heysenstamm.*

b. **Petilium** Tournef.

768. **Fritillaria imperialis** Linn. Spec. 435. Gärtner Carp. 1. 63. t. 17. Redouté Liliac. t. 131. Schultes f. Syst. VII. 385. *Tusai s. Lilium persicum* Clusius Pannon. 122. — ♃ — *Habitat in Persia. — Vindobonae a. 1580 primum floruit, Constantinopoli advecta.*
Officin. exolet. Radix Coronae imperialis.

1097. Rhinopetalum Fisch. Sporntulpe.

769. **Rhinopetalum Karelini** Fisch. msc. Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 283. — ♃ — *Habitat ad lacum Inderensem.*

1098. Lilium Linn. Lilge.

a. **Martagon.**

770. **Lilium Martagon** Linn. Spec. 435. Jacq. Flor. austr. t 351 Redouté Liliac. t 146. Schultes Syst. VII. 402. — ♃ — *Habitat in montosis sylvaticis Europae et Sibiriae.*
β *Serotinum.*
Offic. exolet. Radix Martagon s. Radix Asphodeli spuria.

b. **Eulirion.**

771. **Lilium tenuifolium** Hort. Gorenk. Schrader Plant. rar. Hort. Götting 1. Reichenb. Magaz. 79. Schultes f. Syst. VII. 409. — ♃ — *Habitat in Dahuria.*

772. **Lilium spectabile** Fischer. Link Enum. hort. berolin. I. 321. Reichenb. Hort. bot. t. 30.

Schultes Syst. VII. 412. *Lilium bulbiferum* γ. Aiton Hort. kew. ed. 2. II. 241. Sims in Bot. Mag. t. 1018. — ♃ — *Habitat in Dahuria.*

773. **Lilium bulbiferum** Linn. Spec. 433. Jacq. Flor. austr. t. 226. Schultes Syst. VII. 413. Fischer et C A. Mey. Index Petrop. VI. 54. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi, nec non in America boreali.*

774. **Lilium concolor** Salisbury Parad. t. 47. Ker in Bot. Mag. t. 1165. Schultes f. Syst. VII. 410. Fischer et C. A. Meyer Index Petrop. VI. 55. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

775. **Lilium croceum** Chaix in Villars Delph. I. 322. Schultes Syst. VII. 414. Fischer et C. A. Meyer Index Petrop. VI. 56. — ♃ — *Habitat in Delphinatu et Pedemontio.*

776. **Lilium monadelphum** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 267. Plant. ross. I. t. 4. Schultes f. Syst. 415. Fischer et C. A. Meyer Index Petrop. VI. 57. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

777. **Lilium candidum** Linn. Spec. 433. Redouté Liliac. t. 199. Schultes Syst. VII. 416. — ♃ — *Habitat in Europa australi et Oriente.*

Officin. exolet. Radix, folia et flores Lilii candidi.

1099. Methonica Herm.

778. **Methonica superba** Lam. Dict. IV. 133. Illustr. t. 247. f. 1. Redouté Liliac. t. 26. *Gloriosa superba* Linn. Spec. 437. Andrews Bot. Reposit. t. 129. Ker Bot. Reg. t. 77. Schultes f. Syst. VII. 365. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

Radix vehementissime drastica.

Subordo II. Agapantheae.

1100. Funkia Spreng.

779. **Funkia subcordata** Sprengel Syst. II. 41. Schultes f. Syst. VII. 421. *Hemerocallis japonica*

Thunberg in Linn. Transact. II. 335. *Joksan* vulgo *Gibboosi* Kämpfer Amoen. exot. 863. Banks Ic. Kaempf. t. 11. — ♃ — *Habitat in China et Japonia.*

780. **Funkia ovata** Sprengel Syst. II. 41. Schultes f. Syst. VII. 421. *Hemerocallis caerulea* Aiton Hort. kew. ed. 2. II. 305. Andrews Bot. Reposit. t. 6. Venten. Malmais. t. 18. Redouté Liliac. t. 106. *Gibboosi altera* Kaempfer Amoen. exot. 863. — ♃ — *Habitat in Japonia.*

781. **Funkia Sieboldi** Lindley in Bot. Reg. 1839. t. 50. *Funkia Sieboldiana* Hooker Bot. Mag. t. 3663. *Hemerocallis Sieboldiana* Loddiges Bot. Cab. t. 1869. — *Habitat in Japonia, unde a Sieboldio adlata.*

782. **Funkia lanceaefolia** Siebold. — ♃ — *Habitat in Japonia, unde a Sieboldio adlata.*

1101. Phormium Forst. Flachslilie.

783. **Phormium tenax** Forst. Char. gen. t. 24. Prodr. 153. Thunberg Nov. gen. 94. Linn. Suppl. 204. Thouin in Annal. Mus. II. 228. Faujas de St. Fond Ibid. XIX. 401. t. 20. Redouté Liliac. t. 448. 449. Thiebaud in Annal. soc. Linn. Paris. IV. 57. t. 7. A. Cunningham in Bot. Mag. t. 3199. Schultes f. Syst. VII. 621. *Chlamydia tenacissima* Banks et Soland. apud Gärtner Carp. I. 71. t. 18. — ♃ —. *Habitat in aestuariis scopulosis, nec non ad lacus salsos Novae Zeelandiae borealis, et in insula Norfolk.*

1102. Agapanthus Herit.

784. **Agapanthus umbellatus** Heritier Sert. angl. 18. Curtis Bot. Mag. t. 500. Redouté Liliac. t. 60. Schultes f. Syst. VII. 997. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *variegatus* Hortulan.

1103. Polianthes Linn.

785. **Polianthes tuberosa** Linn. Spec. 453. Redouté Liliac. t. 147. Bot. Reg. t. 63. Bot. Mag. t.

1817. Schultes f. Syst. VII. 625. — ♃ — *Habitat inter tropicos Asiae et Americae.*

1104. Blandfordia Smith.

786. **Blandfordia grandiflora** R. Brown Prodr. 295. Bot. Reg. t. 911. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia orientali extratropica.*

1106. Brodiaea Smith.

787. **Brodiaea congesta** Smith in Linn. Transact. X. 3. t. 1. Hooker Flor. Bor Amer. II. 186. — ♃ — *Habitat in America boreali occidentali.*

788. **Brodiaea grandiflora** Smith in Linn. Transact. X. 2. Lindley in Bot. Reg. t. 1183. non Pursh nec Nutt. *Hookera coronaria* Salisbury Parad. Lond. t. 98. — ♃ — *Habitat in California.*

1107. Triteleia Hook.

789. **Triteleia laxa** Benth. in Hortic. Transact. N. S. I. 413. t. 15. f. 2. Lindley in Bot. Reg. t. 1685. — ♃ — *Habitat in Chili.*

1111. Calliprora Lindl. Goldlauch.

790. **Calliprora lutea** Lindley in Bot. Reg. t. 1590. — ♃ — *Habitat in California.*

Subordo III. Aloineae.

1113. Sanseviera Thunb.

791. **Sanseviera guineensis** Willd. Spec. II. 159. Ker in Bot. Reg. t. 1180. Schultes f. Syst. VII. 355. *Aletris guineensis* Jacq. Hort. Vindob. I. 36. t. 84. *Aloë guineensis* Jacq. Enum. App. 308. *Acyntha guineensis* Medikus Theod. 76. — ♃ — *Habitat in Guinea et in Capite bonae spei.*

792. **Sanseviera zeylanica** Willd. Spec. II. 159. Ker in Bot. Reg. t. 160. Redouté Liliac. t. 160. Schultes f. Syst. VII. 357. *Aletris zeylanica* Miller Dict. n. 4. *Aloë zeylanica* Jacq. Enum. App. 310. — ♃ — *Habitat in Zeylon.*

793. **Sanseviera grandicuspis** Haworth Synops. 67. Schultes f. Syst. VII. 359. — ♃ — *Patria ignota.*

794. **Sanseviera fulvocincta**. Haworth Suppl. 30. Link Enum. 342. Schultes f. Syst. VII. 360. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

795. **Sanseviera carnea** Andrews Bot. Reposit. t. 361. Redouté Liliac. t. 323. Schultes f. Syst. VII. 360. *Sanseviera sarmentosa* Jacq. Fragm. 68. t. 102. 83. t. 132. f. 4. *Aletris chinensis* Hortor. — ♃ — *Habitat in China.*

1114. Kniphofia Mönch.

796. **Kniphofia aloides** Mönch Method. 631. *Tritomanthe Uvaria* Link Enum. I. 333. Schultes f. Syst. VII. 629. *Tritoma Uvaria* Ker. Bot. Mag. t. 758. Redouté Liliac. t 291. *Velthemia Uvaria* Jacq. Fragm. 7. t. 4 f. 9. *Aletris Uvaria* Linn. Mant. 308. *Aloë Uvaria* Linn. Spec. 460. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

797. **Kniphofia media.** *Tritomanthe media* Link Enum. I. 333. *Tritoma media* Aiton Hort. kew. ed. 2. II. 290 Bot. Mag. t. 744. Redouté Liliac. t. 161. — ♃ -- *Habitat in Capite bonae spei.*

1115. Aloë Tournef.

a. Apicra Haw.

798. **Aloë foliolosa** Haw. in Trans. Linn. Soc. VII. 7. Bot. Mag. t. 1352. Schult. f. Syst. VII. 656. *Apicra foliolosa* Willd. Berl. Mag. n. 21. — ♄ — *Habitat in Promontorio bonae spei.*

799. **Aloë imbricata** Haw. in Trans. Linn.

Soc. VII. 7. Schult. f. Syst. VII. 657. *Aloë spiralis* Thunb. Prodr. 61. DC. Plant. grass. t. 56. Jacq. Fragm. bot. 72. f. 110. Bot. Mag. t. 1455. Willd. Enum. 384. non Linné. *Haworthia imbricata* Haw. Synops. 98. *Apicra imbricata* Willd. Mag. naturf. Fr. V. n. 20. — ♄ — *Habitat in Promontorio bonae spei.*

800. **Aloë quinquangularis** Schult. f. Syst. VII. 658. *Aloë pentagona* Salm-Dyck Cat. rais. 10. *Aloë pentagona β toruloса* Haw. Revis. 201. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

801. **Aloë spirella** Schult. f. Syst. VII. 658. *Haworthia spirella* Haworth Synops. 97. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

802. **Aloë spiralis** Schult. f. Syst. VII. 659. Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 6. *Haworthia spiralis* Haw. Synops. 97. *Aloë pentagona β. spiralis* Salm-Dyck Cat. rais. 10. *Apicra spiralis* Willd. Mag naturf. Fr. V. n. 21. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

803 **Aloë pentagona** Haworth in Trans. Soc. Linn VII. 7. Schult. f. Syst. VII. 659. Bot. Mag. t. 1338. Jacq. Fragm. bot. 72. t. 111. *Aloë spiralis β. pentagona* Willd Spec. II. 191. *Haworthia pentagona* Haw. Synops. 97. *Apicra pentagona* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 273. Haw. Suppl pl. succ. 62. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Haworthia** Duv.

§. 1. Acaules v. subacaules.

a. Foliis integerrimis v. subintegerrimis.

804. **Aloë retusa** Haworth in Trans. Soc. Linn. VII. 9. Linn. Sp. 459. Schult. f. Syst. VII. 631. Bot. Mag. t. 455. DC. Plant. grass. t. 45 *Apicra retusa* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 271. *Haworthia retusa* Haw. Synops. 95. *Catevala retusa* Medik. Theod. 68. — ♃ — *Habitat in Promontorio bonae spei.*

805. **Aloë turgida** Schult. f. Syst. VII. 635. *Haworthia turgida* Haworth Suppl. pl. succ. 52. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

806. **Aloë laete-virens** Link Enum. I. 335. Schult. f. Syst. VII. 635. *Haworthia laete-virens* Haworth Suppl. plant. succ. 53. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

807. **Aloë cymbifolia** Schrad. Neu. Journ. II. 17. t. 2. Jacq. Fragm. 72. t. 112. f. 1. *Aloë cymbiformis* Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 8. Bot. Mag. t. 802. *Haworthia cymbiformis* Haw. Syn. 83. *Haworthia concava* Haw. Revis. 58. *Apicra cymbifolia* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 271. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

808. **Aloë altilinea** Schult. f. Syst. VII. 638. *Haworthia altilinea* Haw. in Philos. Mag. et Journ. 1824. 301. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

809 **Aloë cuspidata** Schult. f. Syst. VII. 639. *Haworthia cuspidata* Haw. Revis. 58. Suppl. 50. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Foliis dentatis v. ciliatis.*

810. **Aloë reticulata** Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 9. Schult f. Syst. VII. 639. *Aloë arachnoides γ reticulata* Bot Mag. t. 1314. *Aloë pumilio* Jacqu. Hort. Schönbr. t. 421. *Aloë herbacea* DC. Plant. crass. *Haworthia reticulata* Haw. Synops. 94. Revis. 57. *Apicra reticulata* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 271. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

811. **Aloë atrovirens** DC. Plant crass. t. 51. Schult. f. Syst. VII. 640. *Aloë pumila* Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 10. *Aloë pumila ε.* Linn. Spec. 460. *Aloë Bradleyana* Jacq. Hort. Schönbr. ad t. 421. *Aloë arachnoides β. pumila* Thunb. Prodr. 61. *Aloë herbacea* Mill. Dict. ed. 8. n. 18. *Apicra atrovirens* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 168. *Haworthia atrovirens* Haw. Revis. 57. *Haworthia pumila* Haw. Synops. succ. 95. *Catevala atroviridis* Medik. Theod. 69. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

812. **Aloë translucens** Aiton Hort. Kew. ed. 2. II. 300. Schult. f. Syst. VII. 642. *Aloë pellucens* Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 10. *Haworthia pel-*

lucens Haw. Synops. 96. *Haworthia translucens* Haw. Suppl. plant. crass. 52. *Aloë arachnoides δ. translucens* Bot. Mag. t. 1417. *Apicra translucens* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 168. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

813. **Aloë arachnoides** Miller Dict. ed. 8. n. 17. Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 10. DC. plant. crass. t. 50. Bot. Mag. t. 756. Schult. f. Syst. VII. 643. *Aloë arachnoides α. communis* Willd. Spec. II. 188. *Aloë pumila δ. arachnoidea* Linn. Spec. 460. *Haworthia arachnoides* Haw. Synops. 96. *Apicra arachnoides* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 168 *Catevala arachnoidea* Medik. Theod. 68. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

814. **Aloë mirabilis** Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 9. Bot. Mag. 1354. Schult. f. Syst. VII. 643. *Haworthia mirabilis* Haw. Synops. 95. *Apicra mirabilis* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 269. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

γ. *Foliis margaritaceo-tuberculatis.*

815. **Aloë recurva** Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 10. Bot. Mag. t. 1353 (excl. syn. tricoloris et venosae). Schult. f. Syst. VII. 644. *Haworthia recurva* Haw. Synops. 94. Revis. 51. *Apicra recurva* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 270. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

816. **Aloë Radula** Jacq. Hort. Schönbr. t. 422. Schultes f. Syst. VII. 645. *Haworthia Radula* Haw. Synops. 93. *Apicra Radula* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 270, — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

817. **Aloë rugosa** Salm-Dyck in litt. Schult. f. Syst. VII. 1712. *Aloë Radula γ. minor* Salm-Dyck Cat. rais. Schultes f. Syst. VII. 645. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

818. **Aloë attenuata** Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 11. Schultes f. Syst. VII. 645. *Aloë Radula* Ker Bot. Mag. t. 1345. non Jacq. *Haworthia attenuata* Haw. Synops. 92. *Apicra attenuata* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 270. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei,*

819. **Aloë clariperla** Schultes f. Syst. VII.

646. *Haworthia clariperla* Haw. in Philos. Mag. et Ann. of Philos Mart. 1828. 186. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

820. **Aloë fasciata** Salm-Dyck in litt. Schult. f. Syst. VII 1713. *Haworthia fasciata* Haw. Revis. 5. *Apicra fasciata* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 270. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

821. **Aloë subulata** Salm-Dyck in litt. Schultes f. Syst. VII. 1712. *Aloë Radula a. major* Salm-Dyck Cat. rais. 4. Schult. f. Syst. VII. 645. *Haworthia Radula* laevior Haw. Revis. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

822. **Aloë subfasciata** Salm-Dyck in litt. Schult. f. Syst. VII. 1712. *Aloë fasciata a. major* Salm-Dyck Cat. rais. 5. *Haworthia fasciata β. major* Haworth Revis. *Aloë subulata* Salm-Dyck Observ. bot. 1822. p. 1. Schultes f. Syst. VII. 646. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

823. **Aloë Reinwardti** Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck. 1821. 37. Schultes f. Syst. VII. 647 et 1713. *Haworthia Reinwardti* Haw. Rev. 53 et *Haworthia fasciata* Haw. Suppl. 57. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

824. **Aloë erecta** Schultes f. Syst. VII. 649. *Haworthia erecta* Haw. Suppl. plant. succ. 56. Revis. 55. *Aloë margaritifera* DC. Plant. grass. t. 57. *Aloë margaritifera β.* Willd. Enum. hort. ber. 386. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

825. **Aloë granata** Schultes f. Syst. VII. 650. *Haworthia granata* Haw. Suppl. succ. 57. *Apicra granata* Willd Mag. naturf. Fr. V. 269. *Aloë margaritifera γ. minima* Salm-Dyck Cat. rais 5. Haworth in Trans. Soc. Linn. VII 11. DC. Plant. grass. t. 57. *Haworthia* Haw. Syn. 92. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

826. **Aloë semimargaritifera** Salm-Dyck Cat. rais. 6. Schultes f. Syst. VII. 650. *Haworthia semimargaritifera* Haw. Suppl. pl. succ. 54. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

α. Maxima Salm-Dyck l. c. Schultes l. c. *Aloë margaritifera maxima* Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 11. Suppl. pl. succ. l. c. *Haworthia maxima* Haw. Synops. 91. Duval H. Alenç. 7. *Aloë africana* Commelyn. Hort. amstel. II. 19. t. 10.

β. Major Salm-Dyck l. c. Schult. f. Syst. l. c.

γ Minor Salm-Dyck l. c. Schultes l. c. A. glabrata Hortul.

δ. Multiperla Haw. Suppl. plant. succ. 54. A. media Hortul.

827. **Aloë hybrida** Salm-Dyck Cat. rais. 7. Schultes f. Syst. VII 651. *Haworthia hybrida* Haw. Revis. 51. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

828. **Aloë subrigida** Schultes f. Syst. VII. 654. *Aloë pseudorigida* Salm-Dyck Catal. rais. 9 et 11. *Haworthia pseudorigida* Haw. Suppl. pl. succ. 62. *Apicra rigida* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 272. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

829. **Aloë rigida** DC. Plant. grass. t. 62. Ait. Hort Kew ed. 2. II. 298. Schult. f. Syst. VII. 655. *Aloë rigida β. major* Salm-Dyck Cat. rais. 9. *Aloë cylindracea β. rigida* Lam. Enc. I. 89. *Apicra expansa* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 372. *Haworthia rigida* Haw. Revis. 49 — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

830. **Aloë tortuosa** Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 7 Schultes f. Syst. VII. 655. *Aloë rigida* Bot. Mag. t. 1337. *Haworthia tortuosa* Haw. Synops. 90. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

§. 2. Caulescentes.

831. **Aloë viscosa** Linn. Spec. pl. p. 460. Haw. in Trans. Soc. Linn. VII. 6. DC. Plant. crass. t 16 Bot Mag. t. 814. Schultes f. Syst VII. 652. *Haworthia viscosa* Haw. Synops. 90. *Apicra viscosa* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 275. *Aloë triangularis* Lam. Encycl. I. 18. Medik. bot. Beob. 1783. p. 61. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

832. **Aloë parva** Schultes f. Syst. VII. 653. *Haworthia parva* Haw. in Philos. Mag et Journ. 1824. Octob. p. 301. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

833 **Aloë subtortuosa** Schultes f. Syst. VII. 654. *Apicra tortuosa* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 274.

Aloë pseudo-tortuosa Salm-Dyck Cat. rais. 8. et 41. *Haworthia pseudo-tortuosa* Haw. Suppl. plant. succ. 59. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

834. **Aloë torquata** Schultes f. Syst. VII. 654. *Haworthia torquata* Haw. in Philos. Mag. et Ann. of Philos. 1827. p. 123. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

c. **Gasteria** Haw.

α. *Caulescentes.*

835. **Aloë pulchra** Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 16. Schultes f. Syst. VII. 660. Willd. Mag. naturf. Fr. V. 279. Bemerk. 19. Jacq. Hort. Schönbr. IV. 10. t 419. Fragment. bot. 73. t. 112. f. 2. 3. *Aloë maculata a. pulchra* Hort. Kew. ed. 1. I. 469. ed. 2. II. 297. Bot. Mag. n. 1314. in nota. et 765. *Aloë obliqua* DC. Plant. grass. t. 91. *Gasteria pulchra* Haw. Synops. 85. Philos. Mag. 1827. 349. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Acaules.*

836. **Aloë vittata** Schultes f. Syst. VII. 662. *Aloë fasciata* Haw. Philos. Mag. 1827. 350. *Aloë nigricans γ. fasciata* Salm-Dyck Obs. bot. 64. *Gasteria nigricans γ. fasciata* Haw. Revis. 47. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β *Laxa* Haw. Philos. Mag. l. c.

837. **Aloë nigricans** Salm-Dyck Obs. bot. 63. Schultes f. Syst. VII. 663. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

α *Latifolia* Salm-Dyck l. c. Schultes l. c. *Aloë nigricans* Salm-Dyck Cat. rais. 16. Haw. Trans. Soc. Linn, VII. 16. Willd. Mag. naturf. Fr. V. 277. Bemerk. p. 17. *Aloë Lingua β. crassifolia* Ait. Hort. Kew. ed. 1. I. 469. ed. 2. II. 297. Willd. Spec. II. 190. *Aloë Lingua β* Bot. Mag. t. 838. *Aloë obliqua* Jacqu. hort. Schönbr. IV. 9. *Gasteria nigricans* Haw. Philos. Mag. 1827. 350. Synops. 86.

β. *Marmorata* Haw. Philos. Mag. l. c. Schultes f. Syst. l. c. *Aloë nigricans δ. marmorata* Salm-Dyck Obs. bot. 63.

838. **Aloë subnigricans** Sprengel Syst. II. 71. Schultes f. Syst. VII. 665. *Aloë pseudonigricans* Salm-Dyck Obs. bot. 65. Cat. rais. 17. *Gasteria subnigricans* Haw. Philos. Mag. 352. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. Glabrior Haw. l. c. Schultes f. Syst. VII. 665.

839. **Aloë conspurcata** Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck. 59. Schultes f. Syst. VII. 667. *Aloë conspurcata β, truncata* Salm-Dyck Cat. 18. 51. *Gasteria conspurcata* Haw. Philos. Mag. 1827. 355. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

840. **Aloë angulata** Willd. Mag. naturf. Fr. V. 256. Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck 56. Cat. rais. 17. Schultes f. Syst. VII. 667. *Aloë Lingua β. latifolia* Willd. Enum. hort. ber. 387. *Aloë Lingua longifolia* Haworth in Trans. Soc. Linn. VII. 13. *Aloë Lingua β* Bot. Mag. 1322. f. 3. *Aloë linguaeformis* Mill. Dict. 8. *Gasteria angulata* Haworth Philos. Mag. 354. *Gasteria longifolia* Haworth Syn. 89. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

841. **Aloë sulcata** Salm-Dyck Obs. bot. 54. Schultes f. Syst. VII. 668. *Aloë obscura γ. truncata* Salm-Dyck Cat. rais. 15. *Aloë linguaeformis* DC. Plant. grass. B. t. 68. prima. *Aloë Lingua β. angulata* Haw. Trans. Soc. Linn VII. 23. *Gasteria sulcata* Haworth Phil. Mag. V. 354. *Gasteria angulata* Haw. Synops. 88. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

842. **Aloë excavata** Willd. Mag. naturf. Fr. V. 276. Schultes f. Syst. VII. 669. *Aloë obscura* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 275. n. 1. *Aloë obscura α. et β.* Salm-Dyck Cat. rais. 15. *Aloë Lingua α angustifolia* Willd. Enum. Hort. berol. 387. *Gasteria excavata* Haworth Phil. Mag. V. 254. *Gasteria latifolia* Haworth Syn. succ. 87. *Aloë disticha δ.* Linn. Spec. 459. *Aloë Lingua* Bot. Mag. 1322. f. 4. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

843. **Aloë angustifolia** Haworth. Salm-Dyck Obs. bot. 67. Schultes f. Syst. VII. 670. *Aloë conspur-*

cata a. unilateralis Salm-Dyck Cat. rais. 18. *Aloë Lingua angustifolia* Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 13. *Aloë linguaeformis β.* Lamarck Enc. meth. 23. *Aloë linguaeformis C. verrucosa* DC. Plant. grass. t. 68. ic. altera. *Gasteria angustifolia* Haworth. Phil. Mag. V. 355. Synops. succ. 88. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

844. **Aloë laevis** Salm-Dyck Cat. rais. 16. Schultes f. Syst. VII. 671. *Aloë angustifolia β. laevis* Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck 58. *Gasteria laevis* Haw. Phil. Mag. V. 355. *Gasteria angustifolia β. laevis* Haw. Revis. 47. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

845. **Aloë subverrucosa** Salm-Dyck Catal. rais. 19. Schultes f. Syst. VII. 671. *Gasteria subverrucosa* Haw. Phil. Mag. V. 355. Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck. 67. *Gasteria subverrucosa a. grandipunctata* Haw. l. c. *β. parvipunctata* Salm-Dyck Obs. l. c. *Gasteria subverrucosa β. parvipunctata* Haworth l. c. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

846. **Aloë verrucosa** Ait. Hort. Kew. ed. 1. I. 468. ed. 2. II. 296. Salm-Dyck Obs. bot. 71. Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 12. Bot. Mag. t. 837. Schultes f. Syst. VII. 672. *Aloë carinata β. ensiformis* DC. Plant. grass. n. 63. *Aloë Serra β verrucosa* Pers. Syn. 379. *Gasteria verrucosa* Haworth Synops. succ. 89. Phil. Mag V. 356. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. Latifolia Salm-Dyck Obs. bot. 71. Schultes f. Syst. VII. 672. *Aloë carinata* DC. Plant. grass.

847. **Aloë intermedia** Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 12. Salm-Dyck Cat. rais. 19. Obs. bot. in Hort. Dyck. 69. Willd Bemerk. 17. Schultes f. Syst. VII. 673. *Gasteria intermedia* Haw. Phil. Mag. V. 356 — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

848. **Aloë carinata** Mill. Dict. ed. 1. n. 21. Ait. hort. Kew. I. 469 ed. 2. II. 297. Willd. Mag. naturf. Fr. V. 278. Bemerk. 18. Schultes f. Syst. VII. 675. *Aloë carinata a. acinaciformis* DC. plant. grass.

t. 63? *Aloë disticha* β. Linn. Spec. 459. *Gasteria carinata* Haw. Phil. Mag. V. 357. Synops. succ. 87. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

849. **Aloë subcarinata** Salm Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck. 51. Schultes f. Syst. VII. 676. *Aloë pseudo-angulata* Salm-Dyck Cat. rais. 16. *Gasteria subcarinata* Haw. Phil. Mag. V. 276. Suppl. succ. 49. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Striata* Salm-Dyck Obs. bot. l. c. Schultes f. Syst. VII. 676. *Aloë pseudo-angulata* β. Salm-Dyck Cat. rais. 26. *Aloë angulata* δ. *striata* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 276. Bemerk. 16. *Gasteria subcarinata* β. Haw. Phil. Mag. l. c. Revis. 47.

850. **Aloë glabra** Salm-Dyck Obs. bot. 48. Schultes f. Syst. VII. 677. *Gasteria glabra* Haw. Phil. Mag. 358. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

851. **Aloë trigona** Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck. 45. Schultes f. Syst. VII. 678. *Gasteria trigona* Haw. Phil. Mag. V. t. 359. *Aloë acinacifolia* γ. *angustifolia* Salm-Dyck Cat. rais. 12. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

852. **Aloë acinacifolia** Jacq. f. Eclog. 49. t. 31. Schultes f. Syst. VII. 679. *Gasteria acinacifolia* Haworth Suppl. 49. Revis. 48. Phil. Mag. V. 359. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

d. Rhipidodendron.

853. **Aloë plicatilis** Mill. Dict. 8. n. 7. Haworth Synops. 74. Trans. Soc. Linn. VII. 15. Bot. Mag. t. 457. DC. Plant. grass. t. 75. Reichenb. Mag. t. 83. Schultes f. Syst. VII. 707. *Aloë disticha* ε. *plicatilis* Linn. Spec. 459. *Kumara disticha* Medik. Theod. 74. t. 4. *Rhipidodendron distichum* Willd. Mag. naturf. Fr. V. 165. *Rhipidodendron plicatile* Haworth Revis. 45. (Commel. Hort XI. 5. t. 3.) — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Major* Salm-Dyck Cat. rais. 30. Schultes f. Syst. VII. 707. *Aloë plicatilis* Jacq. Hort. Schönbr. t. 433? *Rhipidodendron plicatile* β. *majus* Haw. Revis. 45.

e. **Bowiea.**

854. **Aloë Bowiea** Schultes f. Syst. VII. 704. *Bowiea africana* Haworth Philos. Magaz. et Journ. 1824. Oct. 299 1827. Febr. 123. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

f. **Aloë.**

a. *Acaules, v. caule brevissimo.*

855. **Aloë humilis** Lamarck Enc. meth. I. 88. Haworth Syn. 85. in Trans. Soc. Linn. VII. 15. Salm-Dyck Cat rais. 20. Willd. Enum. hort. berol. 385. Magaz. naturf. Fr. V. 287. DC. Plant. grass. t. 39. Schultes f. Syst. VII. 682. *Aloë perfoliata ξ. humilis* Hort. Kew. ed. 1. 467. *Aloë perfoliata o. humilis* Linn. Spec. 458. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

856. **Aloë incurva** Haworth Synops. 85. Schultes f. Syst. VII. 1714. *Aloë humilis γ. incurva* Salm-Dyck Cat. rais. 20. Haworth in Trans. Soc. Linn. VII. 15. Schultes f. Syst. VII. 682 *Aloë humilis* Jacq. Hort. Schönbr. t. 420. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

857. **Aloë echinata** Willd. Enum. Hort. berol. 385. Magaz. naturf. Fr. Berl. V. 278. Salm-Dyck Cat. rais. 21. Haworth Revis. 42. Schultes f. Syst. VII. 684. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

858. **Aloë tuberculata** Haworth Synops. succ. 84. Trans. Soc. Linn. VII. 16. Salm-Dyck Cat. rais. 21. Schultes f. Syst. VII. 684. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

859. **Aloë acuminata** Haworth Synops. succ. 84. Salm-Dyck Cat. rais. 21. Schultes f. Syst. VII. 685. *Aloë suberecta α* Haw. Trans. Soc. Linn. VII. 16. *Aloë humilis* Bot. Mag. 757. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

860. **Aloë virens** Haworth Synops. 83. Transact. Soc. Linn. VII. 17. Salm-Dyck Cat. rais. 22. Willd. Mag. naturf. Fr. Berl. V. 279. Bot. Mag. 1355. Schultes f. Syst. VII. 686. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. *Caule senectute suffruticoso.*

a. Foliis immaculatis.

861. **Aloë prolifera** Haworth in Transact. Soc. Linn. VII. 16. Salm-Dyck Cat. rais. 23. Schultes f. Syst. VII. 686. *Aloë brevifolia* Haworth Synops. 80. Revis. 202. DC. Plant. grass. t. 91. Bot. Reg. t. 996. *Aloë perfoliata γ.* Lamarck Enc. meth. n. 11. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

862. **Aloë Serra** DC. Plant. grass. t. 80 Salm-Dyck Cat. rais 23. Haworth Suppl 44. Jacqu. Fragm. bot. 47. t. 61. Schultes f. Syst. VII. 687. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

863. **Aloë depressa** Haworth in Transact. Soc. Linn. VII. 10. Synops. 80. Salm-Dyck Cat. rais. 23. Willd. Mag. naturf. Fr. Berl. V. 282. Schultes f. Syst. VII. 688. *Aloë perfoliata β. depressa* Hort. Kew. ed. 1. *Aloë perfoliata ζ.* Linn. Spec. 458. Willd. Spec. II. 185. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

864. **Aloë glauca** Mill. Dict. ed. 8. Haworth Transact. Soc Linn. VII. 18. Syn. 79. Salm-Dyck Cat. rais. 24. Schultes f Syst. 690 *Aloë perfoliata ζ.* Willd. Spec. II. 186 Haw. Synops. 79. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

α. Elatior Salm-Dyck Cat. rais. 24. Schultes f. Syst. VII. 690. *Aloë glauca* Willd. Mag. naturf. Fr. 280.

β. Humilior Salm-Dyck Cat. rais. 24. *Aloë rhodacantha* DC. Plant. grass. t. 44. Willd. Mag. naturf. Fr. V. 280. *Aloë glauca γ. humilior* Schultes f. Syst. VII. 690.

γ. Spinosior Haw. Revis. 40. *Aloë glauca δ. spinosior* Schultes f. Syst. VII. 690. *Aloë muricata* Schult. Obs. 70.

865. **Aloë paniculata** Jacq. Fragm. 48. t. 68. Willd. Mag. naturf. Fr. Berl. V. 281. Salm-Dyck Cat. rais. 24. Schultes f. Syst. VII. 691. *Aloë striata* Haw. Synops. 81. Transact. Soc. Linn. VII. 18. Suppl. 44. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

866. **Aloë barbadensis** Mill. Dict. ed. 8. n. 2. Haw. in Transact. Soc. Linn. VII. 19. Synops. 79. Schultes f. Syst. VII. 693. *Aloë perfoliata γ. barba-*

densis Hort. Kew. ed. 1. 466. *Aloë vulgaris barbadensis* DC. plant. grass. 27. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Vulgaris. Aloë vulgaris Lam. Enc. meth. I. 86. Desf. Flor. atl. I. 310. Willd. Mag. naturf. Fr. 280. Salm-Dyck Cat. rais. 25, *Aloë perfoliata* λ. *vera* Willd. Spec. II. 186. Brown Jam. 197. *Kadanaku* Rheede Malab. XI. 7. t. 3. *Aloë perfoliata vulgaris* Aubl. Guian. I. 304. Moris. hist. I. 414. S. IV. t. 22. f. 1. Lobel Ic. 374. *Caraguata* Marcg. Bras.. 37. ic.

β *Elongata* Schultes f. Syst. VII. 693. *Aloë elongata* Murr. Comm. Goett. IX. 191. t. 2. Ejusd. Opusc. II. 481. *Aloë vulgaris* Willd. Enum. et Mag. naturf. Fr. V. ♄. Habitat in India orientali (Rheede); in America culta?: Var. α in Italiae, Siciliae, Melittae tectis muris.

Offic. Succus Aloës barbadensis. β. *Foliis maculatis.*

867. **Aloë variegata** Linn. Spec. 459 Haw. Synops. 81. Transact. Soc. Linn. VII. 14. Willd. Mag. naturf. Fr. V. 279. Salm-Dyck Cat. rais. 26. DC. Plant. grass. t. 21. Bot. Mag. t. 513. Schultes f. Syst. VII. 696. *Aloë punctata* Haw. Transact. Soc. Linn. VII. 26. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

868. **Aloë tenuifolia** Lamarck Enc. meth. I. 87. Willd. Mag. naturf. Fr. Berl. V. 279. Salm-Dyck Cat. rais. 26. Schultes f. Syst. VII. 698. — ♄ — *Habitat in Africa.*

869. **Aloë grandidentata** Salm-Dyck Obs. bot. in Hort. Dyck. 1822. Schultes f. Syst. VII. 699. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

870. **Aloë Saponaria** Haw. Synops. 83. Schultes f. Syst. VII. 699. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

α. *Minor* Haw. in Transact. Soc. Linn. VII. 17. Bot. Mag. t. 1460. Schultes f. Syst. VII. 699. *Aloë umbellata* DC. Plant. grass. t. 98. *Aloë picta* β. Hort. Kew. ed. 2. II. 293. *Aloë perfoliata* ϑ. Linn. Spec. 458.

β. *Picta* Salm-Dyck Cat. rais. 26. Schultes f. Syst. VII. 700. *Aloë umbellata striata* H. S. Sebast. *Aloë Saponaria* β. *luteo striata* Haw. Revis. 41. *Aloë africana* Hortor. lombard.

871. **Aloë latifolia** Haw. Synops. 82. Salm-Dyck Cat. rais. 28. Schultes f. Syst. VII. 700. *Aloë*

Saponaria β. latifolia Haw. in Transact. Soc. Linn. VII. 18. Bot. Mag. t. 1346. *Aloë umbellata a. major* DC. plant. grass. t. 98. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

γ. Caule fruticoso.

872. **Aloë soccotorina** Lam. Enc. meth. I. 85. Haw. Syn. 75. Transact. Soc. Linn. VII. 19. Schultes f. Syst. VII. 702. DC. plant. grass. t. 85. Willd. Mag naturf. Fr. V. 281. *Aloë soccotorina a. minor* Bot. Mag. t. 1474. *Aloë perfoliata ξ.* Linn. Spec. 458. *Aloë sinuata* Thunberg Diss. n. 5. Prodr. 61. Flor. cap. ed. Schult 311. Willd. Spec II. 187. — ♄ — *Habitat in Soccotora; culta in Barbados.*

Offic. Aloë soccotorina.

873. **Aloë caesia** Salm-Dyck Cat. rais. 29. Schultes f. Syst. VII. 706. — ♄ — *Colitur in horto Dyck., Confluent., Bruxell.*

874. **Aloë frutescens** Salm-Dyck Cat. rais. 30. Haworth Suppl. pl succ. 46. Schultes f. Syst. VII. 708. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

875 **Aloë arborescens** Mill Dict. n. 3. Haw. in Transact. Soc. Linn VII. 20. Synops. 176. Andrews Bot. Repos. t. 468. DC. Plant. grass. t. 38. Schultes f. Syst. VII. 708. Willd. Enum. 382. Magaz. naturf. Fr. V. 281. Salm-Dyck Cat. rais. 31. Bot. Mag. t. 1306. *Aloë perfoliata a. arborescens* Hort. Kew. ed. 1. 466. *Aloë perfoliata η.* Linn. Spec. 458. *Aloë fruticosa* Lam. Enc. meth. I. 87. *Aloë arborea* Medik. Bot. Beob. 305. *Catevala arborea* Medik. Theod. 67. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Offic. Aloë capensis.

ε. **Pachydendron.**

876. **Aloë Principis** Endl. *Aloë Salm-Dyckiana* Schultes f. Syst. VII. 710. *Aloë africana* Salm-Dyck Cat. rais. 62. *Pachydendron Principis* Haw. Revis. 37. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

877. **Aloë ferox** Lamarck Enc. meth. I. 87. Haw. Synops. 77. in Transact. Soc. Linn. VII. 21.

Salm - Dyck Cat. rais.. 31. DC. Plant. grass. t. 32. Munt Aloid. p. 16. f. 17. Schultes f. Syst. VII. 710. *Aloë perfoliata γ.* Linn. Spec. 457. *Aloë perfoliata ϑ. ferox* Hort. Kew ed. I. 467. *Pachydendron ferox* Haw. Revis. 38. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

878. **Aloë xanthacantha** Willd. Mag. naturf. Fr. V. 282. Salm - Dyck Cat. rais. 33. Haworth Suppl. pl. succ. 48. Schultes f. Syst. VII. 714. *Aloë mitraeformis* Hort. Eltham. t. 17.? *Aloë mitraeformis patula* Hortor. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

879. **Aloë mitraeformis** Willd. Mag. naturf. Fr. Berl. V. 282. Salm - Dyck Cat. rais. n. 33. Haw. Revis. 43. Schultes f. Syst. VII. 714. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

880. **Aloë distans** Haworth Revis. 43 Synops. 78. Schultes f. Syst. VII. 714. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

a. Brevifolia Salm - Dyck Cat. rais. 33. Schultes f. Syst. VII. 714, *Aloë mitraeformis humilior* Willd. *Aloë mitraeformis brevifolia* Bot. Mag. t. 1362. *Aloë mitraeformis β. angustior* Lam. Dict. I. 87. *Aloë brevifolia* Haw. in Transact. Soc. Linn. VIII. 23.

1116. Lomatophyllum Willd.

881. **Lomatophyllum borbonicum** Willd. in Berl. Magaz. v. 166. Schultes f. Syst. VII. 361. *Aloë marginata* DC. Pl. gr t. 31. *Dracaena marginata* Aiton Hort. Kew. ed 1. II. 454. *Phylloma aloiflorum* Ker in Bot. Mag. t. 1585. — ♄ — *Habitat in insula Bourbon.*

882. **Lomatophyllum macrum** Salm-Dyck ex Schultes f. Syst. VII. 1715. *Aloë macra* Haworth Suppl. 45. Rev. 42 — ♄ — *Habitat in insula Mauritii.*

1117. Yucca Linn.

* Serrulatae.

883. **Yucca aloifolia** Linn. Spec. 457. DC. Pl. gr. t. 20. Redouté Liliac. t. 401. 402. Sims Bot.

Mag. t. 1700. Schultes f. Syst. VII. 716. — 5 — *Habitat in Florida et Carolina.*

β. *Variegata.*

884. **Yucca longifolia** Karwinsky in Schultes f. Syst. VII. 1715. — 5 — *Habitat in temperatis reipublicae Mexicanae ad San Jose del Oro.*

885. **Yucca Draconis** Linn. Spec. 457. Gärtner Carp. II. 34. t. 85. Schultes f. Syst. VII. 716. *Yucca Harruckeriana* Crantz Diss. d. arb. Drac. 29. — 5 — *Habitat in Carolina australi.*

886. **Yucca armata** Haworth Suppl. 33. Schultes f. Syst. VII. 717. — 5 — *Patria ignota.*

** **Spinosae.**

887. **Yucca acrotricha** Schiede ex Schultes f. Syst. VII. 1716. — 5 — *Habitat in Serro de la Ventana et prope Ixmipilquan reipublicae Mexicanae.*

888. **Yucca serratifolia** Karwinsky in Schultes f. Syst. VII. 1716. — 5 — *Habitat in vallibus temperatis ad San Jose del Oro reipublicae Mexicanae.*

*** **Filiferae.**

889. **Yucca recurva** Salisbury Parad. t. 31. Schultes f. Syst. VII. 719. *Yucca recurvifolia* Pursh Flor. Bor. Amer. 1. 228. — 5 — *Habitat in oris arenosis Georgiae.*

**** **Superbae.**

890. **Yucca gloriosa** Linn. Spec. 456. Redouté Liliac. t. 326. 327. Sims in Bot. Mag. t. 1260. Schultes f. Syst. VII. 721. — 5 — *Habitat in Carolina et Virginia.*

Subordo IV. Asphodeleae.

Tribus I. Hyacintheae.

1118. Muscari Tournef.

891. **Muscari ciliatum** Ker in Bot. Reg. t. 394. Schultes f. Syst. VII. 588. *Hyacinthus ciliatus* Cy-

rill. Neap. II. 22. t. 10. *Hyacinthus comosus byzantinus* Clusius Hist. I. 180. — ♃ — *Habitat in pratis Europae australis, Tauriae, Caucasi et Syriae.*

892. **Muscari Strangwaysii** Tenore Index Sem. Hort. Neap. 1837. p. 5. 1839. p. 12. — ♃ — *Natum in horto Neapolitano, e bulbis Constantinopoli ad illustr. Strangways missis.*

» Folia linearia, erecta, scapum superantia. Flores laxe racemosi, perigoniis ovatis, laete caeruleis, summis oblongis, sterilibus, ore sexdentato, dentibus albis, revolutis. « Tenore l. c.

893. **Muscari comosum** Miller Dict. n. 2. Schultes f. Syst. VII. 589. *Hyacinthus comosus* Linn. Spec. 455. Jacq. Flor. austr. t. 126. — ♃ — *Habitat inter segetes Europae mediae et australis passim.*

β. *Monstrosum. Hyacinthus monstrosus* Linn. Spec. 454.

894. **Muscari moschatum** Desfont. Hort. paris. Schultes f. Syst. VII. 590. *Muscari ambrosiacum* Mönch Method. 633. Redouté Liliac. t. 132. *Hyacinthus Muscari* Linn. Spec. 454. Schkuhr t. 96. *Muscari* Clus. Hist. I. 176. — ♃ — *Habitat in Oriente, Constantinopoli anno 1554 advectum.*

Officin. exolet. Radix Muscari.

895. **Muscari botryoides** Miller Dict. n. 1. Schultes f. Syst. VII. 591. *Hyacinthus botryoides* Linn. Spec. 455. Curtis Bot. Mag. t. 157. — ♃ — *Habitat in pratis et collibus Europae mediae et australis.*

896. **Muscari autumnale** Gussone Index sem. horti Boccadif. 1825. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

897. **Muscari racemosum** Willd. Enum. 378. Redouté Liliac. t. 232. Schultes f. Syst. VII. 593. *Hyacinthus racemosus* Linn. Spec. 455. Jacq. Flor. austr. t. 187. — ♃ — *Habitat in collibus pratis et vineis Europae mediae et australis.*

898. **Muscari commutatum** Gussone Prodr. Flor. sic. I. 426. Schultes f. Syst. VII. 594. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

1119. Bellevalia Lapeyr.

899. **Bellevalia romana** Reichenb. Flor.

Germ. 105. *Bellevalia operculata* Lapeyr. in Journ. Phys. LXVII. 425. t. 1. *Bellevalia appendiculata* Lapeyr. Abreg. 186. *Hyacinthus romanus* Linn. Syst. 335. Redouté Liliac. t. 334. Sibthorp Flor. graec. t. 340. Schultes f. Syst. VII. 587. *Scilla romana* Ker in Bot. Mag. t. 939. — ♃ — *Habitat in Italia, Gallia meridionali et Pyrenaeis.*

1120. Hyacinthus Linn.

900. **Hyacinthus orientalis** Linn. Spec. 454. Ker Bot. Mag. t. 937. Bot. Reg. t. 995. Schultes f. Syst. VII. 581. — ♃ — *Habitat in Oriente prope Bagdad et Aleppo, in Barbaria, et in Gallia littorali prope Telonem et Nicaeam.*[1]

901. **Hyacinthus amethystinus** Linn. Spec. 454. Bot. Reg. t. 398. Bot. Mag. t. 2425. Redouté Liliac. t. 14. Schultes f. Syst. VII. 582. — ♃ — *Habitat in Pyrenaeis montibus.*

902. **Hyacinthus pallens** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. I. 283. Reichenb. Iconogr. t. 331. Schultes f. Syst. VII. 583. *Muscari pallens* Fischer Catalog. Hort. Gorenk. 1812. p. 9. — ♃ — *Habitat in Podolia, prope Odessam, et in planitie caucasica.*

1121. Veltheimia Gleditsch.

903. **Veltheimia viridifolia** Jacq. Hort. Schönbr. I. 41. t. 78. Schultes f. Syst. VII. 628. *Veltheimia capensis* Gleditsch Act. berol. 1769. p. 66. Redouté Liliac. t. 193. *Aletris capensis* Linn. Spec. 456 Act. Holm. 1770. p. 229. t. 5. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1122. Uropetalum Ker.

904. **Uropetalum serotinum** Ker in Bot. Reg. 156. Schultes f. Syst. VII. 617. *Hyacinthus serotinus* Linn. Spec. 453. Cavanill. Ic. t. 30. Redouté Liliac. t. 202. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea occidentali.*

1123. **Agraphis** Link. Sternhyacinth.

905. **Agraphis campanulata** Link Handb. III. 166. *Scilla campanulata* Aiton Hort. Kew. ed. 1. I. 214. ed. 2. II. 263. Redouté Liliac. t. 435. *Scilla hyacinthoides* Jacq. Ic. rar. t. 65. non Linn. *Scilla Jacquini* Gmelin Syst. V. 552. — ♃ — *Habitat in Hispania et Lusitania.*

906. **Agraphis patula** Reichenb. Flor. Germ. 105. *Scilla patula* Redouté Liliac. t. 225. Schultes f. Syst. VII. 576. *Hyacinthus patulus* Poiret Suppl. III. 190. — ♃ — *Habitat in Gallia meridionali, Italia, Lusitania.*

907. **Agraphis nutans** Link Handb. III. 166. *Scilla nutans* Smith E. B. t. 377. Redouté Liliac. t. 224. Ker in Bot. Mag. t. 1102. Schultes f. Syst. VII. 577. *Hyacinthus non scriptus* Linn. Spec. 453. *Usteria hyacinthiflora* Medikus in Act. Palat. VI. 480. — ♃ — *Habitat in Anglia et in Europa orientali et meridionali.*

908. **Agraphis cernua** Reichenb. Flor. Germ. 105. *Scilla cernua* Link et Hoffmans. in Berlin. Schrift. nat. Fr. IV. 19. Schultes f. Syst. VII. 578. *Hyacinthus cernuus* Linn. Spec. 453. — ♃ — *Habitat in sylvis umbrosis humidiusculis Hispaniae et Lusitaniae.*

1124. **Lachenalia** Jacq.

909. **Lachenalia orchioides** Jacq. Collect. III. 241. Ic. rar. III. t. 390. Schultes f. Syst. VII. 603. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

910. **Lachenalia lucida** Ker in Bot. Mag. t. 1372. Schultes f. Syst. VII. 605. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

911 **Lachenalia purpurea** Jacq. Collect. Suppl. 65. Ic. rar. II. t. 393 Schultes f. Syst. VII. 609. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

912. **Lachenalia unifolia** Jacq. Hort. Schönbr. I. 43. t. 83. Schultes f. Syst. VII. 611. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

913 **Lachenalia tricolor** Thunb. Prodr. 64.

Curtis Bot. Mag. t. 82. Redouté Liliac. t. 2. Schultes f. Syst. VII. 612. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

914. **Lachenalia luteola** Jacq. Collect. IV. 148. Ic. rar. II. t. 395. Schultes f. Syst. VII. 612. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

915. **Lachenalia quadricolor** Jacq. Collect. Suppl. 62. Ic. rar. II. t. 396. Schultes f. Syst. VII. 613. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

916. **Lachenalia pendula** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 461. ed. 2. II. 288. Jacq. Collect. III. 239. Ic. rar. II. t. 400. Schultes f. Syst. VII. 615. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1125. **Drimia** Jacq.

917. **Drimia lancaefolia** Ker. Schrader Hort. Götting. 1. Schultes f. Syst. VII. 594. *Lachenalia lancaefolia* Jacq. Collect. Suppl. 69. Ic. rar. II. t. 402. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1128. **Eucomis** Herit.

918. **Eucomis punctata** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 433. Redouté Liliac. t. 208. Schultes f. Syst. VII. 622. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

919. **Eucomis regia** Heritier Sert. angl. 17. Redouté Liliac. t. 175. *Eucomis undulata* Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 433. ed. 2. II. 246. Schultes f. Syst. VII. 622. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1130. **Scilla** Linn.

920. **Scilla hyacinthoides** Linn. Suppl. 201. Ker in Bot. Mag. t. 1140. Schultes f. Syst. VII. 557. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

921. **Scilla clusiana.** *Scilla peruviana* Linn. Spec. 442. Redouté Liliac. t. 167. Bot. Mag. t. 749. Schultes f. Syst. VII. 558. *Hyacinthus stellatus peruvianus* Clusius Hist. 182. *Eriophorus peruvianus* Clusius Hist. 173. — ♃ — *Habitat in pascuis Lusitaniae, in*

Mauritania, Sicilia, Sardinia et Corsica, nec in Peruvia.

β *Flore albo* Tournef.

922. **Scilla Cupaniana** Gussone Prodr. Flor. sic. I. 416. Schultes f. Syst. VII. 559. *Hyacinthus stellatus caeruleus umbellatus latifolius* Cupan. Panph. V. 1. t. 20 1. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

923. **Scilla italica** Linn. Spec. 442. Redouté Liliac. t. 304. Curt. Bot. Mag. t. 663. Schultes f. Syst. VII. 561. — ♃ — *Habitat in Helvetia et in collibus januensibus.*

924 **Scilla pratensis** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. II. t. 189. Schultes f. Syst. VII. 562. — ♃ — *Habitat in pratis Croatiae prope Korenicza.*

β *Amethystina. Scilla amethystina* Visiani in Flora 1829. Ergänzbl. p. 6.

925. **Scilla obtusifolia** Desfont. Flor. atlant. I. 299. t. 86. Redouté Liliac. t. 190. Schultes f Syst. VII. 566. — ♃ — *Habitat in pratis prope la Calle Barbariae.*

926. **Scilla autumnalis** Linn. Spec. 443. E. B. t. 78. Redouté Liliac. t. 317. Schultes f. Syst. VII. 568. — ♃ — *Habitat in Europa occidentali et australi, in Barbaria et Tauria.*

927. **Scilla bifolia** Linn. Spec. 443. E. B. t. 24. Schultes f. Syst. VII. 569. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis Europae totius et Tauriae.*

928. **Scilla amoena** Linn. Spec. 443. Jacq. Flor. austr. t. 218. Redouté Liliac. t. 298. Schultes f. Syst. VII. 571. — ♃ — *Habitat in pomariis Europae australioris.*

1131. **Urginea** Steinh.

929. **Urginea undulata** Steinheil in Nouv. Annal. sc. nat. I. 330. *Scilla undulata* Desfont. Flor. atlant. I. 300. t. 88. Schultes f. Syst. VII. 566. — ♃ — *Habitat in Sardinia et Mauritania.*

1131. **Squilla** Steinh.

930. **Squilla maritima** Steinheil in Nouv. Annal. sc. nat. VI. 276. *Urginea Scilla* Steinheil in Nouv. Annal. sc. nat. I. 330. t. 14. f. 2. *Scilla maritima* Linn. Spec. 442. Redouté Liliac. t. 116. Hayne Offic. Gew. IX. t. 21. Nees Pl. offic. t. 55. Schultes f. Syst. VII. 556. *Ornithogalum maritimum* Lam. Flor. fr. III. 276. — ♃ — *Habitat in oris maritimis mediterraneis.*

Officin. Radix Squillae marinae.

1132. **Ornithogalum** Linn.

931. **Ornithogalum arabicum** Linn. Spec. 441. Ker in Bot. Mag. t. 728. Schultes f. Syst. VII. 511. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

932. **Ornithogalum latifolium** Linn. Spec. 440. Jacq. Collect. II. 318. Ic. rar. t. 424. Ker Bot. Mag. t. 876. — ♃ — *Habitat in Arabia et Aegypto.*

933. **Ornithogalum narbonense** Linn. Spec. 440. Schultes f. Syst. VII. 515. — ♃ — *Habitat in Gallia australi, Italia et Caucaso.*

β. *Caucasicum.*

934. **Ornithogalum pyrenaicum** Linn. Spec. 440. Jacq. Flor. austr. t. 103. Schultes f. Syst. VII. 517. — ♃ — *Habitat in umbrosis sylvaticis montium Europae fere totius et Tauriae.*

β. *Tauricum.*

935. **Ornithogalum stachyoides** Aiton Hort. kew. ed. 1. II. 441. ed. 2. II. 259. Schultes f. Syst. VII. 518. — ♃ — *Habitat in Graecia et Asia minore.*

936. **Ornithogalum longebracteatum** Jacq. Hort. Vindob. I. t. 29. Redouté Liliac. t. 119. Schultes f. Syst. VII. 521. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

937. **Ornithogalum scilloides** Jacq. Hort. Schönbr. I. 46. t. 88. Schultes f. Syst. VII. 522. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

938. **Ornithogalum pilosum** Thunb. Prodr.

61. Linn. Suppl. 199. Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 41. Schultes f. Syst. VII. 523. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

939. **Ornithogalum Rudolphi** Jacq. f. Eclog. 31. et 151. t. 20. Schultes f. Syst. VII. 525. *Ornithogalum rupestre* Rudolphi in Schrad. Journ. 1799. II. 281. *Ornithogalum tenuifolium* Redouté Liliac. t. 312. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

940. **Ornithogalum Ecklonii** Fischer et C. A. Meyer Index VI. Sem. hort. Petrop. 1839. p. 62. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

941. **Ornithogalum polyphyllum** Jacq. Collect. Suppl. 79. Ic. rar. t. 430. Schultes f. Syst. VII. 524. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

942. **Ornithogalum comosum** Linn. Spec. 440. Jacq. Collect. II. 313. Ic. rar. t. 426. Schultes f. Syst. VII. 530. — ♃ — *Habitat in montanis sylvaticis Austriae et Hungariae.*

943. **Ornithogalum lanceolatum** Labillard. Syr. Dec. V. t. 8. f. 1. Schultes f. Syst. VII. 531. — ♃ — *Habitat in Syria, unde semina misit Theodorus Kotschy.*

944. **Ornithogalum montanum** Cyrillo ex Tenore Flor. neap. 176. t. 33. Schultes f. Syst. VII. 531. — ♃ — *Habitat in regno neapolitano et Sicilia.*

945. **Ornithogalum umbellatum** Linn. Spec. 441. Jacq. Flor. austr. t. 343. Redouté Liliac. t. 143. Schultes f Syst. VII. 532. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis et pomariis Europae totius, Tauriae, Caucasi et Americae borealis.*

Officin. exolet. Radix Ornithogali vulgaris.

946. **Ornithogalum tenuifolium** Gussone Flor. sic I. 413. Schultes f. Syst. VII. 533. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

947. **Ornithogalum refractum** Kitaibel in Schultes Oesterr. Flor. 1. 559. Reichenb. Iconogr. t. 142. Schultes f. Syst. VII. 533. — ♃ — *Habitat in graminosis Hungariae.*

948. **Ornithogalum exscapum** Tenore

Flor. neap. 175. t. 34. Schultes f. Syst. VII. 534. — ♃ — *Habitat in regno neapolitano, Sicilia et Sardinia.*

1133. Albuca Linn.

* **Triandrae.**

949. **Albuca altissima** Dryand. in Act. Holm. 1784. p. 292. Jacq. Collect. II. 264. Schultes f. Syst. VII. 494. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

950. **Albuca major** Linn. Spec. 438. Dryand. in Act. Holm. 1784. p. 293. Jacquin Ic. rar. t. 443. Redouté Liliac. t. 69. Ker in Bot. Mag. t. 804. Schultes f. Syst. VII. 495. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

951. **Albuca minor** Linn. Spec. 438. Dryand. in Act. Holm. 1784. p. 294. Redouté Liliac. t. 21. Ker in Bot. Mag. t. 720. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

** **Hexandrae.**

952. **Albuca fastigiata** Dryand. in Act. Holm. 1784. p. 296. Andrews Bot. Reposit. t. 450. Redouté Liliac. t. 474. Ker in Bot. Reg. t. 277. Schultes f. Syst. VII. 498. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

953. **Albuca setosa** Jacq. Collect. Suppl. 100. t. 14. f. 3. Ic. rar. t. 440. Ker in Bot. Mag. t. 1481. Schultes f Syst. VII. 498. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

954. **Albuca vittata** Ker in Bot. Mag. t. 1329. Schultes f. Syst. VII. 500. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

955. **Albuca abyssinica** Dryand. in Act. Holm. 1784. Jacq. f. Collect. IV. 221. t 2. f. 10. Ic. rar. t. 64. Redouté Liliac. t. 195. Schultes f. Syst. VII. 500. *Ornithogalum abyssinicum* Hort. Paris. — ♃ — *Habitat in Abyssinia.*

956. **Albuca fragrans** Jacq. Hort. Schönbr. I. 44. t. 84. Schultes f. Syst. VII. 501. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

957. **Albuca viscosa** Linn. Suppl. 196. Dryand. in Act. Holm. 1786. p. 58. Jacq. Ic. rar. t. 445. Schultes f. Syst. VII. 501. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1134. **Myogalum** Link.

958. **Myogalum nutans** Link Handb. I. 164. *Albuca nutans* Reichenb. Flor. Germ. 110. *Ornithogalum nutans* Linn. Spec. 440. Jacq. Flor. Austr. t. 301. Redouté Liliac. t. 253. Hooker Flor. Lond. t. 94. Schultes f. Syst. VII. 506. — ♃ — *Habitat in cultis totius Europae.*

959 **Myogalum thyrsoides.** *Ornithogalum thyrsoides* Jacq. Hort. Vindob. III. 17. t. 18. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

960. **Myogalum flavescens.** *Ornithogalum flavescens* Jacq. Collect. III. 233. Ic. rar. t. 437. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

961. **Myogalum coarctatum.** *Ornithogalum coarctatum* Jacq. Collect. Suppl. 77. Ic. rar. t. 435. Schultes f. Syst. VII. 511. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1135. **Puschkinia** Adams.

962. **Puschkinia scilloides** Adams in Nov. Act. petropolit. XIV. 164. t. B. Bieberst. Plant. ross. II. t. 91. Sims Bot. Mag. t. 2244. Lindley Collect. t. 24. Schultes f. Syst. VII. 554. *Adamsia scilloides* Willdenow in Berl. Magaz. II. 16. — ♃ — *Habitat in subalpinis montis Ararat et Beschtau.*

1137. **Allium** Linn. Lauch.

*** Porrum.**

963. **Allium sativum** Linn. Spec. 425. Hayne Officin. VI. t. 6 Don All. 4. Schultes f. Syst. VII. 1000. — ♃ — *Habitat in Sicilia et Galloprovincia.*

β. *Khirghisorum* Hort. Dorp.

Officin. Succus Allii sativi.

964. **Allium Ophioscorodon** Don All. 5. Schultes f. Syst. VII. 1000. *Allium Scorodoprasum* Lam. Dict. I. 66. *Allium Scorodoprasum* β. Linn. Spec. 426. — ♃ — *Habitat in Europa australi, passim sub nomine gallico* »Rocambole« *cultum.*

965. **Allium Scorodoprasum** Linn. Spec. 425. Flor. dan. t. 1455. Schultes f. Syst. VII. 1002. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

966. **Allium arenarium** Linn. Spec. 426. E. B. t. 1358. Don All. 6. Schultes f. Syst. VII. 1003. — ♃ — *Habitat in Europa media et boreali.*

967. **Allium vineale** Linn. Spec. 428. E. B. t. 1974. Reichenb. Iconogr. t. 404. Don All. 9. Schultes f. Syst. VII. 1005. — ♃ — *Habitat in montanis siccis Europae totius.*

968. **Allium Purshii** Don All. 10. Schultes f. Syst. VII. 1007. *Allium vineale* Pursh Flor. Bor. Amer. 1. 222. non Linn. *Allium canadense* Hort. — ♃ — *Habitat in Canada.*

969. **Allium Porrum** Linn. Spec. 423. Don All. 12. Schultes f. Syst. VII. 1008. — ♃ — *Patria ignota, in vineis Europae mediae et australis passim obvium, ex hortis profugum.*

Officin. exolet. Radix, herba et semen Porri (πράσον Dioscorid.).

970. **Allium Ampeloprasum** Linn. Spec. 423. Redouté Liliac. t. 385. E. B. t. 1657. Don All. 13. Schultes f. Syst. VII. 1010. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis Europae totius.*

971. **Allium rotundum** Linn. Spec. 423. Gaudin Flor. Helv. t. 10. f. 4. Don All. 14. Schultes f. Syst. VII. 1011. — ♃ — *Habitat in vineis Europae mediae et australis, nec non in Tauria.*

β. *Tauricum.*

972. **Allium sphaerocephalum** Linn. Spec. 426 Redouté Liliac. t. 391. Don All. 22. Schultes f. Syst. VII. 1018. — ♃ — *Habitat in rupestribus Europae totius.*

973. **Allium carneum** Willd. Enum. 359.

Don All. 23. Schultes f. Syst. VII. 1021. — ♃ — *Patria ignota.*

974. **Allium guttatum** Steven in Mem. Soc. nat. Mosq. II. t. 11. f. 1. Don All. 23. Schultes f. Syst. VII. 1022. — ♃ — *Habitat in Podolia et Tauria.*

975 **Allium ascalonicum** Linn. Spec. 429. Plenk Plant. offic. t. 258. Don All. 24. Schultes f. Syst. VII. 1023. — ♃ — *Habitat in Syria, sub nomine Echalotte et Ciboule passim cultum.*

Officin. exolet. Radix Cepae ascalonicae.

976. **Allium Cepa** Linn. Spec. 431. Sibthorp Flor. graec. t. 326. Don All. 25. Schultes f. Syst. VII. 1024. — ♃ — *Patria ignota, ab antiquissimis temporibus cultum.*

Offic. exolet. Radix s. bulbus Cepae (κρόμμυον Hippocrat. Dioscorid.)

** Schoenoprasum.

977. **Allium Schoenoprasum** Linn. Spec. 432. Flor. dan. t. 971. Schkuhr t. 91. Don All. 27. Schultes f. Syst. VII. 1025. — Schnittlauch. — ♃ — *Habitat per Europam omnem.*

978. **Allium foliosum** Clar. ex Redouté Liliac. t. 214. Reichenb. Iconogr. t. 478. Don All. 28. Schultes f. Syst. VII. 1026. — ♃ — *Habitat in Gallia, Helvetia et Sabaudia.*

979. **Allium sibiricum** Linn. Mant. 562. Don All. 29. Schultes f. Syst. VII. 1027. — ♃ — *Habitat in montibus Europae mediae et in Sibiria.*

980. **Allium Ledebourianum** Schultes f. Syst. VII. 1029. *Allium uliginosum* Ledebour Ic. t. 83. non Don. — ♃ — *Habitat in paludosis ad fluvium Belaya - Uva.*

981. **Allium fistulosum** Linn. Spec. 432. Plenk Plant. offic. t. 259. Don All. 30. Schultes f. Syst. VII. 1029. Colitur passim. — β. *ceratophyllum* Besser et Ledeb. — ♃ — *Habitat in Sibiria et alpibus altaicis.*

Officin. exolet. Radix Cepae oblongae.

982. **Allium obliquum** Linn. Spec. 424. Re-

douté Liliac. t. 363. Don All. 32. Schultes f. Syst. VII. 1030. *Allium ramosum* Jacq. Ic. rar. t. 62. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

983. **Allium ramosum** Linn. Spec. 425. Don All. 32. Schultes f. Syst. VII. 1031. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

984. **Allium caeruleum** Pallas It. 137. t. 12. Link et Otto Ic. rar. 39. t. 20. *Allium caerulescens* Don All. 34. Schultes f. Syst. VII. 1032. — ♃ — *Habitat in salsuginosis ad fluvium Irtisch superiorem.*

985. **Allium pusillum** Cyrill. ex Tenore Catalog Hort. neap. 1813. p. 4. Don All. 35. Schultes f. Syst. VII. 1034. *Allium Codonoprasum* Reichenb. Iconogr. t. 515. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

*** **Macrospatha.**

986. **Allium oleraceum** Linn. Spec. 429. E. B. t. 488. Don All. 38. Schultes f. Syst. VII. 1037. — ♃ — *Habitat in agris et pomariis Europae totius.*

987. **Allium carinatum** Linn. Spec. 426. E. B. t. 1658. Don All. 40. Schultes f. Syst. VII. 1038. — ♃ — *Habitat in collibus et arvis Europae totius.*

988. **Allium flexum** Waldst. et Kitaibel Plant. rar Hung III. t. 278. Don All. 41. Schultes f. Syst. VII. 1041. *Allium flexuosum* Host Flor. austr. 1. 422. — ♃ — *Habitat in montanis et subalpinis Croatiae.*

989. **Allium violaceum** Willd. Suppl. 17. Don All. 41. Schultes f. Syst. VII. 1042. *Allium flexum* Reichenb. Iconogr. t. 417. — ♃ — *Habitat in Hungaria et Carniolia.*

990 **Allium paniculatum** Linn. Spec. 428. Don All. 44. Schultes f. Syst. VII. 1044. — ♃ — *Habitat in Europa australiore, regione mediterranea et Tauria.*

991. **Allium pallens** Linn. Spec. 427. Redouté Liliac. t. 272. Don All 45. Schultes f. Syst. VII. 1046. — ♃ — *Habitat in Europa australiore.*

992. **Allium flavum** Linn. Spec. 428 Jacq. Flor. austr. t. 141. Redouté Liliac. t. 119. Don All.

47. Schultes f. Syst. VII. 1051. — ♃ — *Habitat in saxosis asperis Europae australioris et Tauriae.*

993. **Allium caucasicum** Bieberst. Flor. taur. cauc. Suppl. 258. Don All. 48. Schultes f. Syst. VII. 1053. *Allium globosum* Redouté Liliac. t. 179. non Bieb. — ♃ — *Habitat in collibus saxosis Caucasi orientalis et Iberiae.*

994. **Allium globosum** Bieberst. Flor. taur. cauc. 1. 262. Don All. 50. Reichenb. Iconogr. t. 407. Schultes f. Syst. VII. 1055. — ♃ — *Habitat in collibus sterilibus Caucasi, Iberiae et Sibiriae.*

995. **Allium rupestre** Bieberst. Flor. taur. cauc. Suppl. 259. Don All. 49. Reichenb. Iconogr. t. 428. Schultes f. Syst. VII. 1055. — ♃ — *Habitat in rupestribus Tauriae et Iberiae.*

996. **Allium saxatile** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 70. t. 68. *Allium moschatum* Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 263. Host Flor. austr. 1. 424. — ♃ — *Habitat in Hungaria et Tauria.*

997. **Allium Stellerianum** Willd. Spec. II. 82. Don All. 54. Schultes f. Syst. VII. 1061. Ledebour Ic. t. 384. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

998. **Allium saxatile** Bieberst. Flor. taur. cauc. 1. 264. Plant. ross. I. t. 29. Don All. 54. Schultes f. Syst. VII. 1061. — ♃ — *Habitat in lapidosis calcareis Tauriae.*

**** Rhiziridea.

999 **Allium strictum** Schrader Hort. Götting. t. 1. Don All. 55. Schultes f. Syst. VII. 1062. — ♃ — *Habitat in rupestribus Germaniae mediae.*

1000. **Allium lineare** Linn. Spec. 423. Don All. 56. Schultes f. Syst. VII. 1064. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1001. **Allium nutans** Linn. Spec. 429. Bot. Mag. t. 1143. Don All. 57. Schultes f. Syst. VII. 1065. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1002. **Allium spirale** Willd. Suppl. 17. *Allium glaucum* Schrader Catalog. Hort. Götting. 1814.

Don All. 59. Schultes f. Syst. VII. 1066. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1003 **Allium baicalense** Willd. Enum. 1. 360. Hornem. Hort. Havn. 1. 323. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1004. **Allium senescens** Linn. Spec. 430. Don All. 57. Schultes f. Syst. VII. 1068. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi, nec non in Sibiria.*

1005. **Allium fallax** Schultes f. Syst. VII. 1072. *Allium angulosum* Allioni Flor. pedemont. n. 188. Jacq. Flor. austr. t. 423. Redouté Liliac. t. 281. non Linn. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

1006. **Allium acutangulum** Schrader in Willd. Suppl. 16. Don All. 62. Schultes f. Syst. VII. 1075. — ♃ — *Habitat in pratis Europae mediae et australis.*

1007. **Allium albidum** Fischer ex Besser Volhyn. 55 Don All. 63. Schultes f. Syst. VII. 1078. — ♃ — *Habitat in Volhynia et Caucaso.*

1008. **Allium rubens** Schrader ex Willd. Suppl. Don All. 65. Schultes f. Syst. VII. 1080. *Allium bisulcum* Redouté Liliac. t. 286. Reichenb. Iconogr. t. 476. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

1009. **Allium prostratum** Treviranus in N. A. N. C. XIII. 1. t. 11. Reichenb. Iconogr. t. 409. Don All. 66. Schultes f. Syst. VII. 1081. — ♃ — *Habitat in Sibiria Baicalensi.*

β. *Fischeri. Allium Fischeri* Besser msc.

1010. **Allium narcissiflorum** Villars Delph. II. 258. t. 6. Don All. 67. Schultes f. Syst. VII. 1083. — ♃ — *Habitat in Italia, Galloprovincia et Delphinatu.*

1011. **Allium suaveolens** Jacq. Collect. II. 305. Ic. rar. t. 364. Don All. 68. Schultes f. Syst. VII. 1084. — ♃ — *Habitat in pratis humidis Europae mediae et australis.*

1012. **Allium hymenorhizum** Ledebour Flor. alt. II. 12. Ic. t. 359. — ♃ — *Habitat in pratis uliginosis ad fluvium Koksun et Uba.*

1013. **Allium ochroleucum** Waldst. et Ki-

taibel Plant. rar. Hung. II. 204. t. 186. Reichenb. Iconogr. t. 467. Don All. 69. Schultes f. Syst. VII. 1085. — ♃ — *Habitat in subalpinis Europae australioris.*

1014. **Allium cernuum** Roth Catalect. II. 33. t. 2. Redouté Liliac. t. 345. Bot. Mag. t. 1324. Don All. 70. Schultes f. Syst. VII. 1088. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1015. **Allium carolinianum** Redouté Liliac. t. 101. Don All. 71. Schultes f. Syst. VII. 1089. — ♃ — *Habitat in Carolina.*

***** **Moly.**

1016. **Allium magicum** Linn. Spec. 424. Don All. 73. Schultes f. Syst. VII. 1091. — ♃ — *Habitat in Italia.*

1017. **Allium roseum** Linn. Spec. 432. Sibthorp Flor. graec. t. 314. Don All. 77. Schultes f. Syst. VII. 1095. — ♃ — *Habitat in Hispania, Gallia australi et Creta.*

1018. **Allium subhirsutum** Linn. Spec. 424. Sibthorp Flor. graec. t. 313. Don All. 78. Schultes f. Syst. VII. 1100. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

1019. **Allium graminifolium** Loisleur Flor. Gall. ed. 1. 724. ed. 2. 253. Schultes f. Syst. VII. 1101. — ♃ — *Habitat in dumetis Corsicae.*

1020. **Allium neapolitanum** Cyrillo Plant. rar. neap. 1. 13. t. 4. Don All. 86. Schultes f. Syst. VII. 1110. *Allium album* Savi in Santi Viagg. 352. t. 7. Redouté Liliac. t. 300. — ♃ — *Habitat in Italia, Gallia meridionali et Hispania.*

1021. **Allium atropurpureum** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 16. t. 17. Don All. 90. Schultes f. Syst. VII. 1118. — ♃ — *Habitat inter segetes comitatus Albensis Hungariae.*

1022. **Allium Moly** Linn. Spec. 432. Bot. Mag. t. 499. Don All. 92. Schultes f. Syst. VII. 1119. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

Offic. exolet. Radix Moly lutei.

****** **Ophioscorodon** Wallr.

1023. **Allium ursinum** Linn. Spec. 431. E. B. t. 122. Redouté Liliac. t. 303. Don All. 94. Schultes f. Syst. VII. 1121. *Ophioscorodon ursinum* Wallroth Sched. crit. 129. — Ramisch. — ♃ — *Habitat in pratis sylvaticis et pomariis Europae totius nec non Tauriae.*

Offic. exolet. Radix et herba Allii ursini s. latifolii.

******* **Victorialis.**

1024. **Allium Victorialis** Linn. Spec. 424. Jacq. Flor. austr, t. 216. Bot. Mag. t. 1222. Don All. 96. Schultes f. Syst. VII. 1122. — Allermannsharnisch. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae et australis, Caucasi et Sibiriae.*

β. *Angustifolium* Hall. Helv.

Officin. exolet. Radix Victorialis longae.

1025. **Allium odorum** Linn. Mant. 62. Don All. 97. Schultes f. Syst. VII. 1124. *Allium tataricum* Aiton Hort. Kew. ed. 2. II. 233. Redouté Liliac. t. 98. Bot. Mag. t. 1142. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1026. **Allium azureum** Ledebour Flor. Alt. III. 13. Ic. t. 136. — ♃ — *Habitat in montibus ad fluvium Kurtschum.*

******** **Ornithogaloidea.**

1027. **Allium fragrans** Venten. Cels. t. 26. Don All. 99. Schultes f. Syst. VII. 1125. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1028. **Allium striatum** Jacq. Collect. Suppl. 61. Ic. rar. t. 366. Don All. 100. Schultes f. Syst. VII. 1128. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1029. **Allium striatellum** Lindley in Horticult. Transact. VI. 97. Schultes f. Syst. VII. 1129. *Ornithogalum gramineum* Sims in Bot. Mag. t. 1129. — ♃ — *Habitat in Chili.*

Tribus II. Anthericeae.

1140. **Eremurus** Bieberst.

1030. **Eremurus spectabilis** Bieberst. Plant. ross. II. t. 61. Suppl. 269. Schultes f. Syst. VII. 482. *Asphodelus altaicus* Pallas Act. Petrop. 1779. p. 258. t. 10. — ♃ — *Habitat in campis elatis Caucasi septemtrionalis, et in rupibus Tauriae meridionalis.*

1142. **Asphodeline** Reichenb.

1031. **Asphodeline lutea** Reichenb. Flor. germ. 116. *Asphodelus luteus* Linn. Spec. 443. Jacq. Hort. Vindob. t. 77. Bot. Mag. t. 773. Redouté Liliac. t. 223. Schultes f. Syst. VII. 483. — ♃ — *Habitat in regionis mediterraneae lapidosis.*

Officin. exolet. Radix Asphodeli lutei.

1032 **Asphodeline capillaris.** *Asphodelus capillaris* Redouté Liliac. t. 380. Schultes f. Syst. VII. 484. — ♃ — *Patria ignota.*

1033. **Asphodeline taurica.** *Asphodelus tauricus* Pallas Ind. taur. Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 279. Redouté Liliac. t. 470. Schultes f. Syst. VII. 484. — ♃ — *Habitat in saxosis calcareis Tauriae.*

1034. **Asphodeline liburnica** Reichenb. Flor. germ. 116 *Asphodelus liburnicus* Scopoli Flor. carn. ed. 2. I. 245. t. 11. Jacq. f. Eclog. 113. t. 77. Schultes f. Syst. VII. 485. — ♃ — *Habitat in Dalmatia et Creta.*

1035. **Asphodeline cretica.** *Asphodelus creticus* Lam. Dict. I. 360. Desfont. Annal. Mus. X. 220. t. 11. Schultes f. Syst. VII. 485 Loddiges Bot. Cab. t. 915. — ♃ — *Habitat in Creta et Calabria.*

1141. **Asphodelus** Linn.

1036. **Asphodelus albus** Willd. Spec. II. 133. Schultes f. Syst. VII. 486. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae australis et orientalis.*

Officin. exolet. Radix Asphodeli albi.

1037. **Asphodelus ramosus** Linn. Spec. 444. Sibthorp Flor Graec. t 834 Schultes f. Syst. VII. 487. — ♃ — *Habitat in littoribus mediterraneis.*

Officin. exolet. Radix Asphodeli albi vera.

1038. **Asphodelus fistulosus** Linn. Spec. 444. Sibthorp Flor graec. t. 335. Bot. Mag. t. 984. Schultes f. Syst. VII. 490. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea passim.*

1143. Hemerocallis Linn.

1039. **Hemerocallis flava** Linn. Spec. 462. Jacq. Hort. Vindob. t. 139. Curtis Bot. Mag. t. 19. Schultes f. Syst. VII. 423. — ♃ — *Habitat in arvis Europae austro-orientalis et Sibiriae.*

1040. **Hemerocallis graminea** Andrews Bot. Reposit. t. 244. Sims Bot. Mag. t. 873. Schultes f. Syst. VII. 423. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1041. **Hemerocallis fulva** Linn. Spec. 462. Curt. Bot. Mag. t. 64. Redouté Liliac. t. 16. Schultes f. Syst. VII. 424. — ♃ — *Habitat in Europa australiore.*

1145. Anthericum Linn.

* **Anthericum** Schult.

1042. **Anthericum muricatum** Linn. Suppl. 202. Thunb. Prodr. 63. Schultes f. Syst. VII. 459. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1043. **Anthericum longifolium** Jacq. Collect. Suppl. 92. Ic. rar. II. t. 413. Schultes f. Syst. VII. 464. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1044. **Anthericum revolutum** Linn. Spec. 445. Ker Bot. Mag. t 1044. Schultes f. Syst. VII. 462. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1045. **Anthericum graminifolium** Willd. Spec. II. 139. Jacq. Ic. rar. II. t. 411. Schultes f. Syst. VII. 464. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1046. **Anthericum Liliago** Linn. Spec. 445. Jacq. Hort. Vindob. 83. Curtis Bot. Mag. t. 318. Schul-

tes f. Syst. VII. 467. *Phalangium Liliago* Schreber Spicileg. 36. Redouté Liliac. t. 269. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae totius.*

Officin exolet, **Herba, flores et semen Phalangii non ramosi.**

1047. **Anthericum ramosum** Linn. Spec. 445. Jacq. Flor. austr. t. 161. Flor. dan. t. 1157. Schultes f. Syst. VII. 467 *Phalangium ramosum* Lam. et DC. Fl. fr. III. 210. Redouté Liliac. t. 287. *Ornithogalum ramosum* Lam. Fl. fr. III. 279. *Horologium florae* Act. Bern. 1766. t. 6. — ♃ — *Habitat in collibus calcareis Europae totius.*

Officin. exolet. **Herba, flores et semen Phalangii ramosi. Radix Brusci spuria.**

** **Czackia** Andrz.

1048. **Anthericum Liliastrum** Linn. Spec. 445. Curtis Bot. Mag. t. 318. *Hemerocallis Liliastrum* Linn. Spec. ed. 1. p. 324. *Phalangium Liliastrum* Persoon Encheir. 1. 369. Redouté Liliac. t. 255. *Czackia Liliastrum* Andrzeiowsky Czackia. Krzem. 1818. 4. Schultes f. Syst. VII. 424. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae et meridionalis.*

Officin. exolet. **Radix Liliastri.**

*** **Bulbine** Linn.

1049. **Anthericum frutescens** Linn. Spec. 445. Willd. Spec. II. 142. Redouté Liliac. t. 283. DC. Plant. gr. t. 14. *Bulbine frutescens* Willd. Enum. 372. Schultes f. Syst. VII. 442. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1050. **Anthericum rostratum** Willd. Spec. II. 143. Jacq. Collect. Suppl. 82. Ic. rar. t. 403. *Bulbine rostrata* Willd. Enum. 372. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1051. **Anthericum semibarbatum** R. Brown Prodr. 276. *Bulbine semibarbata* Haworth Revis. 33. Schultes f. Syst. VII. 445. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia orientali et australi, nec non in insula Diemen.*

1052. **Anthericum annuum** Linn. Spec. 446.

DC. Plant. gr. t. 8. Redouté Liliac. t. 397. Sims Bot. Mag. t. 1451. *Bulbine annua* Willd. Enum. 372. Schultes f. Syst. VII. 445. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1146. Arthropodium R. Br.

1053. **Arthropodium cirrhatum** R. Brown in Bot. Mag. t. 2350. Bot. Reg. t. 709. Schultes f. Syst. VII. 441. A. Cunningh in Hooker Bot. Mag. Comp. II. 374. *Anthericum cirrhatum* Forst. Prodr. n. 148. —♃— *Habitat in rupestribus Novae Zeelandiae borealis ad sylvarum margines.*

1054. **Arthropodium paniculatum** R. Brown Prodr. 276. Bot. Mag. t. 1421. Schultes f. Syst. VII. 439. *Anthericum paniculatum* Andrews Bot. Reposit. t. 395. *Anthericum millefoliatum* Redouté Liliac. t. 58. —♃— *Habitat in Nova Hollandia circa Port Jackson.*

1055. **Anthropodium pendulum** DC. Catalog. Hort. monsp. 80. Schultes f. Syst. VII. 440. *Phalangium pendulum* Redouté Liliac. t. 360. *Anthericum multiflorum* Hortul. —♃— *Habitat in Nova Hollandia.*

1056. **Arthropodium minus** R. Brown Prodr. 276. Bot. Reg. t. 866. Schultes f. Syst. VII. 441. —♃— *Habitat in Nova Hollandia circa Port Jackson.*

1147. Chlorophytum Ker.

1057. **Chlorophytum inornatum** Ker in Bot. Mag. t. 1071. 1223. Schultes f. Syst. VII. 453. —♃— *Habitat in Sierra Leone.*

1058. **Chlorophytum Orchidastrum** Lindl. in Bot. Reg. t. 813. Schultes f. Syst. VII. 453. —♃— *Habitat in Sierra Leone.*

1059. **Chlorophytum elatum** R. Brown Prodr. 277. in not. Schultes f. Syst. VII. 454. *Anthericum elatum* Aiton Hort. Kew. ed. I. 448. ed. 2. II. 268. *Phalangium elatum* Poiret Dict. V. 248. Re-

douté Liliac. t. 191. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1150. **Thysanotus** R. Br.

1060. **Thysanotus elatior** R. Brown Prodr. 283. —♃— *Habitat in Nova Hollandia orientali extratropica.*

1151. **Caesia** R. Br.

1061. **Caesia Helleri** Hügel msc. —♃— *Habitat in Nova Hollandia.*

*Conanthereae.

1158. **Echeandia** Orteg.

1062. **Echeandia terniflora** Ortega Dec. pl. 90. Redouté Liliac. t. 313. *Conanthera Echeandia* Persoon Encheir. I. 370. Schultes f. Syst. VII. 432. Link et Otto Ic. rar. t. 3. *Anthericum reflexum* Cavanill. Ic. t. 241. —♃— *Habitat in Mexico.*

Tribus III. Asparageae.

1160. **Dianella** Lam.

1063. **Dianella revoluta** R. Brown Prodr. VII. 280. Lindley in Bot. Reg. t. 1120. Schultes f. Syst. VII. 352. —♃— *Habitat in Nova Hollandia orientali et tropica.*

1164. **Asparagus** Linn. Spargel.

*** Inermes.**

1064. **Asparagus officinalis** Linn. Spec. 448. Flor. dan. t. 805. Schkuhr t. 96. Hayne Officin. Gew. VIII. t. 29. Schultes f. Syst. VII. 317. —♃—

Habitat in arenosis maritimis et in insulis fluviorum majorum Europae totius, Tauriae et Sibiriae.

β. *Maritimus* Smith Engl. Flor. II. 153.

Officin. Radix, Baccae et Semen Asparagi.

1065. **Asparagus scaber** Brignoli Plant. Forojul. 22. Schultes f. Syst. VII. 318. *Asparagus amarus* DC. Catalog. Hort. monsp. 1812. p. 81. Redouté Liliac. t. 446. — ♃ — *Habitat in arenosis littorum adriaticorum et Galliae mediterraneae.*

1066. **Asparagus maritimus** Pallas Iter II. 329. Link Enum. I. 340. Schultes f. Syst. VII. 319. — ♃ — *Habitat in campis salsuginosis maris Caspici.*

1067. **Asparagus tenuifolius** Lam. Dict. 1. 294. Redouté Liliac. t. 434. Schultes f. Syst. VII. 320. *Asparagus sylvaticus* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 201. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Europae australis.*

1068. **Asparagus dauricus** Fischer ex Link Enum. I. 340. Schultes f. Syst. VII. 321. — ♃ — *Habitat in Dauria.*

1069. **Asparagus caspius** Hort. Vind Schultes f. Syst. VII. 322. — ♃ — *Habitat ad mare Caspium.*

1070. **Asparagus verticillatus** Linn. Spec. 450. Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 281. Schultes f. Syst. VII. 323. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

1071. **Asparagus decumbens** Jacq. Hort. Schönbr. I. 71. t. 97. Schultes f. Syst. VII. 326. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1072. **Asparagus subulatus** Thunb. Prodr. 63. Schultes f. Syst. VII. 326. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1073. **Asparagus acutifolius** Linn. Spec. 449. Duham. Arbr. t. 31. Sibthorp Flor. graec. t. 337. Schultes f. Syst. VII. 326. *Asparagus Corruda* Scopoli Carn. 1. 248. — 5 — *Habitat in sterilibus saxosis regionis mediterraneae.*

Officin. exolet. Radix et Semen Corrudae.

** **Armati.**

1074. **Asparagus horridus** Linn. Suppl. 203. Redouté Liliac. t. 288. Cavanill. Ic. t. 136. Sibthorp Flor. graec. t. 239. Schultes f. Syst. VII. 328. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea occidentali.*

1075. **Asparagus Broussonetii** Spreng. Cat. Hort. Hall. 1804. Link Enum. 1. 341. Jacq. f. Eclog. t. 40. Schultes f. Syst. VII. 329. — ♄ — *Habitat in Africa boreali occidentali.*

1076. **Asparagus retrofractus** Linn. Spec. 449. Schultes f. Syst. VII. 331. — ♄ — *Habitat in Africa boreali.*

1077. **Asparagus aethiopicus** Linn. Mant. 63. Link Enum. I. 341. Schultes f. Syst. VII. 335. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1165. **Myrsiphyllum** Willd.

1078. **Myrsiphyllum asparagoides** Willdenow in Berl. Magaz. II. 25. Schultes f. Syst. VII. 1494. *Medeola asparagoides* Linn. Spec. 484. Redouté Liliac. t. 442. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1166. **Cordyline** Commers.

1079. **Cordyline australis** Endl. Flor. norf. 29. A. Cunningh. in Bot. Mag. Comp. II. 375. *Dracaena australis* Forst. Prodr. n. 151. Schultes f. Syst. VII. 539. Bot. Mag. t. 2835. *Dracaena obtecta* Graham in Edinb. philos. Journ. 1827. p. 175. — ♄ — *Habitat in insula Norfolk et in Nova Zeelandia, ubi indigenis » Ti « dicitur.*

1080. **Cordyline marginata** Endl. *Dracaena marginata* Lam. Dict. II. 325. Schultes f. Syst. VII. 340. *Dracaena angustifolia* Hort. Paris. *Dracaena tessellata* Willd. Enum. 374. — ♄ — *Habitat in insula Mauritii.*

1081. **Cordyline reflexa** Endl. *Dracaena reflexa* Lam. Dict. II. 324. Redouté Liliac. t. 92. Schul-

tes f. Syst. VII. 340. — 5 — *Habitat in insula Mauritii, St. Helenae et in Madagascar.*

1082. **Cordyline cernua** Endl. *Dracaena cernua* Jacq Hort. Schönbr. I. 59. t. 96. Schultes f. Syst. VII. 341. *Dracaena candelaria* Hort. — 5 — *Habitat in insula Mauritii.*

1083. **Cordyline ferrea** Endl. *Dracaena ferrea* Willd. Spec. II. 157. Schultes f. Syst. VII. 344. *Dracaena terminalis* Jacq. Collect. II. 354. Ic. rar. II. t. 448. Redouté Liliac. t. 90. — 5 — *Habitat in China et India orientali.*

β. *Rosea.*

1167. Dracaena Vandell. Drachenbaum.

1084. **Dracaena Draco** Linn. Syst. 275. Berthelot in N. A. N. C. XV. 773. t. 35—39. Schultes f. Syst. VII. 337. *Störkia Draco* Crantz Diss. 25. f. 12. — 5 — *Habitat in insulis Canariis et in India orientali.*

* Aphyllantheae.

1171. Aphyllanthes Tournef.

1085. **Aphyllanthes monspeliensis** Linn. Spec. 422. DC. Fl. fr. III. 170. Bot. Mag. t. 1132. Redouté Liliac. t. 483. Schultes f. Syst. VII. 430. — ♃ — *Habitat in siccis lapidosis Galliae mediterraneae, Pedemontii, Hispaniae, Lusitaniae et Barbariae.*

*

1173. Xanthorrhoea Smith.

1086. **Xanthorrhoea Hastile** Smith in Linn. Transact. IV. 219. R. Brown Prodr. 288. Schultes f. Syst. VII. 427. *Xanthorrhoea resinosa* Persoon Encheir. I. 370. — 5 — *Habitat in Nova Hollandia orientali extratropica.*

Ex hujus et affinium specierum trunco efluit Resina lutea Novi Belgii s. Resina acaroides, vulgo Botanybay Gummi.

Ordo XIX. Smilaceae.

1176. **Paris** Linn. Einbeer.

1087. **Paris quadrifolia** Linn. Spec. 527. — ♃ — *Habitat in umbrosis nemorosis Europae totius.*

Offic. exolet. Radix herba et baccae Paridis v. Solani quadrifolii s. Uvae versae.

1177. **Trillium** Linn.

1088. **Trillium erectum** Linn. Spec. 484. Bot. Mag. t. 470. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

Radix emetica.

1180. **Streptopus** Linn.

1089. **Streptopus amplexifolius** DC. Fl. fr. III. 174. Redouté Liliac. t. 259. *Streptopus amplexicaulis* Poiret Suppl. VII. 467. *Streptopus distortus* Besser Galic. n. 399. *Uvularia amplexifolia* Linn. Spec. 436. Waldst. et Kit. Plant. rar. Hung. t. 167. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae australioris.*

Herba refrigerans, leniter adstringens. Usus in gargarismis exoletus.

1181. **Polygonatum** Tournef. Weifswurz.

1090. **Polygonatum verticillatum** Allioni Flor. pedemont. 131. Redouté Liliac. t. 244. *Convallaria verticillata* Linn. Spec. 451. E. B. t. 128. Schultes f. Syst. VII. 296. — ♃ — *Habitat in saltibus Europae et Tauriae.*

1091. **Polygonatum vulgare** Desfont. in Annal. Mus. IX. 49. Redouté Liliac. t. 258. *Convallaria Polygonatum* Linn. Spec. 451. E. B. t. 280. Hooker Flor. Lond. t. 38. Hayne Arzneigew. III. t. 19. Schultes f. Syst. VII. 298. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae totius, Tauriae et Sibiriae.*

Offic. exolet. Radix Sigilli Salomonis.

1092. **Polygonatum multiflorum** Allioni Flor. Pedemont. I. 131. Redouté Liliac. t. 229. *Convallaria multiflora* Linn. Spec. 452. E. B. t. 279. Hook.

Flor. Lond. t. 37. Hayne Arzneigew. III. t. 20. Schultes f. Syst. VII. 301. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae totius, Sibiriae et Americae borealis.*

β. *Bracteatum. Convallaria bracteata* Thomas sicc. Schütz Diss. praes. Schübler 14. Schultes f. Syst. VII. 302. Gaudin Flor. Helv. II. 531.

Offic. exolet. Radix Sigilli Salomonis.

1093. **Polygonatum latifolium** Desfont. Annal. Mus. IX. 50. Redouté Liliac. t. 243. *Convallaria latifolia* Jacquin Flor. austr. III. t. 232. Schultes f. Syst. VII. 302. — ♃ — *Habitat in sylvis Europae mediae, Tauriae et Americae borealis.*

β. *Tauricum.*

1182. Convallaria Desf. Maiblume.

1094. **Convallaria majalis** Linn. Spec. 451. E. B. t. 1035. Flor. dan. t. 854. Hayne Arzneigew. III. t. 18. Schultes f. Syst. VII. 295. — ♃ — *Habitat in nemoribus Europae totius, Tauriae, Sibiriae et Americae borealis.*

β. *Flore pleno.* γ *Foliis variegatis.*

Offic. exolet. Radix, *Flores* et *baccae* Liliorum convallium s. Convallariae.

1183. Smilacina Desf.

α. Maianthemum Mönch.

1095. **Smilacina bifolia** Desf. Annal. Mus. IX. 50. Schultes f. Syst. VII. 307. *Maianthemum bifolium* Lam. et DC. Fl. fr. III. 277. Redouté Liliac. t. 216. *Convallaria bifolia* Linn. Spec. 452. — ♃ — *Habitat in sylvaticis et nemorosis Europae totius, praeter Britanniam, Sibiriae et Americae arcticae.*

Offic. exolet. Herba Unifolii.

* Smilacina Desf.

1096. **Smilacina racemosa** Desfont. Annal. Mus. IX. 51. Redouté Liliac. t. 230. Schultes f. Syst. VII. 303. *Convallaria racemosa* Linn. Spec. 452. Ker

Bot. Mag. t. 899. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Americae borealis, a Canada ad Carolinam.*

Baccae nervino tonicae.

1097. **Smilacina stellata** Desfont. Annal. Mus. IX. 52. Redouté Liliac. t. 185. Schultes f. Syst. VII. 304. *Convallaria stellata* Linn. Spec. 452. *Maianthemum stellatum* Link Enum. 1. 343. — ♃ — *Habitat juxta rivulos montanos Americae borealis.*

1184. Smilax Tournef.

1098. **Smilax mauritanica** Poiret Voyag. II. 263. Desfont. Flor. atlant. II. 367. Willd. Spec. IV. 774. — ♄ — *Habitat in Barbaria.*

1099. **Smilax Pseudosarsa** Visiani Index Sem. Hort. Patav. 1839. — ♄ — *Patria ignota.*

Caulis angulatus, aculeis validis, rectis. Folia cordata, aucta, subquinquenervia, coriacea, margine spinosa, suprema inermia. Flores umbellati. Baccae nigro-rubentes,

1188. Ruscus Linn. Korallenblatt.

a. Ruscus Link.

1100. **Ruscus aculeatus** Linn. Spec. 1474. E. B t. 560. Willd. Spec. IV. 874. — ♄ — *Habitat in nemorosis Europae australis et Angliae.*

Offic. exolet. Radix Rusci s. Brusci.

1101. **Ruscus Hypoglossum** Linn. Spec. 1474. Schkuhr t. 340. Willd. Spec. IV. 875. Endlicher Flor. Poson. t. 1. — ♄ — *Habitat in sylvis umbrosis Hungariae, Carinthiae, Italiae.*

Offic. exolet. Herba Uvulariae v. Bislinguae s. Bonifacii v. Lauri Alexandrinae,

1102. **Ruscus Hypophyllum** Linn. Spec. 1474. Willd. Spec. IV. 875. Sims Bot. Mag. t. 2049. — ♄ — *Habitat in Italia, Graecia* (ubi vulgo Κωραλλοβοτανου) *et Barbaria.*

Offic. exolet. Laurus alexandrina.

b. Danaida Link.

1103. **Ruscus racemosus** Linn. Spec. 1474. Willd. Spec. IV. 876. Watson Dendrolog. brit. t. 145.

Danaidia racemosa Link Handb. II. 274. — 5 — *Habitat in archipelagi Graeci insulis.*

*Aspidistreae.

1189. **Rohdea** Roth.

1104. **Rohdea japonica** Roth Nov. Spec. 197. Schultes f. Syst. VII. 172. *Orontium japonicum* Thunberg Flor. japon. 144. Ker in Bot. Mag. t. 898. *Kiro* et *Rirjo*, vulgo *Omotto* Kaempfer Amoen. exot. 785. Banks Ic. Kaempf. t. 12. — ♃ — *Habitat in Japonia, locis siccis prope Nangasaki.*

1190. **Tupistra** Ker.

1105. **Tupistra squallida** Ker in Bot. Mag. t. 1665. Bot. Reg. t. 704. Blume in Hoeven et Frise Tijdschrift 1834. I. 82. *Rohdea Tupistra* Schultes f. Syst VII. 173. — ♃ — *Habitat in Amboina.*

1191. **Aspidistra** Ker.

1106. **Aspidistra elatior** Blume in Hoeven et Vriese Tijdschrift 1834. I. 84. t. 3 4. — ♃ — *Habitat in Japonia, a Sieboldio in hortos introducta.*

*Ophiopogoneae.

1192. **Ophiopogon** Ait. Schlangenbart.

1107. **Ophiopogon japonicus** Aiton Hort. Kew. edit. 2. II. 281. Sims Bot. Mag. t. 1063. *Flüggea japonica* Richard in Schrader n. Journ. II. 1. p. 1—9. Schultes f. Syst. VII. 308. *Convallaria japonica* Linn. Suppl. 204. Redouté Liliac. t. 80. *Slateria japonica* Desvaux Journ. Bot. I. 244. *Mondo* vulgo Rjuno Fige i. e. barba serpentina. Kaempf. Amoen. exot. 823. c. ic. — ♃ — *Habitat in Japonia.*

Tubera radicalia saccharo condita a medicis japonicis administrantur.

1108 **Ophiopogon spicatus** Ker in Bot. Reg. n. 593. *Flüggea spicata* Schultes f. Syst. VII. 309. *Liriope spicata* Loureiro Flor. cochinch. 248. *Convallaria spicata* Thunberg Flor. Japon. 141. — ♃ — *Habitat in Japonia, China, Cochinchina et Nepalia.*

Foliorum decocto capillos firmari Sinae adfirmant.

*Eriospermeae.

1196. Eriospermum Jacq.

1109. **Eriospermum lanceaefolium** Jacq. Collect. Suppl. 72. Ic. rar. II. t. 421. Redouté Liliac. t. 394. Schultes f. Syst. VII. 503. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Ordo XX. Dioscoreae.

1201. Dioscorea Plum. Yams.

1110. **Dioscorea triphylla** Linn. Spec. 1462. Jacq. Collect. II. 365. Jacq. Ic. rar. t. 627. Willdenow Spec. IV. 790. — ♃ — ○ — *Habitat in India orientali.*

1111. **Dioscorea bulbifera** Linn. Spec. 1463. Willdenow Spec. IV. 793. — ♃ ○ — *Habitat in India orientali.*

Species inter tropicos totius orbis frequentissime culta.

1112. **Dioscorea sativa** Linn. Spec. 1463. Willdenow Spec. IV. 795. — ♃ ○ — *Habitat in India orientali.*

Species inter cultas rarior.

1113. **Dioscorea villosa** Linn. Spec. 1463. Jacq. Collect. II. 363. Ic. rar. t. 626. Willdenow Spec. IV. 796. — ♃ — *Habitat in Virginia, Florida et Canada.*

1114. **Dioscorea bonariensis** Tenore Catalog. Sem. Hort. Neap. 1838. p. 3. 1839. p. 11. — ♃ — *Habitat in Bonaria, unde semina ann. 1832. a Bonplandio Neapolim missa.*

»Radix tuberosa. Caulis teres, volubilis. Folia alterna, cordato-oblonga, acuminata, basi quadrilobata, lobis rotundatis. Flores monoici. Racemi oppositifolii, foliis breviores. Capsulae ovales.«

1115. **Dioscorea Elephantopus** Spreng. Cur. post. 143. *Testudinaria Elephantipes* Burchell Trav. in Africa II. 147. Lindley in Bot. Reg. t. 921. *Tamus Elephantipes* Heritier Sert. 29. Bot. Mag. t. 1347. — ♄ — ○ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1202. **Tamus** Linn.

1116. **Tamus communis** Linn. Spec. 1458. Giesecke Ic. fasc. 1. t. 22. Willdenow Spec. IV. 772. Nees jun. Gen. II. t. 20. — ♃ — *Habitat in Europa australi et Oriente.*

Offic. exolet. Radix Tami v. Bryoniae nigrae.

Ordo XXI. Hydrocharideae.

1209. **Vallisneria** Michel.

1117. **Vallisneria spiralis** Linn. Spec. 1441. Jacq. f. Eclog. t. 1. — ♃ ∆ — ♂ et ♀ — *Habitat in fossis et aquis fluentibus Italiae superioris.*

1211. **Stratiotes** Linn.

1118. **Stratiotes aloides** Linn. Spec. 754. E. B. t. 374. Flor. dan. t. 337. Schkuhr t. 335. — ♃ ∆ — *Habitat in aquis stagnantibus purioribus Europae totius.*

Ordo XXII. Irideae.

1220. **Sisyrinchium** Linn.

1119. **Sisyrinchium Bermudiana** Linn. Spec. 1353. Cavanill. Diss. VI. 346. t. 192. Redouté Liliac. t. 149. — ♃ — *Habitat in Bermudis.*

1120. **Sisyrinchium anceps** Lam. Dict. I.

403. Cavanill. Diss. VI. 345. t. 190. f. 2. *Sisyrinchium gramineum* Her in Bot. Mag. t. 464. Redouté Liliac. t. 282. — ♃ — *Habitat in Canada et Virginia.*

1121. **Sisyrinchium chilense** Hooker in Bot. Mag. t. 2786. — ♃ — *Habitat in Chili.*

1122. **Sisyrinchium californicum** Dryand. Spreng. Syst. I. 166. *Marica californica* Ker in Bot. Mag. t. 983. — ♃ — *Habitat in California.*

1123. **Sisyrinchium convolutum** Nocca Plant. select. Hort. ticin. t. 1. Willdenow Hort. berolin. t. 91. Redouté Liliac. t. 47. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1124. **Sisyrinchium tenuifolium** Willdenow Hort. berolin. t. 92. Redouté Liliac. t. 275. Bot. Mag. t. 2117 et 2313. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1125. **Sisyrinchium iridifolium** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 324. *Sisyrinchium laxum* Link ex Bot. Mag. t. 2312. *Marica iridifolia* Ker in Bot. Reg. t. 646. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1126. **Sisyrinchium striatum** Smith Ic. pict. I. t. 9. *Sisyrinchium spicatum* Cavanill. Ic. II. 2. t. 104. *Marica striata* Ker in Bot. Mag. t. 701. *Moraea sertata* Jacq. Hort. Schönbr. t. 11. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1221. **Libertia** Spreng.

1127. **Libertia paniculata** Sprengel Syst. 1. 168. *Renealmia paniculata* R. Brown Prodr. Add. p. 590. *Sisyrinchium paniculatum* R. Brown Prodr. 305. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

1128. **Libertia pulchella** Spreng. Syst. I. 169 *Renealmia pulchella* R. Brown Prodr. p. 590. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

1129. **Libertia formosa** Graham in Bot. Mag. t. 3294. — ♃ — *Habitat in Chili.*

1222. **Cipura** Aubl.

1130. **Cipura Northiana** Endl. *Marica Northiana* Schneevogt. Ic. t. 41. 42. Vahl Enum. II. 154.

Andrews Bot. Reposit. t. 255. *Moraea vaginata* DC. in Redouté Liliac. t. 56. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1131. **Cipura caerulea** Endl. *Marica caerulea* Ker in Bot. Reg. t. 713. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1224. Moraea Linn.

1132. **Moraea Sisyrinchium** Ker in Annal. of Bot. I. 241. Bot. Mag. t. 1407. *Iris Sisyrinchium* Linn Spec. 59. Sibthorp Flor. graec. t. 42. Redouté Liliac. t. 29. et 458. *Iris fugax* Tenore Flor. neap. t. 4. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

1133. **Moraea edulis** Ker in Bot. Mag. t. 613. *Moraea vegeta* Jacq. Ic. rar. t. 224. *Iris edulis* Thunberg Diss. n. 38. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1134. **Moraea fugax** Jacq. Hort. Vindob. I. 14. t. 20. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1135. **Moraea spathacea** Ker Irid. 39. *Iris spathacea* Thunberg Diss. n. 28. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei,*

1136. **Moraea aurantiaca** Dietrich Spec. II. 485. *Sisyrinchium aurantiacum* Zuccagni Obs. bot. 1. — ♃ — *Patria ignota.*

1226. Iris Linn. Schwertl.

I. Imberbes.

§. 1. Radice bulbosa.

1137. **Iris Xiphium** Linn. Hort. Upsal. 17. Ker in Bot. Mag. t. 686. Redouté Liliac. t. 337. *Iris variabilis* Jacq. Collect. II. 321. — ♃ — *Habitat in Lusitania et Hispania.*

§. 2. Radice tuberosa.

§§. 1. Foliis angulatis.

1138. **Iris tuberosa** Linn. Syst. 93. Ker in

Bot. Mag. t. 531. Redouté Liliac. t. 48. Sibthorp Flor. graec. t. 41. — ♃ — *Habitat in Europa australi et Oriente.*

Ex hac specie Hermodactylos colligi nonnulli perhibent.

1139. **Iris tenuifolia** Pallas It. III. 714. App. 66. t. C. f. 2. Ledebour Flor. alt. I. 55. — ♃ — *Habitat in arenosis Dauriae, et in desertis subsalsis Songariae orientalis.*

1140. **Iris graminea** Linn. Spec. 58. Jacq. Flor. austr. t. 2. Redouté Liliac. t. 299. Ker in Bot. Mag. t. 681. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

1141. **Iris ruthenica** Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 117. Bot. Mag. t. 1393. *Iris caespitosa* Pallas ex Link Jahrb. I. 3. p. 71. — ♃ — *Habitat in Sibiria et Dauria.*

1142. **Iris haematophylla** Fischer ex Link Enum. I. 60. Ledebour Flor. alt. I. 58. *Iris biglumis* Willdenow Suppl. 4. non Vahl. — ♃ — *Habitat in Sibiria et Altai.*

1143. **Iris sibirica** Linn. Spec. 57. Jacq. Flor. austr. t. 3. Redouté Liliac. t. 438. — ♃ — *Habitat in pratis Europae et Sibiriae.*

Var. β. *Albiflora.*

1144. **Iris laevigata** Fischer Index v. Sem. Hort. Petrop. 1838 p. 36. — ♃ — *Habitat in paludibus prope Irkutzk et in Dauria.*

1145. **Iris acuta** Willdenow Enum. Suppl. 4. Römer et Schultes Syst. 1. 481. Mant. I. 317. — ♃ — *Patria ignota.*

1146. **Iris moraeoides** Ker Irid. 64. *Iris compressa* Thunberg Dissert. n. 12. Willdenow Spec. I. 230. *Moraea iridioides* Linn. Mant. 28. Jacq. Hort. Schönbr. t. 196. Redouté Liliac. t. 45. *Vieusseuxia iridioides* Link Enum. I. 56. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

§§. 2. Foliis ensiformibus.

1147. **Iris Pseudoacorus** Linn. Spec. 56. E. B. t. 578. — ♃ — *Habitat in paludibus et fossis Europae totius et Sibiriae.*

Var. β *Minor.*

Offic. exolet. Radix Acori vulgaris v. palustris s. Pseudacori.

1148. **Iris setosa** Pallas ex Link Jahrb. I. 3. p. 71. Fischer Index v. Sem. Hort. Petropolit. 1838. p. 37. *Iris brachycuspis* Fischer msc. *Iris brevicuspis* Schultes Mant. I. 306. — ♃ — *Habitat in Sibiria ad fluvium Lena, in Kamtschatka, Unalaschka, in sinu Eschscholzii et in insula Chamissonis.*

1149. **Iris Monnierii** DC. in Redouté Liliac. t. 236. — ♃ — *Habitat in Creta.*

1150. **Iris foetidissima** Linn. Spec. 57. E. B. t. 596. Redouté Liliac. t. 351. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

Offic. exolet. Radix Spathulae foetidae v. Xyridis.

1151. **Iris virginica** Gronov. Virgin. 7. Jacq. Collect. II. 322. Ic. rar. t. 223. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1152. **Iris versicolor** Linn. Spec. 57. Redouté Liliac. t. 339. Bigelow Med. Bot. t. 16. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

Var. β. *Saturata.*

Radicem egregie hydragogam medici transatlantici perhibent.

1153. **Iris spuria** Linn. Spec. 58. Jacq. Flor. austr. t. 4. Redouté Liliac. t. 349. *Iris spathulata* Lam. Dict. III. 300. *Iris maritima* Lam. Flor. fr. III. 497. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

1154. **Iris Güldenstaedtiana** Bieberst. Flor. taur. cauc. Suppl. 42. — ♃ — *Habitat in Tauria, Sibiria et Caucaso.*

Var. α. *Livescens* Bieberst. l. c. *Iris spuria* Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 32. — β. *Ochroleuca* Bieberst. l. c. *Iris desertorum* Güldenst. It. I. 80. et 107. — γ. *Diluta* Bieberst. l. c. *Iris diluta* Bieberst. Plant. ross. II. t. 81. — δ. *Stenogyna. Iris stenogyna* DC. in Redouté Liliac. t. 310. *Iris ochroleuca* Linn. Mant. 175.

1155. **Iris notha** Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 45. Plant. ross. II. t. 77. — ♃ — *Habitat in collibus herbidis Caucasi.*

Var. β. *Pallida.*

1156. **Iris biglumis** Vahl Enum. II. 149. *Iris*

spuria Pallas It. App. 26. t. C. f. 1. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1157. **Iris fragrans** Lindley in Bot. Reg. 1840. t. 1. — ♃ — *Habitat in India boreali.*

II. Barbatae.

1158. **Iris germanica** Linn. Spec. 55. Redouté Liliac. t. 309. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

Var. β. *Flavescens. Iris flavescens* Redouté Liliac. VII. 875. — γ. *Alba.* — δ. *Diluta.* — ε. *Saturata.*

Offic. exolet. Radix Iridis nostratis.

1159. **Iris florentina** Linn. Spec. 55. Redouté Liliac. t. 23. Sibthorp Flor. graec. t. 39. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

Offic. Radix Ireos florentinae.

1160. **Iris pallida** Lam. Dict. III. 294. Redouté Liliac. t. 366. Bot. Mag. t. 685. *Iris odoratissima* Jacq. Hort. Schönbr. t. 9. — ♃ — *Patria ignota.*

Radix Ireos florentinae officinarum frequentissime ex hac specie colligi solet.

1161. **Iris neglecta** Hornemann Catalog. Hort. Hafn. I. 55. Bot. Mag t. 2435. — ♃ — *Patria ignota.*

1162. **Iris squalens** Linn. Spec. 56. Redouté Liliac. t. 365. Bot. Mag. t. 787. — ♃ — *Habitat in Europa australi et Bohemia.*

β. *Saturata.*

1163. **Iris sambucina** Linn. Spec. 55. Jacq. Hort. Vindob. I. 1. t. 2. Redouté Liliac. t. 338. — ♃ — *Habitat in Europa australiore.*

1164. **Iris lurida** Aiton Hort. kew. ed. I. 1. 68. Redouté Liliac. t. 318. — ♃ — *Habitat in Europa australiore.*

1165 **Iris sordida** Willdenow Enum. Suppl. 4. Römer et Schultes Syst. I. 481. Mant. I. 317. — ♃ — *Patria ignota.*

1166. **Iris dichotoma** Pallas It. 3. App. n. 61. t. A. f. 2. Ker in Bot. Reg. t. 246. — ♃ — *Habitat in rupestribus apricis Davuriae.*

1167. **Iris flavissima** Pallas It. 3. App. n. 67. Jacq. Collect. IV. 98. Ic. rar. t. 200. — ♃ — *Habitat in Sibiria et Altai.*

1168. **Iris chinensis** Curtis Bot. Mag. t. 373. Vahl Enum. II. 133. *Iris fimbriata* Venten. Cels. t. 9. Redouté Liliac. t. 152. — ♃ — *Habitat in China et India orientali.*

1169. **Iris nudicaulis** Lam. Dict. III. 296. *Iris bohemica* Schmidt Flor. Boh. IV. n. 303. — ♃ — *Habitat in Bohemia, Silesia et Caucaso.*

1170. **Iris biflora** Linn. Spec. 54. Vahl Enum. II. 32. *Iris furcata* Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 42. Plant. ross. II. t. 51. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Sibiria.*

1171. **Iris Swertii** Lam. Dict. III. 296. Redouté Liliac. t. 360. — ♃ — *Patria ignota.*

1172. **Iris plicata** Lam. Dict. I. 121. Redouté Liliac. t. 356. β *Amoena. Iris amoena* Redouté Liliac. t. 336. — ♃ — *Patria ignota.*

1173. **Iris variegata** Linn. Spec. 55. Jacq. Flor. austr. t. 5. Redouté Liliac. t. 292. — ♃ — *Habitat in Austria, Bohemia et Hungaria.*

1174. **Iris hungarica** Waldstein et Kitaibel Plant. Hung. rar. III. 251. t. 226. — ♃ — *Habitat in Hungaria.*

1175. **Iris nepalensis** Wallich in Bot. Reg. t. 818. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

1176. **Iris pumila** Linn. Spec. 56. Jacq. Flor. austr. t. 1. Bot. Mag. t. 9. et 1209. Redouté Liliac. t. 262. — ♃ — *Habitat in collibus Europae mediae, Tauriae et Caucasi.*

1177. **Iris lutescens** Lam. Dict. III. 297. Redouté Liliac. t. 263. — ♃ — *Habitat in Europa media.*

1178. **Iris aequiloba** Ledebour Index Sem. Hort. Dorpat. 1823. p. 4. Römer et Schultes Syst. Mant. III. Add. II. 397. — ♃ — *Habitat in deserto Tauriae ad lacum salsum Staroje Osero.*

1179. **Iris arenaria** Waldst. et Kitaibel Plant.

Hung. rar. I. 57. t. 57. Redouté Liliac. t. 296. Ker in Bot. Reg. t. 549. — ♃ — *Habitat in Hungaria.*

1228. **Cypella** Herb.

1180. **Cypella Herberti** Lindley in Bot. Reg. t. 949. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1181. **Cypella plumbea** Lindley in Bot. Reg. 1838. App. n. 130. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1229. **Tigridia** Juss.

1182. **Tigridia Pavonia** Juss. Redouté Liliac. t. 6. *Ferraria Pavonia* Linn. Suppl. 407. *Ferraria Tigridia* Sims Bot. Mag. t. 532. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1230. **Ferraria** Linn.

1183. **Ferraria undulata** Linn. Spec. 1353. Cavanill. Dissert. VI. 343. t. 190. Jacq. Hort. Vindob. t. 63. Redouté Liliac. t. 28. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1231. **Pardanthus** Ker. Pardelblume.

1184. **Pardanthus chinensis** Ker in Annal. of Bot. I. 247. *Ixia chinensis* Linn. Spec. 52 *Moraea chinensis* Thunberg Flor. japon. 34. *Belemcanda chinensis* DC. in Redouté Liliac. t. 121. — ♃ — *Habitat in arenosis Indiae, Chinae et Japoniae.*

1232. **Aristea** Soland.

1185. **Aristea cyanea** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 67. Redouté Liliac. t. 462. *Ixia africana* Linn. Spec. 51. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1186. **Aristea capitata** Ker in Bot. Mag. t. 605. *Aristea caerulea* Vahl Enum. II. 124. *Gladiolus capitatus* Linn. Spec. 53. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1187. **Aristea pusilla** Ker in Bot. Mag. t.

1231. *Moraea pusilla* Thunb. Dissert. n. 4. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1233. **Witsenia** Thunb.

1188. **Witsenia corymbosa** Smith Exot. Bot. I. t. 68 Bot. Mag. t. 895. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1234. **Patersonia** R. Br.

1189. **Patersonia glabrata** R. Brown Prodr. I. 304. Ker in Bot. Reg. t. 51. —♃— *Habitat in Nova Hollandia.*

1190. **Patersonia longifolia** R. Brown Prodr. I 303. —♃— *Habitat in Nova Hollandia.*

1237. **Anomatheca** Ker.

1191. **Anomatheca juncea** Ker in Annal. of Bot. I. 227. *Gladiolus junceus* Thunberg Diss. n. 18. Redouté Liliac. t. 41. *Lapeyrousia juncea* Pourret in Act. Toulon. III. 15. Ker in Bot. Reg. t. 606. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1192. **Anomatheca cruenta** Lindley in Bot. Reg. t. 1369. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1238. **Babiana** Ker.

1193. **Babiana tubiflora** Ker in Annal. of Bot. I. 233. *Gladiolus tubiflorus* Thunberg Dissert. n. 23. t. 2. f. 2. Redouté Liliac. t. 361. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1194. **Babiana disticha** Ker in Annal. of Bot. I. 233. Bot. Mag. t. 626 *Gladiolus plicatus* Jacq. Ic. rar. t. 237. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1195. **Babiana plicata** Ker in Annal. of Bot. I. 233. Bot. Mag. t. 576. *Gladiolus plicatus* Thunb. Diss. n. 24. non Jacq. *Gladiolus fragrans* Jacq. Hort. Schönbr. I 7. t. 14. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

1196. **Babiana villosa** Ker in Bot. Mag. n. 583. *Ixia villosa* Aiton in Hort. kew. ed. 2. I. 58. non

Jacq. *Ixia punicea* Jacq. Ic. rar. t. 287. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1239. **Gladiolus** Linn. Siegwurz.

a. **Angustifolii.**

1197. **Gladiolus tristis** Linn. Spec. 53. Redouté Liliac. t. 35. Bot. Mag. t. 1098. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1198. **Gladiolus angustus** Linn. Spec. 53. Jacq. Collect. IV. 154. Ic. rar. t. 252. Redouté Liliac. t. 344. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Latifolii.**

1199. **Gladiolus Cunonia** Gärtner Carp. I. 31. t. 11. f. 4. *Antholyza Cunonia* Linn. Spec. 54. Redouté Liliac. t. 12. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1200. **Gladiolus viperatus** Ker in Bot. Mag. t. 688. *Gladiolus alatus* Jacq. Ic. rar. t. 259. non Linn. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1201. **Gladiolus cuspidatus** Jacq. Collect. Suppl. 17. Ic. rar. t. 257. Ker in Bot. Mag. t. 582. Redouté Liliac. t. 136. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1202. **Gladiolus floribundus** Jacq. Collect. IV. 162. Ic. rar. t. 254. Ker in Bot. Mag. t. 610. *Gladiolus grandiflorus* Andrews Bot. Reposit. t. 118. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1203. **Gladiolus byzantinus** Miller Dict. n. 2. Ker in Bot. Mag. t. 874. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1204. **Gladiolus segetum** Ker in Bot. Mag. t. 719. *Gladiolus communis* Lam. Ill. t. 32. Sibthorp Flor. graec. t. 37. *Gladiolus Ludovicae* Jan Elench. 1. *Gladiolus italicus* Gaudin Helv. I. 96. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

1205. **Gladiolus communis** Linn. Spec. 52.

Redouté Liliac. t. 267. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

Offic. exolet. Radix Victorialis rotundae.

1206. **Gladiolus imbricatus** Linn. Spec. 52. *Gladiolus tenuis* Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 29. *Gladiolus rossicus* Persoon Encheir. I. 46. *Gladiolus neglectus* Schultes Observ. 14. *Gladiolus galiciensis* Besser Galic. n. 50. Reichenb. Iconogr. f. 818. — ♃ — *Habitat in pratis Europae orientalis et Asiae finitimae.*

1207. **Gladiolus illyricus** Koch Synops. 699. — ♃ — *Habitat in pratis Illyrici.*

1240. Watsonia Mill.

1208. **Watsonia iridifolia** Ker in Bot. Mag. t. 600. *Gladiolus iridifolius* Jacq. Collect. IV. 151. Ic. rar. t. 234. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1209. **Watsonia Meriana** Miller Ic. t. 276. Ker Bot. Mag. t. 1194. *Antholyza Meriana* Linn. Spec. 54. *Gladiolus Merianus* Jacq. Collect. IV. 150. Ic. rar. t. 230. Redouté Liliac. t. 11. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1210. **Watsonia aletroides** Ker in Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 96. *Gladiolus aletroides* Vahl Enum. II. 96. *Gladiolus tubulosus* Jacq. Collect. IV. 15. Ic. rar. t. 229. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1241. Sparaxis Ker.

1211. **Sparaxis bulbifera** Ker in Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 86. *Ixia bulbifera* Linn. Spec. 51. Redouté Liliac. t. 128. *Moraea bulbifera* Jacq. Hort. Schönbr. t. 197. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1242. Montbretia DC.

1212. **Montbretia securigera** DC. in Redouté Liliac. t. 53. *Tritonia securigera* Ker in Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 91. *Gladiolus securiger* Solander in Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 65. Bot. Mag. t. 383.

Jacq. Fragm. t. 48. f. 2. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1213. **Montbretia refracta** Endl. *Tritonia refracta* Ker Irid. 119. *Gladiolus refractus* Jacq. Collect. Suppl. 26. Ic. rar. t. 241. Redouté Liliac. t. 419. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1214. **Montbretia lancea** Endl. *Tritonia squalida* Ker in Bot. Mag. t. 581. *Ixia squalida* Var. *a.* Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 61. *Ixia lancea* Thunberg Diss. n. 21. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1215. **Montbretia crocata** Endl. *Tritonia crocata* Ker in Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 93. *Ixia crocata* Linn. Spec. 52. Redouté Liliac. t. 335. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Var. *α. Alba.* — *β. Maculata.* — *γ. Pallida.* — *δ. Rosea.*

1216. **Montbretia fenestrata** Endl. *Tritonia fenestrata* Ker in Bot. Mag. t. 704. *Ixia fenestrata* Jacq. Collect. III. 270. Ic. rar. t. 289. *Ixia hyalina* Linn. Suppl. 91. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1217. **Montbretia deusta** Endl. *Tritonia deusta* Ker in Bot. Mag. t. 622. *Ixia deusta* Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 60. *Ixia miniata* Redouté Liliac. t. 39. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1243. **Ixia** Linn.

1218. **Ixia capillaris** Thunb. Diss. n. 12. t. 2. f. 2. Ker in Bot. Mag. t. 617. *Ixia lancea* Jacq. Ic. rar. t. 281. *Ixia rapunculoides* Redouté Liliac. t. 431. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1219. **Ixia flexuosa** Linn. Spec. 51. Ker in Bot. Mag. t. 624. *Ixia polystachya* Redouté Liliac. t. 126. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1220. **Ixia columnaris** Salisbury Prodr. 36. Andrews Bot. Reposit. t. 203. 211. 213. 250. *Ixia monadelpha* De la Roche Descript. 22. Ker in Bot. Mag. t. 607. *Galaxia ixiaeflora* DC. in Redouté Liliac. t. 41. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1244. Diascia DC.

1221. **Diascia graminifolia** DC. in Redouté Liliac. t. 163. *Gladiolus gramineus* Linn. f. Suppl. 95. Jacq. Collect. II. 303. Ic. rar. t. 236. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1222. **Diascia iridifolia** DC. in Redouté Liliac. t. 54. *Gladiolus gramineus* Andrews Bot. Reposit. t. 62. *Melaspherula* Ker in Bot. Mag. t. 615. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1247. Trichonema Ker.

1223. **Trichonema Bulbocodium** Ker in Annal. of Bot. I. 223. Nees jun. Gen. plant. V. t. 20. *Romulea Bulbocodium* Sebast. et Mauri Prodr. Flor. Rom. 17. *Ixia Bulbocodium* Linn. Syst. 76. Jacq. Collect. III. 265. Ic. rar. t. 271. Redouté Liliac. t. 88. f. 1. 2. — ♃ — *Habitat in graminosis Istriae, Dalmatiae et Italiae.*

1224. **Trichonema cruciatum** Ker in Bot. Mag. t. 575. *Ixia cruciata* Jacq. Collect. Suppl. 16. Ic. rar. t. 290. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1225. **Trichonema speciosum** Ker in Annal. of Bot. t. 223. Bot. Mag. t. 1476. *Ixia Bulbocodium* var. *speciosa* Andrews Bot. Reposit. t. 170. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1248. Crocus Tournef. Saffran.

α. Autumnales.

1226. **Crocus sativus** Linn. Spec. 60. Redouté Liliac. t. 173. Hayne Arzneigew. VI. t. 25. — ♃ — *Crescit in Oriente spontaneus.*

Offic. Stigmata Croci.

1227. **Crocus Pallasii** Goldbach Croc. 13. Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 35. *Crocus autumnalis* Pallas ex Bieberst. Casp. 82. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Tauriae.*

1228. **Crocus speciosus** Bieberst. Casp. 129. Cent. II. t. 71. — ♃ — *Habitat in Tauria et Caucaso.*

1229. **Crocus odorus** Bivona Bernard. Stirp. rar. sic. 3. Goldbach Croc. 20. *Crocus longiflorus* Rafinesque Caratt. 84. t. 19. f. 2. *Crocus neapolitanus* Hoppe in Flora 1818. p. 588. — ♃ — *Habitat in Sicilia.*

1230. **Crocus Thomasii** Tenore Crochi 12. t. 4. — ♃ — *Habitat in nemoribus Calabriae ulterioris.*

b. Vernales.

§. 1. Caerulei v. caerulescentes.

1231. **Crocus vernus** Willdenow Spec. I. 195. E. B. t. 344. Redouté Liliac. t. 266. Hayne Arzneigew. VI. t. 26. *Crocus sativus β. vernus* Linn. Spec. 50. — ♃ — *Habitat in Europa media et austro-orientali.*

1232. **Crocus versicolor** Ker in Bot. Mag. 1110. Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 80. — ♃ — *Patria incerta.*

1233. **Crocus Imperati** Tenore Mem. di Crochi 10. t. 3. Lindley in Bot. Reg. t. 1993. — ♃ — *Habitat in montibus Calabriae, Lucaniae et in insula Caprearum.*

1234. **Crocus pusillus** Tenore Cat. Hort. Neap. 1813. p. 31. Mem. di Crochi 8. t. 2. Lindley in Bot. Reg. t. 1987. *Crocus minimus* Tenore Flora medica I. 24. *Crocus Tenorii* Gay in Ferrusac Bullet. sc. nat. Juli 1837. — ♃ — *Habitat in pratis sterilibus collium circa Neapolim.*

1235. **Crocus biflorus** Miller Dict. Andrews Bot. Reposit. t. 362. Ker in Bot. Mag. t. 845. Redouté Liliac. t. 294. — ♃ — *Habitat in sterilibus apricis Tauriae et Iberiae.*

1236. **Crocus variegatus** Hoppe et Hornsch. Reise 187. c. ic. — ♃ — *Habitat in littorali austriaco.*

§. 2. Flavi v. flavescentes.

1237. **Crocus susianus** Ker in Bot. Mag. t. 652. Redouté Liliac. t. 393. Hayne Arzneigew. VI. t. 28. — ♃ — *Habitat in Oriente.*

1238. **Crocus luteus** Lam. Ill. 443. Redouté Liliac. t. 196. Hayne Arzneigew. VI. t. 27. *Crocus maesiacus* Ker in Bot. Mag. t. 1111. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

Ordo XXIII. Haemodoraceae.

1250. Xiphidium Aubl.

1239. **Xiphidium albidum** Lam Illustr. n. 615. Poiret Suppl. X. 783. *Xiphidium album* Willdenow Spec. I. 248. *Xiphidium floribundum* var. *a.* Swartz Flor. Ind. occid. I. 80. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1251. Wachendorfia Linn.

1240. **Wachendorfia thyrsiflora** Linn. Spec. 59. Redouté Liliac. t. 93. Bot. Mag. t. 1060. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1257. Anigozanthes Labill.

1241. **Anigozanthes rufa** Labillard. Voy. I. 411. t. 22. Nov. Holl. II. 119. Redouté Liliac. n. 176. R. Brown Prodr. 301. Schultes f. Syst. VII. 283. *Schwägrichenia rufa* Sprengel Syst. II. 26. — ♃ — *Habitat in Novae Hollandiae ora australi.*

1242. **Anigozanthes flavida** Redouté Liliac. t. 176. Sims Bot. Mag. t. 1151. R. Brown Prodr. 283. Schultes f. Syst. VII. 283 *Schwägrichenia flavescens* Sprengel Syst. II. 26. — ♃ — *Habitat in Novae Hollandiae ora australi.*

1243. **Anigozanthes Manglesii** D. Don in Sweet Fl. Gard. N. S t. 265. Lindley in Bot. Reg. t. 2012. — ♃ — *Habitat in Novae Hollandiae austro-occidentalis Colonia Swan-River.*

*Vellozieae.

1261. **Barbacenia** Vandell.

1244. **Barbacenia purpurea** Hooker Bot. Mag. t. 2777. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

Ordo XXIV. Hypoxideae.

1263. **Curculigo** Gärtn.

1245. **Curculigo recurvata** Dryander in Aiton Hort. kew. ed. 2. II. 253. Roxburgh Bot. Reg. t. 770. Blume Enum. Plant. Jav. I. 16. Schultes f. Syst. VII. 757. — ♃ — *Habitat in Bengalia et Java.*

1264. **Hypoxis** Linn.

1246. **Hypoxis decumbens** Linn. Spec. 439. Schultes f. Syst. VII. 762. — ♃ — *Habitat in campis arenosis montium Jamaicae.*

1247. **Hypoxis gracilis** Lehmann Catalog. Sem. hort. Hamb. 1826. p. 17. Pugill. I. 22. Schultes f. Syst. VII. 764. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1248. **Hypoxis villosa** Linn. Suppl. 198. Jacq. Collect. Suppl. 51. Ic. rar. t. 370. Schultes f. Syst. VII. 765. *Fabricia villosa* Thunberg in Fabric. It. Norveg. 31. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Ordo XXV. Amaryllideae.

A. Amarylleae.

1265. **Galanthus** Linn. Schneeglöckchen.

1249. **Galanthus nivalis** Linn. Spec. 413. Jacq. Flor. austr. t. 313. Schultes f. Syst. VII. 781. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis et pomariis Europae mediae et australis.*

1250. **Galanthus plicatus** Bieberst. Suppl. 255. Ker Bot. Reg. t. 545. Bot. Mag. t. 2162. Schultes f. Syst. VII. 782. — ♃ — *Habitat in sylvis Caucasi et Tauriae.*

1266. Leucojum Linn.

1251. **Leucojum vernum** Linn. Spec. 414. Jacq. Flor. austr. t. 312. Schkuhr Handb. t. 89. Curtis Bot. Mag. t. 46. Schultes f Syst. VII. 782. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis Europae mediae et australis.*

Offic. exolet. Radix Leucoji bulbosi v. albi s. Narcisso-Leucoji.

1252. **Leucojum aestivum** Linn. Spec. 414. Jacq. Flor. austr. t. 203. E. B. t. 621. Flor. dan. t. 1265. Redouté Liliac. t. 135. Sims Bot. Mag. t. 1210. Schultes f. Syst. VII. 783. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis demissis Europae mediae et australis, nec non Tauriae.*

1270. Sternbergia Waldst. et Kit.

1253. **Sternbergia colchiciflora** Waldst. et Kitaib. Plant. rar. II. 172. t. 159. Schultes f. Syst. VII. 793. *Amaryllis colchiciflora* Ker Rev. Amaryll. 3. *Oporanthus colchiciflorus* Herbert App. 38. *Narcissus autumnalis minor* Clus. Hist. I. 164. c. ic. — ♃ — *Habitat in pratis montium calcareorum Hungariae, Aprutii et Tauriae.*

1254. **Sternbergia lutea** Schultes f. Syst. VII. 795. *Amaryllis lutea* Linn. Spec. 420. Curtis Bot. Mag. t. 290. Redouté Liliac. t. 148. *Oporanthus luteus* Herb. App. 38. — ♃ — *Habitat in Europa meridionali, Tauria et Asia minore.*

Offic. exolet. Radix Lilio-Narcissi.

1273. Amaryllis Linn.

a. **Zephyranthes** Herb.

1255. **Amaryllis chloroleuca** Ker Rev. Amaryll. 5. Schultes f. Syst. VII. 796. *Zephyranthes chlo-*

roleuca Herbert App. 36. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1256. **Amaryllis tubispatha** Heritier Sert. 9. Ker Rev. Amaryll. 6. Bot. Mag. t. 1586. Schultes f. Syst. VII. 798. *Zephyranthes tubispatha* Herbert App. 36. — ♃ — *Habitat in Bonaria.*

1257. **Amaryllis carnea** Schultes f. Syst. VII. 799. *Amaryllis rosea* Sprengel Cur. post. 133. *Zephyranthes rosea* Lindley in Bot. Reg. t. 821. Bot. Mag. t. 2537. — ♃ — *Habitat in Havanna.*

1258. **Amaryllis nivea** Schultes f. Syst. VII. 799. *Amaryllis candida* Lindley in Bot. Reg. t. 724. *Zephyranthes candida* Herbert in Bot. Mag. t. 2607. Loddig. Bot. Cab. t. 1419. — ♃ — *Habitat in Peruvia et Bonaria.*

1259. **Amaryllis verecunda** Schultes f. Syst. VII. 800. *Zephyranthes verecunda* Herbert in Bot. Mag. t. 2583. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1260. **Amaryllis Atamasco** Linn. Spec. 420. Schkuhr Handb. t. 90. Redouté Liliac. t. 31. Schultes f. Syst. VII. 800. *Zephyranthes Atamasco* Herbert Append. 36. — ♃ — *Habitat in Carolina et Virginia.*

1261. **Amaryllis pumila** Spin ex Spreng. N. E. I. 252. Schultes f. Syst. VII. 801. — ♃ — *Patria ignota.*

1262. **Amaryllis striatula** Schultes f. Syst. VII. 802. *Zephyranthes striata* Herbert in Bot. Mag. t. 2593. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

b. **Habranthus** Herb.

1263. **Amaryllis versicolor** Spreng. Cur. post. 133. Schultes f. Syst. VII. 807. *Habranthus versicolor* Herbert in Bot. Mag. t. 2485. — ♃ — *Habitat prope Maldonado Americae australis.*

c. **Sprekelia** Herb.

1264. **Amaryllis formosissima** Linn. Spec. 420. Curtis Bot. Mag. t. 47 et 1450. Redouté Liliac. t. 4. Schultes f. Syst. VII. 810. *Sprekelia Heisteri* Trew

Ehret. Fl. imag. t. 14. *Sprekelia formosissima* Herbert App. 35. — ♃ — *Habitat in America tropica et in insula St. Helenae, anno 1593 in Europam advecta.*

d. **Hippeastrum** Herb.

1265. **Amaryllis psittacina** Ker in Bot. Reg. t. 199. Bot. Cab. t. 1204. Schultes f. Syst. VII. 812. *Hippeastrum psittacinum* Herb. App. 31. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1266. **Amaryllis calyptrata** Ker in Bot. Reg. t. 164. Schultes f. Syst. VII. 812. *Hippeastrum calyptratum* Herb. App. 31. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1267. **Amaryllis rutila** Ker Rev. Amaryll. 16. Bot. Reg. t. 16. Schultes f. Syst. VII. 820. *Hippeastrum rutilum* Herbert App. 41. — ♃ — *Habitat in Brasilia circa St. Paulum.*

1268. **Amaryllis fulgida** Ker in Bot. Reg. t. 226. Schultes f. Syst. VII. 821. *Hippeastrum fulgidum* Herb. App. 31. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1269. **Amaryllis pulverulenta** Loddig. Bot. Cab. t. 484. *Hippeastrum pulverulentum* Herbert App. 31. — ♃ — *Habitat in Bonaria.*

1270. **Amaryllis Reginae** Linn. Spec. 421. Curtis Bot. Mag. t. 453. Redouté Liliac. t. 9. Reichenb. Magaz. t. 80. Schultes f. Syst. VII. 815. *Hippeastrum Reginae* Herbert App. 31. — ♃ — *Habitat in Caribaeis, Mexico et Peruvia.*

1271. **Amaryllis vittata** Aiton Hort. kew. ed. 1. p. 418. ed. 2. II. 225. Redouté Liliac. t. 10. Schultes f. Syst. VII. 825. *Hippeastrum vittatum* Herbert App. 31. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

β. Hybrid. ex A. Reginae patre et A. vittata matre: *Amaryllis Gravinae* Melazzo in Giorn. d. Scienz. Lett. et art. di Sicilia n. 24. Hamelin in Annal. soc. horticult. Paris. 1827. Octob. p. 88.

e. **Vallota** Herb.

1272. **Amaryllis purpurea** Aiton Hort. kew. ed. 1. p. 417. ed. 2. II. 224. Bot. Mag. t. 1430. Schultes f. Syst. VII. 827. *Amaryllis speciosa* Heritier Sert.

12. *Crinum speciosum* Linn. Suppl. 195. *Vallota purpurea* Herbert App. 29. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

f. **Belladonna** Sweet.

1273. **Amaryllis Belladonna** Linn. Spec. 421. Miller Ic. t. 23. Redouté Liliac. t. 180. Schultes f. Syst. VII. 828. *Coburgia Belladonna* Herb. in Bot. Mag. n. 2113. p. 4. *Belladonna purpurascens* Sweet Hort. Lond. 506. — ♃ — *Habitat verisimiliter in Capite bonae spei.*

1274. **Amaryllis blanda** Ker Rev. Amaryll. 16. Bot. Mag t. 1450. Schultes f. Syst VII. 829. *Coburgia blanda* Herbert in Bot. Mag. n. 2113. p. 4. *Belladonna blanda* Sweet Hort. Lond. 506. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

g. **Nerine** Herb.

1275. **Amaryllis curvifolia** Jacq. Hort. Schönbr. I. 33. t. 64. Redouté Liliac. t. 274. Schultes f. Syst. VII. 832. *Nerine curvifolia* Herbert App. 19. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1276. **Amaryllis sarniensis** Linn. Spec. 421. Curtis Bot. Mag. t. 294. Redouté Liliac. t. 33. Jacq. Hort. Schönbr. t. 66. Schultes f. Syst. VII. 834. *Nerine sarniensis* Herb. App. 19. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei et Japonia, olim etiam in Britanniae insula Guernsey, unde vulgo Anglis »the Guernsey Lily« dicta.*

1277. **Amaryllis undulata** Linn. Syst. 264. Jacq. Collect IV. 222. t. 3. f. 4. Hort. Vindob. III. t. 13. Curt. Bot. Mag. t. 369. Redouté Liliac. t. 115. Schultes f. Syst. VII. 835. *Nerine undulata* Herb. App. 19. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1278. **Amaryllis humilis** Jacq. Hort. Schönbr. 36. t. 69. Curt. Bot. Mag. t. 726. Redouté Liliac t. 449. Schultes f. Syst. VII. 837. *Nerine humilis* Herb. App. 19. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1279. **Amaryllis flexuosa** Jacq. Hort.

Schönbr. I. 35. t. 67. Ker Bot Reg. t. 172. Schultes f. Syst. VII. 838. *Nerine flexuosa* Herb App. 19. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1274. **Brunsvigia** Ker.

a. **Brunsvigia** Herb.

1280. **Brunsvigia Josephinae** Ker in Bot. Mag. n. 923. Schultes f. Syst. VII. 845. *Amaryllis Josephinae* Redouté Liliac. t. 370. 371. 372. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Buphane** Herb.

1281. **Brunsvigia ciliaris** Ker in Bot. Reg. n. 192. 193. Schultes f. Syst. VII. 848. *Buphane ciliaris* Herb. App. 18. *Haemanthus ciliaris* Linn. Spec. 413. Jacq. Fragm. 36. t. 40. f. 1. t. 41. f. 2. *Amaryllis ciliaris* Linn. Suppl. 195. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1276. **Crinum** Linn.

1282. **Crinum capense** Herbert App. 23. Schultes f. Syst. VII. 862. *Amaryllis longifolia* Heritier Sert. p. 13. Jacq. Ic. rar. t. 362. Redouté Liliac. t. 347. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1283. **Crinum americanum** Linn. Spec. 419. Curt. Bot. Mag. t. 1034. Schultes f. Syst. VII. 872. — ♃ — *Habitat in America tropica et Louisiana.*

1284. **Crinum asiaticum** Linn. Spec. 419. Curt. Bot. Mag. t. 1073. Schultes f. Syst. VII. 876. — ♃ — *Habitat in Asia tropica.*

Bulbus emeticus.

1278. **Haemanthus** Linn.

1285. **Haemanthus puniceus** Linn. Spec. 413. Curt. Bot. Mag. t. 1315. Redouté Liliac. t. 320. Schultes f. Syst. VII. 885. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1286. **Haemanthus coccineus** Linn. Spec.

412. Curt. Bot. Mag. t. 1075. Redouté Liliac. t. 39. Schultes f. Syst. VII. 886. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Radix colonis capensibus *Radicis Squillae* loco est.

1287. **Haemanthus moschatus** Jacq. Hort. Schönbr. IV. 6. t. 410. Schultes f. Syst. VII. 890. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1279. Cyrtanthus Ait.

1288. **Cyrtanthus Pumilio** Schultes f. Syst. VII. 900. *Amaryllis Pumilio* Aiton Hort. kew. ed. 1. p. 415. ed. 2. II. 223. *Amaryllis humilis* Link Enum. 1. 313. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1289. **Cyrtanthus angustifolius** Aiton Hort. kew. ed. 1. 414. Schultes f. Syst. VII. 896. *Crinum angustifolium* Linn. Suppl. 195. *Monella angustifolia* Herb. App. 29. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1281. Chlidanthus Lindl.

1290. **Chlidanthus fragrans** Lindley Collect. t. 34. Bot. Reg. t. 640. excl. synon. Schultes f. Syst. VII. 902. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

B. Narcisseae.

1288. Pancratium Linn.

a. Hymenocallis Salisb.

1291. **Pancratium caribaeum** Linn. Spec. 418. Jacq. Hort. Vindob. III. t. 10 Redouté Liliac. t. 414. Schultes f. Syst. VII. 917. *Hymenocallis caribaea* Herb. App. 44. — ♃ — *Habitat in insulis Caribaeis.*

1292. **Pancratium littorale** Jacq. Amer. 99. t. 179. f. 94. Ed. pict. t. 101. Hort. Vindob. III. t. 75. Salisbury in Linn. Transact. II. 74. t. 13 Schultes f. Syst. VII. 919. *Hymenocallis littoralis* Salisbury in Hortic. Transact. 1. 338. — ♃ — *Habitat in littoribus Americae tropicae.*

b. **Schizostephanium** Reichenb.

1293. **Pancratium maritimum** Linn. Spec. 418. Salisbury in Linn. Transact. II. 70. t. 9. Redouté Liliac. t. 8. Sibthorp Flor. graec. t. 309. Schultes f. Syst. VII. 923. — ♃ — *Habitat in littoribus mediterraneis.*

Offic. exolet. Radix Pancratii monspessulani v. Hemerocallidis valentinae s. Scillae minoris.

1294. **Pancratium illyricum** Linn. Spec. 418. Salisbury in Linn. Transact. II. 74. t. 14. Redouté Liliac. t. 153. Schultes f. Syst. VII. 925. *Halmyra stellaris* Salisbury in Hortic. Transact. I. 336. — ♃ — *Habitat in littoribus Siciliae, Corsicae, Sardiniae et Hispaniae.*

1289. Narcissus.

* **Corbularia.**

1295. **Narcissus Bulbocodium** Linn. Spec. 417. Curt. Bot. Mag. t. 88. Redouté Liliac. t. 24. Schultes f. Syst. VII. 935. *Corbularia Bulbocodium* Haworth Suppl. 123. — ♃ — *Habitat in Lusitania, Hispania, Pyrenaeis, hortulanis vulgo* »Trompette de Meduse« *dictus.*

** **Ajaces.**

1296. **Narcissus Pseudo-Narcissus** Linn. Spec. 414. E. B. t. 17. Schultes f. Syst. VII. 938. — ♃ — *Habitat in graminosis Europae fere totius et Tauriae.*

β *Plenus.* — γ. *Albo-plenus.* — δ. *Ochroleuco-plenus.* — ε. *Plenissimus.*

Offic. exolet. Radix Pseudonarcissi s. Narcissi majoris v. Bulbocodii.

1297. **Narcissus major** Curtis Bot. Mag. t. 51. Schultes f. Syst. VII. 940. — ♃ — *Habitat in Gallia prope Limoges.*

1298. **Narcissus moschatus** Linn. Spec. 415. Schultes f. Syst. VII. 941. *Narcissus albus* Haworth in Linn. Transact. V. 243. *Narcissus candidissimus* Redouté Liliac. t. 188. — ♃ — *Habitat in Pyrenaeis.*

*** **Philogynae.**

1299. **Narcissus odorus** Linn. Spec. 416. Schultes f. Syst. VII. 958. — ♃ — *Habitat in Europa australi, Gallia et Helvetia.*

**** **Hermiones.**

1300. **Narcissus Jonquilla** Linn. Spec. 417. Curtis Bot. Mag. t. 15. Redouté Liliac. t. 159. Schultes f. Syst. VII. 961. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea et Oriente.*

1301. **Narcissus juncifolius** Requien ex Loisl. Nouv. Not. 14. Annal. Soc. Linn. Paris VI. 1827. Schultes f. Syst. VII. 962. — ♃ — *Habitat in Occitania et Galloprovincia, ad radices montis Ventosi.*

1302. **Narcissus compressus** Haworth in Linn. Transact. V. 213. Schultes f. Syst. VII. 967. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

1303. **Narcissus tereticaulis** Haworth in Linn. Transact. V. 245. Schultes f. Syst. VII. 967. — ♃ — *Patria ignota.*

1304. **Narcissus citrinus** Schultes f. Syst. VII. 968. *Hermione citrina* Haworth Suppl. 141. — ♃ — *Patria ignota.*

1305. **Narcissus crenulatus** Haworth in Linn. Transact. V. 251. Schultes f. Syst. VII. 969. — ♃ — *Patria ignota.*

1306. **Narcissus Tazetta** Linn. Spec. 416. Sibthorp Flor. graec. t. 308. Schultes f. Syst. VII. 969. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

1307. **Narcissus aureus** Loisleur Herb. Am. t. 147. Flor. Gall. ed. 2. 1. p. 235. — ♃ — *Habitat in Galloprovincia.*

1308. **Narcissus praecox** Tenore Flor. neap. 146. t. 27. Schultes f. Syst. VII. 971. — ♃ — *Habitat in regno neapolitano.*

1309. **Narcissus fistulosus** Schultes f. Syst. VII. 972. *Hermione fistulosa* Haworth Synops. 364. Suppl. 330. — ♃ — *Patria ignota.*

1310. **Narcissus cerinus** Schultes f. Syst.

VII. 972. *Hermione cerina* Haworth Synops. 329. Suppl. 143. — ♃ — *Patria ignota.*

1311. **Narcissus italicus** Ker in Bot. Mag. n. 1188. Schultes f. Syst. VII. 973. — ♃ — *Habitat in Italia.*

1312. **Narcissus niveus** Loisleur Jour. Bot. II. 278. Schultes f. Syst. VII. 975. — ♃ — *Habitat in Gallia australi.*

1313. **Narcissus unicolor** Tenore Flor. Neap. I. 144. t. 26. Schultes f. Syst. VII. 976. — ♃ — *Habitat in Vesuvio et in insula Caprearum.*

1314. **Narcissus dubius** Gouan Illustr. 22. DC. Cat. hort. Monsp. 1813. p. 127. Redouté Liliac. t. 429. Schultes f. Syst. VII. 978. — ♃ — *Habitat in Gallia meridionali, circa Monspelium, Avenionem et in Pyrenaeis.*

1315. **Narcissus serotinus** Linn. Spec. 417. Schultes f. Syst. VII. 979. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea occidentali.*

***** **Poetici.**

1316. **Narcissus poeticus** Linn. Spec. 414. E. B. t. 275. Schkuhr t. 90. Redouté Liliac. t. 160. Schultes f. Syst. VII. 982. — ♃ — *Habitat in pratis et vallibus Europae totius.*

Offic. exolet. Radix Narcissi.

1317. **Narcissus patellaris** Salisbury Prodr. 225. Schultes f. Syst. VII. 983. *Narcissus majalis* Sprengel N. E. II. 17. — ♃ — *Habitat in pratis subalpinis Austriae.*

C. Anomalae.

1291. **Clivia** Lindl.

1318. **Clivia nobilis** Lindley in Bot. Reg. t. 1182. *Imatophyllum Aitoni* Hooker Bot. Mag. t. 2856. — ♃ — *Habitat in interioribus promontorii bonae spei.*

1293. Ixiolirion.

1319. **Ixiolirion tataricum** Herbert App. Bot. Mag. p. 37. Schultes f. Syst. VII. 752. *Amaryllis tatarica* Pallas It. 3. App. 85. t. D. f. 1. Bieberst. Flor. taur. cauc. 1. 260. Suppl. 256. — ♃ — *Habitat in Tauria et Sibiria.*

1295. Alströmeria Linn.

1320. **Alströmeria peregrina** Linn. Spec. 461. Jacq. Collect. IV. 220. t. 2. f. 6. Hort. Vindob. I. 20. t. 50. III. t. 73. 74. Curtis Bot. Mag. t. 139. Gärtner Carp. I. 41. t. 13. f. 4. Redouté Liliac. t. 46. Schultes f. Syst. VII. 732. — ♃ — *Habitat in collibus maritimis Peruviae et Chili.*

Us. Fecula Alströmeriae.

1321. **Alströmeria versicolor** Ruiz et Pav. Fl. peruv. III. 59. — ♃ — *Habitat in Chili.*

1322.* **Alströmeria Hookeriana** Schultes f. Syst. VII. 733. *Alströmeria Hookeri* Loddig Bot. Cab. t. 1272. *Alströmeria rosea* Hooker Exot. Flor. t. 181. non Ruiz et Pav. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1323. **Alströmeria psittacina** Lehmann Cat. sem. hort. Hamb. 1826. Bot. Reg. t. 1540. Schultes f. Syst. VII. 739. — ♃ — *Patria ignota.*

1324. **Alströmeria aurea** Graham in Jamiesons Journ. 1833. July. *Alströmeria aurantiaca* Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 208. Bot. Reg. t. 1843. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

1296. Doryanthes Correa.

1325. **Doryanthes excelsa** Correa in Linn. Transact. VI. 211. t. 23. R. Brown Prodr. 298. Ferd. Bauer Illustr. t. 12 — 14. Bot. Mag. t. 1685. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

*Agaveae.

1297. Agave Linn.

1326. **Agave americana** Linn. Spec. 461. Andrews Bot. Reposit. t. 438. Schultes f. Syst. VII. 722. — ♃ — *Habitat in America tropica, nunc in littoribus Italiae et Galliae meridionalis, et in Helvetia quasi spontanea.*

β. *Variegata.*

Offic. Radix Agaves s. Magey.

1327. **Agave potatorum** Zuccarini in N. A. N. C. XVI. 674. — ♃ — *Habitat in imperio mexicano.*

1328. **Agave macroacantha** Zuccarini in N. A. N. C. XVI. 676. — ♃ — *Habitat in imperio mexicano.*

1329. **Agave brachystachys** Cavanill. Descript. 453. Schultes f. Syst. VII. 724. *Agave spicata* DC. Cat. hort. Monsp. 1813. p. 76. Redouté Liliac. t. 485. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1330. **Agave yuccaefolia** Redouté Liliac. t. 328. 329. Willd. Suppl. 19. Schultes f. Syst. VII. 725. — ♃ — *Patria ignota.*

1331. **Agave lurida** Aiton Hort. kew. ed. 1. p. 472. ed. 2. II. 302. Ker in Bot. Mag. t. 1522. Schultes f. Syst. VII. 726. Zuccarini in N. A. N. C. XVI. 670. t. 50. non Jacq — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1332. **Agave vivipara** Linn. Spec. 461. Schultes f. Syst. VII. 727. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1333. **Agave polyanthoides** Schiede in Linnaea IV. 581. — ♃ — *Habitat in regione subcalida Mexici, prope Hacienda de la Laguna.*

1334. **Agave geminiflora** Brandes Journ. of sc. n. 3. t. 1. Schultes f. Syst. VII. 729. *Littea juncea* Tagliabue in Bibliot. italian. I. 100. *Bonapartea juncea* Willd. Enum. Suppl. 18. *Dracaena Boscii* Hort. Cels. *Dracaena filamentosa* Hort. — ♃ — *Habitat verisimiliter in Peruvia.*

1298. **Fourcroya** Vent.

1335. **Fourcroya gigantea** Venten. in Usteri Annal. XIX. 54. DC. Pl gr. t. 126. Bot. Mag. t. 2250. Schultes f. Syst. VII. 730. *Agave foetida* Linn. Spec. 461. Jacq. Ic. rar. t. 379. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1336. **Fourcroya rigida** Haworth Succ. 74. Schultes f. Syst. VII. 731. *Agave rigida* Miller Dict. Spin Cat. Jard. St. Sebast. 1812. p. 23. c. ic. Link Enum. 1. 334. — ♃ — *Habitat in America calidiore circa Vera-Cruz.*

Ordo XXVI. Bromeliaceae.

1300. **Bromelia** Linn.

1337. **Bromelia Karatas** Linn. Spec. 408. Jacq. Amer. 90. t. 178. f. 26. Edit. pict. t. 260. Hort. Vindob I. 31. 32. III. t. 73. 74. Schultes f. Syst. VII. 1276. *Bromelia acaulis* Redouté Liliac. t. 457. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1338. **Bromelia humilis** Jacq. Enum. Stirp. Vindob. App. 306. Miscell. II. 325. Ic. rar. t. 60. Schultes f. Syst. VII. 1275. — ♃ — *Habitat verisimiliter in Mexico.*

1302. **Billbergia** Thunb.

1339. **Billbergia pyramidalis** Lindley in Bot. Reg. n. 1068. Schultes f. Syst VII. 1258. *Bromelia pyramidalis* Sims Bot. Mag. 1732. — ♃ — *Habitat in rupestribus Brasiliae.*

1340. **Billbergia zebrina** Lindley in Bot. Reg. n. 1068. Schultes f. Syst. VII. 1261. *Bromelia zebrina* Herbert in Bot. Mag. t. 2686. — ♃ — *Habitat in Brasilia prope Rio-Janeiro.*

1341. **Billbergia amoena** Lindley in Bot. Reg. n. 1068. Schultes f. Syst. VII. 1263. *Bromelia pallida* Ker in Bot. Reg. t. 344. Hooker Exot. Flor.

t. 41. Reichenb. Magaz. t. 94. *Tillandsia amoena* Loddig. Bot. Cab. t. 76. Schwägrich. Schrift. d. Leipz. naturf. Gesellsch. 1822. p. 208. t. 12. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1342. **Billbergia clavata** Lindley in Bot. Reg. n. 1068. Schultes f. Syst. VII. 1255. *Tillandsia clavata* Lindley in Bot. Reg. t. 766. — ♃ — *Habitat in insula Trinidad.*

1305. Pitcairnia Herit.

1343. **Pitcairnia muscosa** Martius ex Schultes f. Syst. VII. 1240. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1344. **Pitcairnia bromeliaefolia** Heritier Sert. 7. t. 11. Redouté Liliac. t. 75. Bot. Mag. t. 824. Bot. Reg. t. 1011. Schultes f. Syst. VII. 1244. — ♃ — *Habitat in rupibus umbrosis Jamaicae.*

1345. **Pitcairnia latifolia** Aiton Hort. kew. ed. 1. II. p. 401. ed. 2. II. 202. Bot. Mag t. 856. Schultes f. Syst. VII. 1246. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

1346. **Pitcairnia ramosa** Jacq. f. Eclog. I. 154. Schultes f. Syst. VII. 1247. *Pitcairnia furfuracea* Jacq. f. Eclog. I. 117. t. 79. non Willd. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1306. Tillandsia Thunb.

1347. **Tillandsia dianthoidea** Rossi Catalog. Hort. modoet. 79. t. 1. Schultes f. Syst. VII. 1205. *Pourretia aëranthos* Herb. Gen. Amat. t. 307. Rossi Op. cit. 80. t. 2. — ♃ — *Habitat in Monte-Video.*

1307. Caraguata Plum.

1348. **Caraguata lingulata** Lindley in Bot. Reg. t. 1068. Schultes f. Syst. VII. 1230. *Tillandsia lingulata* Jacq. Amer. 92. t. 62. Ed. pict. t. 92. — ♃ — *Habitat in sylvis Antillarum, imprimis Martinicae, super arbores pseudoparasita.*

1312. **Dyckia** Schult. f.

1349. **Dyckia rariflora** Schultes f. Syst. VII 1195. Lindley in Bot. Reg. t. 1782. Hooker in Bot. Mag. t. 3449. — ♃ — *Habitat in Serra de Villa Ricca Brasiliae.*

Ordo XXVII. Orchideae.

A. Malaxideae.

1316. **Pleurothallis** R. Br.

1350. **Pleurothallis saurocephala** Loddig. Lindley in Bot. Reg. t. 1968. — ♃ — *Patria ignota.*

1340. **Liparis** L. C. Rich.

1351. **Liparis elata** Lindley in Bot. Reg. t. 1175. Orchid. 27. *Cymbidium bituberculatum* Hooker Exot. Flor. t. 116. — ♃ — *Habitat in India orientali et Brasilia.*

1344. **Pholidota** Lindl.

1352. **Pholidota imbricata** Lindley in Hooker Exot. Flor. t. 138. Bot. Reg. t. 1213. Orchid. 36. *Ptilocnema bracteata* Don Nepal. 33. — ♃ — *Habitat in India orientali, frequens.*

1363. **Eria** Lindley.

1353. **Eria stellata** Lindley in Bot. Reg. t. 904. Orchid. 67. — ♃ — *Habitat verisimiliter in insula Java.*

1369. **Dendrobium** Swartz.

1354. **Dendrobium Pierardi** Roxb. msc. Hooker Exot. Flor. t. 9. Lindley Orchid. 79. *Dendrobium cucullatum* R. Brown in Bot. Reg. t. 548.

— ♃ — *Habitat in India orientali calidiore, saepissime in Mangiferae truncis parasiticum.*

1355. **Dendrobium speciosum** R. Brown Prodr. 332. Lindley Orchid. 87. Bot. Reg. t. 1610. Bot. Mag. t. 3074. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

B. Epidendreae.

1371. **Epidendrum** Linn.

1356. **Epidendrum cochleatum** Linn. Spec. 1351. Jacq. Ic. rar. t. 605. Bot. Mag. t. 572. Lindley Orchid. 97. — ♃ — *Habitat in India occidentali vulgatissimum.*

1357. **Epidendrum fuscatum** Swartz Nov. Act. Upsal. VI. 69. Smith Spicileg. t. 23. Bot. Reg. t. 67. Hooker in Bot. Mag. t. 2844. Lindley Orchid. 104. *Epidendrum anceps* Jacq. Amer. t. 138. — ♃ — *Habitat in Jamaica et Martinica.*

1358. **Epidendrum elongatum** Jacq. Ic. rar. III. t. 604. Swartz Nov. Act. Upsal. VI. 69. Bot. Mag. t. 611. Lindley Orchin. 107. — ♃ — *Habitat ad Caracas.*

1359. **Epidendrum crassifolium** Lindley Orchid. 107. *Epidendrum ellipticum* Loddig. Bot. Cab. t. 1216. — ♃ — *Habitat in Antillis.*

1372. **Dinema** Lindl.

1360. **Dinema polybulbon** Lindley Orchid. 111. *Epidendrum polybulbon* Swartz Flor. Ind. occid. 1491. Hooker Exot. Flor. t. 112. — ♃ — *Habitat in Jamaica et Mexico.*

1380. **Cattleya** Lindl.

1361. **Cattleya citrina** Lindley Orchid. 117. *Sobralia citrina* Llav. Nov. Veg. II. 21. — ♃ — *Habitat in Mexici arboribus, vulgo Tatzingueni dicta.*

1385. **Bletia** R. Br.

1362. **Bletia verecunda** R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 206. Lindley Orchid. 121. *Cymbidium verecundum* Swartz in Nov. Act. Upsal. VI. 75. *Limodorum altum* Linn. Syst. 680. Jacq. Ic. rar. III. t. 602. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

1388. **Phajus** Lour.

1363. **Phajus grandiflorus** Loureiro Flor. cochinch. 529. Lindley Orchid. 126. *Limodorum Tankervilliae* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 302. t. 12. *Limodorum Incarvillei* Persoon Encheir. II. 520. *Bletia Tankervilliae* R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 207. Bot. Mag. t. 1924. — ♃ — *Habitat in China.*

C. Vandeae.

1407. **Maxillaria** Ruiz et Pav.

1364. **Maxillaria densa** Lindley in Bot. Reg. t. 1804. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1365. **Maxillaria aromatica** Graham in Hooker Exot. Flor. t. 219. Lindley Orchid. 146. Bot. Reg. t. 1871. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1366. **Maxillaria decolor** Lindley in Bot. Reg. t. 1549. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1367. **Maxillaria Deppii** Loddig. Bot. Cab. t. 1612. Lindley Orchid. 147. — ♃ — *Habitat in Mexico prope Xalapam.*

1368. **Maxillaria variabilis** Batemann in Bot. Reg. n. 1986. *Maxillaria Henchmanni* Hooker Bot. Mag. t. 3614. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1414. **Dicrypta** Lindl.

1369. **Dicrypta Baueri** Lindley Orchid 44 et 152. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1421. **Stanhopea** Lindl.

1370. **Stanhopea grandiflora** Lindley Orchid. 158. *Ceratochilus grandiflorus* Loddig. Bot. Cab. t. 1414. — ♃ — *Habitat in insula Trinitatis.*

1427. **Cymbidium** Swartz.

1371. **Cymbidium ensifolium** Swartz Nov. Act. Upsal. VI. 77. Bot. Mag. t. 1751. Lindley Orchid. 162. *Epidendrum ensifolium* Linn. Spec. 1352. Smith Spicileg. 22. t. 24. *Limodorum ensatum* Thunberg Flor. japon. 29. Banks Ic. Kämpf. t. 3. — ♃ — *Habitat in China.*

1429. **Acropera** Lindl.

1372. **Acropera Loddigesii** Lindl Orchid. 272. *Maxillaria galeata* Lindley in Bot. Cab. t. 1645. — ♃ — *Habitat in Mexico prope Xalapa.*

1444. **Cyrtopodium** R. Br.

1373. **Cyrtopodium Andersonii** R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 216 Bot. Mag. t. 1800. Lindley Orchid. 188. *Cymbidium Andersonii* Andrews Bot. Reposit. t. 651. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

1447. **Lissochilus** R. Br.

1374. **Lissochilus streptopetalus** Lindley Orchid. 191. *Eulophia streptopetala* Lindley in Bot. Reg. t. 1002. Graham in Bot. Mag. t. 2931. — ♃ — *Habitat testantibus hortulanis in Brasilia, sed verisimilius cum congeneribus in Africa indigenus.*

1460. **Oncidium** Swartz.

1375. **Oncidium sanguineum** Lindley in Bot. Reg. 1839. App. n. 68. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1376. **Oncidium carthagenense** Swartz Act. Holm. 1800. p. 240. Lindley Orchid. 201. *Epidendrum carthagenense* Jacq. Amer. 228. t. 133. f. 4. — ♃ — *Habitat in sylvis Carthagenae.*

1377. **Oncidium Insleayi** Barker ex Lindley in Bot. Reg. 1840. App. n. 21. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1467. **Brassia** R. Br.

1378. **Brassia caudata** Lindley in Bot. Reg. t. 832. Orchid. 212. *Epidendrum caudatum* Linn. Spec. 1349. — ♃ — *Habitat in India occidentali.*

D. Ophrydeae.

1507. **Orchis** Linn. Knabenkraut.

1379. **Orchis latifolia** Linn. Spec. 1334. Flor. dan. t. 266. E. B. t. 2308. Reichenb. Iconogr. t. 564. Lindley Orchid. 260. — ♃ — *Habitat in Europa media et boreali.*

β *Carnea.*

1380. **Orchis maculata** Linn. Spec. 1334. Flor. dan. t. 933. E. B. t. 632. Reichenb. Iconogr. t. 566. Lindley Orchid. 266. — ♃ — *Habitat in Europa media et boreali.*

1381. **Orchis Morio** Linn. Mant. 485. E. B. t. 2059. Lindley Orchid. 268. — ♃ — *Habitat in pratis Europae totius.*

Offic. Radix Salep.

1382. **Orchis ustulata** Linn. Spec. 1333. E. B. t. 18. Reichenb. Iconogr. t. 569. Lindley Orchid. 274. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Europae totius.*

1509. **Gymnadenia** R. Br. Höswurz.

1383. **Gymnadenia conopsea** R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 191. Lindley Orchid. 275. *Orchis conopsea* Linn. Spec. 1335. E. B. t. 10. Flor. dan. t. 224. — ♃ — *Habitat in pascuis Europae mediae.*

1512. Aceras R. Br.

1384. **Aceras hircinum** Lindley Orchid. 282. *Himantoglossum hircinum* Sprengel Syst. III. 694. *Loroglossum hircinum* Richard Orchid. 32. *Orchis hircina* Swartz in Act. Holm. 1800. p. 207. *Satyrium hircinum* Linn. Spec. 1337. E. B. t. 54. Jacq. Flor. austr. t. 367. — ♃ — *Habitat in pratis siccis Europae mediae.*
Offic. exolet. Radix Tragorchidis s. Testiculi hircini.

1515. Platanthera L. C. Rich.

1385. **Platanthera bifolia** L. C. Richard Orchid. europ. 35. Reichenb. Iconogr. t. 1143. Lindley Orchid. 285. *Habenaria bifolia* R. Brown in Ait. Hort. kew. ed. 2. V. 193. *Orchis bifolia* Linn. Spec. 1331. — ♃ — *Habitat in pratis nemorosis Europae totius.*

1552. Listera R. Br.

1386. **Listera ovata** R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 201. *Neottia ovata* Endl. Flor. pos. 164. *Neottia latifolia* Richard Orchid. Europ. 37. *Epipactis ovata* Crantz Flor. austr. 473. *Ophrys ovata* Linn. Spec. 1340. Flor. dan. t. 137. — ♃ — *Habitat in pratis paludosis Europae totius.*

E. Neottieae.

1553. Epipactis Swartz.

1387. **Epipactis palustris** Crantz Flor. austr. 462. t. 1. f. 5. *Serapias palustris* Scop. Flor. carn. n. 1129. *Serapias longifolia* Murray Syst. 815. Flor. dan. t. 267. *Serapias longifolia* γ. Linn. Spec. 1345. — ♃ — *Habitat in pratis paludosis Europae totius.*
Offic. exolet. Radix Helleborines.

1559. Goodyera R. Br.

1388. **Goodyera procera** Hooker Exot. Flor.

t. 39. *Neottia procera* Wallich ex Lindley Bot. Reg. t. 639. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

1389. **Goodyera discolor** R. Brown in Bot. Reg. t. 271. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

F. Arethuseae.

1614. **Vanilla** Swartz.

1390. **Vanilla planifolia** Andrews Bot. Reposit. t. 538. Blume Rumphia 1 197. t. 68. Morren in Annal. of Nat. hist. III. 1. Lindley Orchid. 435. — ♃ — *Habitat in India occidentali, unde ab Anglis in Asiae tropicae insulas invecta.*

Us. Siliquae Vanillae.

G. Cypripedieae.

1618. **Cypripedium** Linn. Frauenschuh.

1391. **Cypripedium insigne** Wallich mse. Lindley Collect. t. 32. Hooker Exot. Flor. t. 34. Bot. Mag. t. 3412. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

1392. **Cypripedium Calceolus** Linn. Spec. 1346. Flor. dan. t. 999. — ♃ — *Habitat in Europa media et boreali.*

1393. **Cypripedium spectabile** Swartz in Act. Holm. 1800. p. 251. Lindley in Bot. Reg. t. 1666. *Cypripedium album* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 303. Bot. Mag. t. 216. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

Ordo XXVIII. Zingiberaceae.

1622. **Zingiber** Gärtn. Ingwer.

1394. **Zingiber Zerumbet** Roscoe in Linn. Transact. VIII. 384. Monandr. t. 87. Smith Exot. Bot. II. t. 112. *Amomum Zerumbet* Linn. Spec. 1. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

Offic. evolet. Radix Zerumbet.

1395. **Zingiber Cassumunar** Roxburgh in Asiat. Research. XI. 347. Roscoe Monandr. t. 79. *Zingiber purpureum* Roscoe in Linn. Transact. VIII. 348. *Cassumunar Roxburghii* Colla Comment. 1830. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

Offic. exolet. Radix Cassumunar s. Zedoariae luteae.

1623. Curcuma Linn. Gilbwurz.

1396. **Curcuma longa** Linn. Spec. 3. Roscoe in Linn. Transact. VIII. 355. *Amomum Curcuma* Jacq. Hort. Vindob. III. 5. t. 4. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

Offic. Radix Curcumae longae.

1624. Kaempferia Linn.

1397. **Kaempferia rotunda** Linn. Spec. 3. Jacq. Hort. Schönbr. III. 37. t. 317. Bot. Mag. t. 850. Roscoe Monandr. t. 14. — ♃ — *Habitat in India orientali,*

Offic. exolet. Radix Zedoariae rotundae.

1398. **Kaempferia latifolia** Don Catalog. Hort. Cantabr. ed. 7. p. 2. Hornem. Catalog. Hort. Hafn. 6. — ♃ — *Patria ignota.*

1630. Hedychium Koenig.

1399. **Hedychium coronarium** Koenig in Retz Observ. III. 73. Curtis Bot. Mag. t. 708. Smith Exot. Bot. II. t. 107. Roscoe Monandr. t. 77. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

1400. **Hedychium Gardnerianum** Roscoe Monandr. 2. t. 13. Bot. Reg. t. 774. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

1401. **Hedychium angustifolium** Roxburgh Plant. corom. t. 254. Roscoe Monandr. t. 35. — ♃ — *Habitat in Bengalia.*

1402. **Hedychium thyrsiforme** Smith in Rees Cyclop. Roscoe Monandr. t. 60. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

1632. Alpinia Linn.

1403. **Alpinia nutans** Roscoe in Linn. Transact. VIII. 346. Monandr. t. 61. Smith Exot. Bot. II. t. 166 *Globba nutans* Linn. Mant. 170. Redouté Liliac. t. 60. *Zerumbet speciosum* Jacq. Fragm. t. 68. Wendland Sert. Hannov. t. 19. — ♃ — *Habitat in Moluccis.*
Radix Galangae spuriae.

1638. Costus Linn.

1404. **Costus speciosus** Smith in Linn. Transact. I. 249. Roscoe Op. cit. VIII. 346. *Costus arabicus* Linn. Spec. 2. Jacq. Collect. I. 143. Ic. rar. t. 1. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

1405. **Costus niveus** C. F. W. Meyer Essequeb. 1. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

Ordo XXIX. Cannaceae.

1641. Thalia Linn.

1406. **Thalia dealbata** Fraser Monogr. c. ic. Sowerb. Roscoe in Linn. Transact. VIII. 340. Monandr. t. 75. Sims Bot. Mag. t. 1690. *Peronia stricta* DC. in Redouté Liliac. t. 342. — ♃ — *Habitat in lacubus Carolinae meridionalis.*

1642. Maranta Linn.

1407. **Maranta arundinacea** Linn. Spec. 2. Roscoe in Linn. Transact. VIII. 339. Monandr. t. 27. Redouté Liliac. t. 57. Fischer in Mem. soc. nat. Mosq. III. 47. t. 8. Hegetschweiler Dissert. t. 4. f. 23—28. — ♃ — *Habitat in America tropica.*
Fecula Marantae s. *Arrow-root.*

1408. **Maranta bicolor** Ker in Bot. Reg. t. 786. Roscoe Monandr. t. 59. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1643. **Phrynium** Willd.

1409. **Phrynium setosum** Roscoe Monandr. 14. t. 107. *Maranta setosa* Dietrich Spec. pl. I. 23. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1644. **Calathea** G. F. W. Meyer.

1410. **Calathea zebrina** Don Catalog. Hort. Cantabr. ed. 10. p. 3. Lindley in Bot. Reg. n. 1210. *Maranta zebrina* Sims Bot. Mag. t. 1926. *Phrynium zebrinum* Roscoe Monandr. 7. t. 52. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1646. **Canna** Linn.

§. 1. Corollae interioris labium superius tripartitum.

§§. *a.* Corolla rubra v. rubescens.

1411. **Canna iridiflora** Ruiz et Pav. Flor. Peruv. I. 1. Bot Mag. t. 1968. Bot. Reg. t. 609. Roscoe Monandr. t. 33. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

1412. **Canna gigantea** Desfont. Catalog. Hort. Paris. 32. Redouté Liliac. t. 331. Bot. Mag. t. 2316. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1413. **Canna orientalis** Roscoe Monandr. 7. t. 49. *Canna indica* Roxburgh in Asiat. Research. XI. 322. *Canna chinensis* Willdenow Enum. I. 2. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

1414. **Canna edulis** Ker in Bot. Reg. t. 775. Bot. Mag. t. 2498 Roscoe Monandr. t. 73. *Canna indica* Ruiz et Pavon Flor. Peruv. I. 1. *Canna rubricaulis* Link Enum. I. 1. — ♃ — *Habitat in Brasilia et Peruvia.*

1415. **Canna patens** Roscoe in Linn. Transact. VIII. 338. Monandr. t. 42. *Canna indica* Curtis Bot. Mag. t. 444. *Canna coccinea* Link Enum. I. 1. — ♃ — *Habitat in insula St. Helenae.*

1416. **Canna limbata** Roscoe Monandr. 11. t. 82. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1417 **Canna coccinea** Aiton Hort. kew. ed. 2. I. 1. Roscoe Monandr. t. 65. *Canna rubra* Willdenow Enum. 1. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1418. **Canna Lamberti** Ker in Bot. Reg. t. 470. Roscoe Monandr. t. 97. — ♃ — *Habitat in insula Trinitad.*

§§. *b.* Corolla flava v. flavescens.

1419. **Canna pedunculata** Sims in Bot. Mag t. 2323 Roscoe Monandr. t. 10. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1420. **Canna glauca** Linn. Spec. 1. Smith Exot. Bot. II. t. 102. Redouté Liliac. t. 354. Roscoe Monandr. t. 105. Hegetschweiler Comment. t. 2. f. 9. — ♃ — *Habitat in America tropica et boreali calidiore.*

1421. **Canna flaccida** Roscoe in Linn. Transact. VIII. 339. Monandr. t. 1. — ♃ — *Habitat in paludibus Carolinae meridionalis.*

§. 2. Corollae interioris labium superius bipartitum.

§§. *a.* Corolla rubra v. rubescens.

1422. **Canna speciosa** Ker in Bot. Mag. t. 2317. Roscoe Monandr. t. 57. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

1423 **Canna discolor** Lindley in Bot. Reg. t. 1231. — ♃ — *Patria ignota.*

1424. **Canna tenuiflora** Bouché in A. Dietrich Spec. Plant. I. 13. — ♃ — *Patria ignota.*

1425. **Canna occidentalis** Ker in Bot. Reg. t. 772. — ♃ — *Habitat in Antillis.*

1426. **Canna compacta** Roscoe Monandr. 2. t. 9. — ♃ — *Patria ignota.*

1427. **Canna carnea** Roscoe Monandr. 9. t. 66. *Canna variabilis* Willd. Enum. I. 1. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

§§. *b.* Corolla flava.

1428. **Canna lutea** Roscoe in Linn. Transact.

VIII. 338. Monandr. t. 58. Bot. Mag. t. 2085. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

§. 3. Corollae interioris labium superius obsoletum.

1429. **Canna brasiliensis** Sprengel Cur. post. 5. *Canna denudata* var. Roscoe Monandr. t. 26. — ♃ — *Habitat in Brasilia prope Rio Janeiro.*

Ordo XXX. Musaceae.

1647. Heliconia Linn.

1430. **Heliconia psittacorum** Linn Suppl. 158. Andrews Bot. Reposit. t. 124. Redouté Liliac. t. 150. Römer et Schultes Syst. V. 591. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1648. Musa Tournef. Pisang.

1431. **Musa paradisiaca** Linn. Spec. 1477. Redouté Liliac. t. 443. 444. Schultes f. Syst. VII. 1287. — ♃ — *Inter tropicos totius orbis innumeris varietatibus culta.*

1432. **Musa maculata** Jacq. Hort. Schönbr. IV. 23. t. 446. Schultes f. Syst. VII. 1293. — ♃ — *Habitat in insula Mauritii.*

1433. **Musa speciosa** Tenore Ind. Sem. Hort. Neap. 1829. p. 16. Schultes f. Syst. VII. 1734. — ♃ — *Patria ignota.*

1434. **Musa discolor** Hort. Lovan. — ♃ — *Patria ignota.*

1649. Strelitzia Banks.

1435. **Strelitzia Reginae** Banks apud Aiton Hort. kew. ed. 1. II. 285. t. 2. ed. 2. II. 55. Redouté Liliac. t. 77. 78. Römer et Schult. Syst. V. 595. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1436. **Strelitzia humilis** Link Enum. I. 150. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1437. **Strelitzia farinosa** Aiton Hort. kew. ed. I. 2. II. 55. Römer et Schultes Syst. V. 595. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1438. **Strelitzia juncea** Link Enum. I. 150. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Ordo XXXI. Najadeae.

1662. **Zannichellia** Michel.

1439. **Zannichellia palustris** Linn. Spec. 1375. — ♃ Δ — *Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae totius.*

1664. **Potamogeton** Linn. Laichkraut.

1440. **Potamogeton natans** Linn Spec. 182. — ♃ — Δ — *Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae totius.*

1441. **Potamogeton lucens** Linn Spec. 183. — ♃ Δ — *Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae totius.*

Ordo XXXII. Aroideae.

A. Araceae.

1670. **Ambrosinia** Bass.

1442. **Ambrosinia Bassii** Linn. Syst. veg. 689. Cesati in Linnaea XI. 281. t. 5. Blume Rumphia I. 81. t. 36. B. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

1443 **Ambrosinia velutina** Blume Rumphia I. 82. in not. *Ambrosinia maculata* Tenore Index Sem. Hort. Neap. 1829. p. 14. — ♃ — *Habitat in Sardinia et in regno Neapolitano.*

1671. **Cryptocoryne** Fisch.

1444. **Cryptocoryne spiralis** Fischer ex

Wydler in Linnaea V. 428. Schott Melet. 16. Blume Rumphia I. 84. t. 36. f. c. *Arum spirale* Retz Observ. I. 30. Willd. Spec IV. 486. Bot Mag. t. 2220. — ♃ — *Habitat in humidis Tranquebariae et Sinae.*

1702. **Anthurium** Schott.

1445. **Anthurium acaule** Schott Melet. 22. *Pothos acaulis* Linn. Spec. 1675. Jacq. Amer. 240. t. 153. Willdenow Spec. I. 684. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1446. **Anthurium violaceum** Schott Melet. 22. *Pothos violacea* Swartz Prodr. 32. Willdenow Spec. I. 685. — ♃ — *Habitat in insulis Antillanis.*

1447. **Anthurium crassinervium** Schott Melet. 22. *Pothos crassinervia* Jacq. Collect. IV. 122. Ic. rar. t. 610. Willdenow Spec. I 685 Hooker Bot. Mag. t. 2987. — ♄ — *Habitat ad Caracas Americae tropicae.*

1448. **Anthurium macrophyllum** Schott Melet. 22. *Pothos grandifolia* Jacq. Collect. IV. 121. Ic. rar. t. 610. *Pothos macrophylla* Swartz Flor. Ind. occid. I. 269. Willdenow Spec. I. 686. Hooker Bot. Mag. t. 2801. — ♃ — *Habitat in Antillis.*

1449. **Anthurium digitatum** Schott Melet. 22. *Pothos digitata* Jacq. Collect. IV. 119. Ic. rar. t. 611. Willdenow Spec. I. 686. — ♃ — *Habitat ad Caracas Americae tropicae.*

1450. **Anthurium Harrisii** Schott. *Pothos Harrisii* Hooker Exot. Flor. t. 211. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1451. **Anthurium undulatum** Schott. *Pothos undulata* Hort. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1452. **Anthurium lucidum** Schott. *Pothos lucida* Hort. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1453. **Anthurium leptostachyum** Schott. *Pothos leptostachya* Hort. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1454. **Anthurium indecorum** Schott. *Pothos indecora* Hort. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1455. **Anthurium Beyrichianum** Kunth msc. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1456. **Anthurium longifolium** Kunth msc. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1457. **Anthurium variabile** Kunth msc. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1673. **Arisarum** Tournef.

1458. **Arisarum vulgare** Targioni Tozzetti in Annal. Mus. Florent. II. 2. 66. Kunth in Mem. Mus. IV. 435. Blume Rumphia I. 90. *Arisarum australe* Richard in Guillem. Archiv. Bot I. 20. t. 2. *Arum Arisarum* Linn. Spec. 966. Jacq Hort. Schönbr. t. 192. — ♃ — *Habitat in nemoribus regionis mediterraneae.*
Offic. exolet. Radix Arisari.

1459. **Arisarum proboscideum** Schott Melet. 16. Blume Rumphia 92. *Arum proboscideum* Linn. Spec. 966. — ♃ — *Habitat in Apennino.*

1674. **Arisaema** Mart.

1460. **Arisaema atrorubens** Blume Rumph. I. 97. *Arum atrorubens* Aiton Hort. kew. III. 315. *Arum triphyllum* Linn. Spec. 965. Martius Amoen. Monac. 16. f. 11. — ♃ — *Habitat in umbrosis Americae borealis, a Pensylvania ad Virginiam.*

1675. **Biarum** Schott.

1461. **Biarum tenuifolium** Schott Melet. 17. Blume Rumph. I. 112. *Arum tenüifolium* Linn. Spec. 967. Ker Bot. Reg. t. 512. Sims Bot. Mag. t. 2282. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

1676. **Arum** Linn. Aronswurz.

1462. **Arum vulgare** Lam. Dict. III. 8. Richard in Guillem. Archiv. bot. I. 11. t. 1. Blume Rumph. I. 117. *Arum maculatum* Linn. Spec. 966. — ♃ — *Habitat in humidis umbrosis Europae totius.*
Offic. exolet. Radix Ari s. Aronis.

1463. **Arum italicum** Lam Dict. III. 9. Blume Rumph. I. 118. — ♃ — *Habitat in umbrosis regionis mediterraneae.*

1677. Typhonium Schott.

1464. **Typhonium trilobatum** Schott Melet. 17. Blume Rumphia I. 132. *Arum trilobatum* Linn. Spec. 1369. *Arum orixense* Roxb. ex Andrews Bot. Reposit. t. 356. Bot. Reg. t. 450. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

1465. **Typhonium divaricatum** Blume Rumphia I. 130. *Arum divaricatum* Linn. Spec. 966. *Arum trilobatum* Thunb. Flor. Japon. 234. Bot. Mag. t. 339. 2324. — ♃ — *Habitat in Asia tropica, in Nova Hollandia circa Port Jackson, et in Japonia.*

1678. Sauròmatum Schott.

1466. **Sauromatum pedatum** Schott Melet. 17. Blume Rumph. I. 126. *Arum pedatum* Fischer msc. Link et Otto Plant. select. 19. t. 8. — ♃ — *Habitat ad Caracas.*

1679. Dracunculus Tournef.

1467. **Dracunculus vulgaris** Schott Melet. 17. *Dracunculus polyphyllus* Blume Rumphia I. 124. t. 37. f. 9. *Arum Dracunculus* Linn. Spec. 964. Lam. Ill. t. 740. f. 2. Gärtner Carp. t. 84. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

1680. Pythonium Schott.

1468. **Pythonium bulbiferum** Schott Melet. 18. *Arum bulbiferum* Roxburgh Flor. Ind. III. 510. Bot. Mag. t. 2508. — ♃ — *Habitat in Bengalia, ubi » Umla bela « dicitur.*

1681. Amorphophallus Blum.

1469. **Amorphophallus campanulatus** Blume Rumph. I. 139. t. 32. 33. *Candarum Roxburghii*

et *Candarum Hookeri* Schott Melet. 17. *Arum campanulatum* Roxburgh Plant. Corom. t. 272. Hooker in Bot. Mag t. 2812. excl. synon. — ♃ — *Habitat in Asia tropica.*

1682. **Remusatia** Schott.

1470. **Remusatia vivipàra** Schott Melet. 18. *Arum viviparum* Roxburgh Flor. ind. III. 496. Loddig. Bot. Cab. t. 281. *Caladium viviparum* Nees msc. *Maravara Tsjembo* Rheede Malab. XII. t 9. fide Roxb. — ♃ — *Habitat in Malabaria et Nepalia.*

1683. **Colocasia** Ray.

a. **Eucolocasia** Schott.

1471. **Colocasia antiquorum** Schott Melet. 18. *Arum Colocasia* Linn. Spec. 1368. Willd. Spec. IV. 481. — ♃ — *Habitat in aquosis Aegypti, Syriae et Cretae.*

b. **Allocasia** Schott.

1472. **Colocasia ramosa** Schott Melet. 18. *Arum ramosum* Hort. Angl. Link Enum. II. 394. — ♃ — *Patria ignota.*

1684. **Caladium** Vent.

1473. **Caladium bicolor** Venten. Cels. t. 30. Willdenow Spec. IV. 488. *Arum bicolor* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 316. Jacq. Hort. Schönbr. II. 30. t. 186. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1685. **Peltandra** Raf.

1474. **Peltandra virginica** Rafinesque in Journ. Phys. LXXXIX. 103. *Arum virginicum* Linn. Spec. 1370. *Caladium virginicum* Hooker Exot. Flor. t. 182. *Lecontia virginica* Torrey Comp 358. *Reusselaeria virginica* Beck Bot. 382. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1686. **Xanthosoma** Schott.

1475. **Xanthosoma Jacquini** Schott Melet. 19. *Caladium xanthorhizon* Willdenow Spec. IV. 490. *Arum xanthorhizon* Jacq. Hort. Schönbr. II. 32. t. 188. — ♃ — *Patria?*

1476. **Xanthosoma lividum.** *Caladium livide-vaginatum* Hortor. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1477. **Xanthosoma variegatum** Schott msc. — ♃ — *Patria?*

1687. **Acontias** Schott.

1478. **Acontias helleborifolius** Schott Melet. 19. *Caladium helleborifolium* Venten. ex Willdenow Spec. IV. 487. *Arum helleborifolium* Jacq. Collect. III. 217. Ic. rar. t. 613. — ♃ — *Habitat in sylvis Martinicae et ad Caracas.*

1690. **Philodendron** Schott.

1479. **Philodendron pinnatifidum** Schott Melet. 19. *Caladium pinnatifidum* Willdenow Spec. IV. 488. *Arum pinnatifidum* Jacquin Hort. Schönbr. II. 31. t. 187. — ♃ — *Habitat ad Caracas Americae tropicae.*

1480. **Philodendron crassinervium** Lindley in Bot. Reg. t. 1958. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1692. **Dieffenbachia** Schott.

1481. **Dieffenbachia Seguine** Schott Melet. 20. *Caladium Seguinum* Venten. ex Willd. Spec. IV. 490. Hooker Exot. Flor. t. 1. Curtis Bot. Mag. t. 2606. *Arum Seguinum* Linn. Spec. 1371. Jacq. Amer. 239. t. 151. Miller Ic. t. 295. — ♃ — *Habitat in pratis humidis insularum Caribaearum.*

1693. **Pinellia** Tenore.

1482. **Pinellia tuberifera** Denhardt Hort. Camald. *Hemicarpurus fornicatus* Nees Index Sem.

Hort. Wratislaw. 1839. *Arum fornicatum* Roth Nov. Spec. 362. *Arum ternatum* Thunb. Fl. Jap. 233. *Atherurus ternatus* Blume Rumph. I. 136. — ♃ — *Habitat in Japonia.*

1696. **Richardia** Kunth.

1483. **Richardia aethiopica** Kunth in Mem. Mus. IV. 437. t. 20. *Zantedeschia aethiopica* Sprengel Syst. III. 765. *Calla aethiopica* Linn. Spec. 1373. Gärtner Carp. t. 84. f. 2. Curtis Bot. Mag. t. 832. — ♃ — *Habitat juxta rivulos Capitis bonae spei et insulae St. Helenae.*

Offic. exolet. Radix Ari aethiopici.

B. Callaceae.

1699. **Scindapsus** Schott.

1484. **Scindapsus glaucus** Schott Melet. 21. *Pothos glauca* Wallich Plant. As. rar. II. 45. t. 156. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

1708. **Acorus** Linn. Kalmus.

1485. **Acorus Calamus** Linn. Spec. 462. Schkuhr t. 97. Flor. dan. t. 1158. Hayne Officin. Gew. VI. t. 31. Schultes f. Syst. VI. 173. — ♃ — *Habitat in inundatis uliginosis Europae totius et Sibiriae.*

Offic. Radix Acori v. Calami aromatici.

1486. **Acorus gramineus** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 474. Smith Spicileg. t. 17. Schultes f. Syst. VII. 174. — ♃ — *Habitat in China.*

Ordo XXXIII. Typhaceae.

1709. **Typha** Linn. Kolbenrohr.

1487. **Typha latifolia** Linn. Spec. 1377. Schkuhr t. 271. Koch Synops. 681. — ♃ — *Habitat in aquis stagnantibus et fluviis Europae totius.*

1488. **Typha angustifolia** Linn. Spec. 1377. Flor. dan. t. 815. Koch Synops. 681. — ♃ — *Habitat cum praecedente.*

1489. **Typha minima** Hoppe Plant. exsicc. cent. 3. Koch Synops. 681. *Typha minor* Smith Flor. brit. III. 960. *Typha angustifolia* β. Linn. Spec. 1378. — ♃ — *Habitat in paludosis circa Salisburgum, in Rheno superiori et in lacu Lemano.*

1710. **Sparganium** Linn. Igelkolben.

1490. **Sparganium ramosum** Hudson Flor. angl. 401. Schkuhr Handb t. 282 Koch Synops. 682. *Sparganium erectum* Linn. Spec. 1378. — ♃ — *Habitat in fossis et aquis lente fluentibus Europae totius.*

1491. **Sparganium simplex** Hudson Flor. angl. 401. Schkuhr t. 282. Koch Synops. 682. — ♃ — *Habitat in stagnis et fossis Europae totius.*

Ordo XXXIV. Pandaneae.

1711. **Pandanus** Linn.

1492. **Pandanus utilis** Bory ex Willdenow Enum. 1001. Sprengel Syst. III. 897. — ♄ — *Habitat in insula Mauritii, ubi vulgo » Bacona « dicitur.*

1493. **Pandanus inermis** Roxburgh Flor. ind. III. 744. — ♄ — *Habitat in Amboina.*

1494. **Pandanus reflexus** Loddiges Catalog. ex Sweet Hort. Brit. 478. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

Ordo XXXV. Palmae.

1719. **Chamaedorea** Willd.

1495. **Chamaedorea Schiedeana** Martius in Linnaea V. 204. Palm. 158. t. 138. II. f. 4. 5. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

1747. **Latania** Commers.

1496. **Latania Commersonii** Linn. Syst. ed. 13. p. 1035. Martius Palm. 224. t. 148. f. 4. t. 154. t. 161. f. 2. t. W. *Latania rubra* Jacq. Fragm. 13. t. 8. Willdenow Spec. IV. 878. *Cleophora lontaroides* Gärtner Carp. II. 185. t. 120. f. 1. — 5 — *Habitat in insulis Borboniae et Mauritii.*

1748. **Hyphaene** Gärtn.

1497. **Hyphaene thebaica** Martius Palm. 226. t. 131—133. *Hyphaene crinita* Gärtn. II. 13. t. 82. *Corypha thebaica* Linn. Spec. 1657. *Cucifera thebaica* Delile Aegypt. 57. t. 1. 2. *Douma thebaica* Poiret Suppl. 11. 519. — 5 — *Habitat in Aegypto superiore, Nubia, Arabia, Abyssinia.*

Palma caudice apice dichotomo singularis, in hortis europaeis rarissima, e seminibus a Theodoro Kotschy missis nobis nata est. Aegyptii e trunco rates et varia utensilia fabricant. Fructus crudi Dongolae incolis aliisque Aethiopibus cibo sunt, e coctis sorbilli speciem in Aegypto parant.

1758. **Sabal** Adans.

1498. **Sabal umbraculifera** Martius Palm. 245. t. 130. *Sabal Blackburniana* Kirkland Glazebrook in Loudon Gardn. Magaz. V. 52. f. 10—13. Schultes f. Syst. VII. 1488. *Corypha umbraculifera* Jacq. Fragm. 7. — 5 — *Habitat in St. Domingo, ubi vulgo »Palma de Canna« dicitur, nec non in aliis insulis Caribaeis.*

1499. **Sabal Adansonii** Guernset in Bullet. philomat. Nro. 87. t. 25. Bot. Mag. t. 1434. Martius Palm 246. t. 103 f. 2. t. Y. f. 4. *Sabal minor* Persoon Encheir. I. 399. *Corypha minor* Murray Syst. ed. XIV. p. 984 Jacq. Hort. Vindob. III. 8. t. 8. *Corypha pumila* Walter Carolin. 119. *Chamaerops acaulis* Michaux Flor. Bor. Am. II. 207. *Rhapis acaulis* Willdenow Spec. IV. 1093. — 5 — *Habitat gregaria in depressis arenosis udis maritimis Georgiae et Carolinae.*

1500. **Sabal Palmetto** Loddig. Schultes f.

Syst. VII. 1487. *Chamaerops Palmetto* Michaux Flor. Bor. Am. I. 206. *Corypha Palmetto* Walter Carolin. 119. — 5 — *Habitat in maritimis Carolinae et Floridae.*

1759. Chamaerops Linn.

1501. **Chamaerops humilis** Linn. Spec. 1637. Martius Palm. 248 t. 120. t. 124. f. 2 — 5. t. X. f. 4. *Phoenix humilis* Cavanill. Ic. II. 12. t. 115. — 5 — *Habitat in regione mediterranea.*

1761. Rhapis Linn. Fil.

1502. **Rhapis flabelliformis** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 473 Jacq. Hort. Schönbr. t 316. Bot. Mag. t. 1371. Martius Palm. 253. t. 144. — 5 — *Habitat in insulis Liu-kiu, in Japonia passim culta.*

1763. Phoenix Linn.

1503. **Phoenix dactylifera** Linn. Spec. 1658. Duham. Arbr. IV. 1 t. 1. f. 1 — 3. Gärtner Carp. I. 23. t. 9. f. 2. Martius Palm. 258. t. 120. t. X. f. 1. t. Z. I. f. A. *Phoenix excelsior* Cavanill. Ic. II. 13. — 5 — *Habitat in regione mediterranea.*
Us. Dactyli s. Tragemata.

1765. Bactris Jacq.

1504. **Bactris setosa** Martius Palm. 94. t. 72. f. 1 — 3. — 5 — *Habitat in sylvis udis provinciarum Rio-Janeiro et San Paulo Brasiliae.*

III. CORMOPHYTA ACRAMPHIBRYA.

A. Gymnospermae.

Ordo XXXVI. Cupressinae.

1789. **Juniperus** Linn. Wacholder.

1505. **Juniperus virginiana** Linn. Spec. 1471. Wangenh. Amer. 9. t. 2. f. 51. Willdenow Berlin. Baumz. 157. Spec. IV. 853. Michaux Arbr. III. t. 5. Loudon Arboret. 2495. f. 2357. *Juniperus caroliniana* Miller Dict. n. 4. — Red-Cedar. — ♄ — *Habitat in Virginia et Carolina.*

In hac arbore nascuntur gallae, Cedarappel ab Angloamericanis dictae, quarum vires anthelminthicae multum celebrantur.

1506. **Juniperus communis** Linn. Spec. 1470. Flor. dan. t. 1119. Nees jun. Plant. offic. I. t. 23. Wagner pharm. Bot. 1. t. 92. — Wacholder. Kranawitt. — ♄ — *Habitat in collibus siccis et ad margines sylvarum elatiorum Europae mediae et borealis, nec non Sibiriae.*

Var. β. *Arborea.* — γ. *Suecica* Miller Dict. n. 2.

Officin. Baccae Juniperi. Lignum Juniperi. — Resina Juniperi s. Sandaraca germanica.

1507. **Juniperus nana** Willdenow Berlin. Baumz. 159. Spec. IV. 854 Guimp. Holzart. t. 207. *Juniperus sibirica* Burgsdorf Anleit. 372. — ♄ — *Habitat in alpibus salisburgensibus, styriaceis et in Sibiria.*

1508 **Juniperus recurva** Hamilt. ex Don Prodr. 55. Loudon Arboret. 2504. f. 2371. Pinet. Woburn. 209. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

1509. **Juniperus chinensis** Linn. Mant. 127. Willd. Spec. IV. 851. Loudon Arboret. 2505. f. 2372. 2373. Pinet. Woburn. 208. t. 65. — ♄ — *Habitat in China.*

1510. **Juniperus Bermudiana** Linn. Spec. 1471. Loudon Arboret. 2498. f. 2358. (Hermann Lugd. Bat. t. 347.) — ♄ — *Habitat in insulis Bermudianis.*

1511. **Juniperus Oxycedrus** Linn. Spec. 1470. Willdenow Berlin. Baumz. 160. Duham. Arbr. I. t. 128. — ♄ — *Habitat in lapidosis regionis mediterraneae.*

Galbuli hujus speciei (Κέδρος Hippocrat. Ἄρκευθος μίκρα Diosc.) a veteribus et nunc in Hispania ut baccae Juniperi adhibentur. In Gallia meridionali e ligno destillatione parant oleum foetidissimum (Huile de Cade), a veterinariis usurpatum.

1512. **Juniperus phoenicea** Linn. Spec. 1471. Duham. Arbr. I. t. 52 Pallas Flor. ross. II. t. 57. Willdenow Spec. IV. 855. Loudon Arboret. 2501. f. 2366. — ♄ — *Habitat in Europa australi et Oriente.*

Hic frutex Ἄρκευθος Hippocratis, Κέδρος μίκρα Dioscoridis est.

1513. **Juniperus lycia** Linn. Spec. 1471. Pallas Flor. ross. II. t. 56. Willd. Spec. IV. 855. Loudon Arboret 2502. f. 2368. — ♄ — *Habitat in Gallia meridionali et Sibiria.*

Vix satis a praecedente diversa.

1514. **Juniperus thurifera** Linn. Spec. 1471. Willdenow Spec. IV. 851. Loudon Arboret. 2502. f. 2369. — ♄ — *Habitat in Hispania,*

1515. **Juniperus squamosa** Wallich. *Juniperus squamata* Don Nep. 55. Lambert Pin. ed. 2. n. 66. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

1516. **Juniperus flaccida** Lindl. in Bot. Reg. 1839. n. 103. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

1517. **Juniperus Sabina** Linn. Spec. 1472. Willdenow Berlin. Baumz. 157. Nees jun. Plant. offic. III. t. 21. Wagner pharm. Bot. II. t. 97. — Sadebaum. Sevenbaum. — ♄ — *Habitat in Europa australiore et Oriente.*

Officin. Frondes Sabinae.

1518. **Juniperus prostrata** Michaux in Persoon Synops. II. 632. Spreng. Syst. III. 910. — ♄ — *Habitat ad lacum Huronum.*

1519. **Juniperus davurica** Pallas Flor. Ross. II. 13. t. 54. Ledebour Flor. alt. IV. 299. Loudon Arboret. 2500. f. 2364. 2365. — ♄ — *Habitat in Davuria.*

Hujus fruticis frondibus fumum excitant magi inter populos Asiae borealis celebres, cujus nube mox inebriati futura praecinunt.

1790. **Thuja** Tournef. Lebensbaum.

1520. **Thuja occidentalis** Linn. Spec. 1421. Wangenheim. Amer. 7. t. 2. f. 3. Willdenow Berlin. Baumz. 383. Michaux Arbr. III. t. 3. Richard Conif. t. 7. f. 1. Loudon Arboret. Brit. 2454. f. 2312. 2313. — Der amerikanische Lebensbaum. Arbor vitae. — ♄ — *Habitat in America boreali et Sibiria.*

β. Ovata.

Officin. Ramuli s. folia et lignum Thujae. Oleum Thujae, anthelminthicum.

1521. **Thuja plicata** Don Catalog. Hort. Cantabr. ed. 6. p. 249. Lambert Pin. ed. 2. II. p. 127. — ♄ — *Habitat in Americae boreali-occidentalis Nootka-Sound.*

1522. **Thuja orientalis** Linn. Spec. 1422. Duham. Arbr. II. t. 90. f. 2. Richard Conif. t. 7. f. 2. Loudon Arboret. Brit. 2459. f. 2315. — ♄ — *Habitat in China et Japonia.*

Var. *α Expansa.* — *β. Pyramidalis* Tenore. — *γ. Stricta* Hortor. — *δ. Tatarica* Pinet. Woburn. 197.

1523. **Thuja nepalensis** Loddig. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

1791. **Cupressus** Tournef. Cypresse.

1524. **Cupressus sempervirens** Linn. Spec. 1422. Duham. Arbr. 1. t. 81. — ♄ — *Habitat in regione mediterranea et Oriente.*

Var. *α. Stricta* Miller Dict. n. 2. *C. pyramidalis* Hort.

— β. *Horizontalis* Miller Dict. n. 2. Pinet. Woburn. 185. t. 61. *C. expansa* Hort. Paris.

Officin. Lignum Cupressi. Nuces s. galbuli Cupressus.

1525. **Cupressus Tournefortii** Audib. ex Loud. Arboret. 2480. Pinet. Woburn. 188. — ♄ — *Patria ignota.*

1526. **Cupressus lusitanica** Miller Dict. n. 3. Lambert Pin. ed. 2 121. t. 65. Loudon Arboret. 2477. f. 2328. *Cupressus pendula* Heritier Stirp. 15. t. 8. non Thunb. *Cupressus glauca* Lam. Dict. II. 243. — The Cedar of Goa. — ♄ — *Habitat in India orientali, nunc in Lusitania vulgaris.*

1527. **Cupressus torulosa** Don Nepal. 55. Lambert Pin. ed. 2. II. p. 125. Loudon Arboret. 2478. f. 2329 — 2331. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

1528. **Cupressus thurifera** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 3. Schlechtend. in Linnaea XII. 493. — ♄ — *Habitat in Mexico, ubi » Cedro « dicitur.*

Arbor magnam resinae thurifragae copiam sudat.

1529. **Cupressus expansa** Audibert ex Loudon Arboret. 2480. — ♄ — *Patria?*

1792. Callitris Vent. Sandrakbaum.

1530. **Callitris quadrivalvis** Richard Conif. t. 8. f. 1. Nees jun. Plant. officin. V. t. 4. Loudon Arboret. 2462. f. 2319. *Thuja articulata* Vahl Symb. II. 96. t. 48. Desfont. Flor. atlant. II. 353. t. 252. — ♄ — *Habitat in collibus Barbariae.*

Ex hujus arboris cortice stillat Resina Juniperi sive Sandaraca vera.

1531. **Callitris australis** Sweet Hort. Brit. ed. 2. p. 474. *Cupressus australis* Persoon Encheir. II. 580. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

1793. Widdringtonia Endl.

1532. **Widdringtonia cupressoides** Endl. *Pachylepis cupressoides* Brongniart in Annal. sc. nat. XXX. 190. *Thuja cupressoides* Linn. Mant. 125. Thun-

berg Flor. cap. 600. *Thuja aphylla* Burmann Prodr. 27. *Cupressus juniperoides* Linn. Spec. 1422. — 5 — *Habitat in Capite bonae spei.*

1794. **Taxodium** L. C. Rich. Kammeibe.

1533. **Taxodium distichum** L. C. Richard in Annal. Mus. XVI. 298. Conif. 143. t. 10. Lambert Pin. ed. 2. II. 116. t. 63. *Schubertia disticha* Mirbel in Bullet. soc. philomat. 1813. p. 121. *Cupressus disticha* Linn. Spec. 1422. Michaux Arbr. fr. III. 4. t. 1. *Cupressus americana* Catesby Carol. 1. 11. t. 11. — 5 — *Habitat in America boreali australiore, locis paludosis, in hortis Mexici olim ingentes arbores cultae.*

β. *Pendulum* Hort. Loudon Arboret. 2482.
Decoctum strobilorum diureticum.

Ordo XXXVII. Abietinae.

1795. **Pinus** Linn. Fichte.

α. **Pinus** Tournef. Kiefer.

*Foliis geminis.

1534. **Pinus sylvestris** Linn. Spec. 1418. Lambert pin. ed. 1. t. 1. ed. 2. p. 1. t. 1. Loudon Arboret. Brit. 2153. f. 2043—2044. Antoine Conif. 9. t. 4. f. 3. *Pinus Mughus* Jacq. Ic rar. t. 193. non Scop. — Kiefer. Föhre. — 5 — *Habitat in montanis Europae usque ad 70° L. B., in Asia usque ad 63° L. B. sylvas efformans.*

Var. α. *Vulgaris.* — β. *Borealis.* — γ. *Rigensis.* Vulgo Pin de Russie; Pin de Mâture; Pin de Riga Desfont Arbr. II. 61. (Loudon Arboret. 2157.) — δ *Rubra.* *Pinus rubra* Miller Dict. n. 3. — ε. *Hagenoviensis* (Loudon Arboret. 2157). Vulgo Pin de Hagenow. — ζ *Genevensis* (Loudon Arboret. 2158.) — η. *Scotica* — θ. *Sibirica.* — ι. *Tyrolensis.* — κ. *Mughus.* Jacq. l. c.

Ex hac arbore: Terebinthina communis, pix liquida, pix

communis, resina Pini nativa, fuligo. Turiones Pini olim in officinis usitati.

1535. **Pinus Pumilio** Clusius Panon. 15. Haenke Riesengeb. 68. Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. II. 160. t. 149. Lambert Pin. ed. 1. t. 2. ed. 2. p. 6. t. 2. Pinet Woburn. I. t. 1. Antoine Conif. 14 t. 3. f. 1. *Pinus Mughus* Scopoli Carn. n. 1195. non Jacq. — Krummholz. Knieholz. — ♄ — *Habitat in alpibus, imprimis calcareis Europae mediae et austro-orientalis.*

Var. *α Carpatica.* — *β. Gallica.* — *γ. Pyramidalis* Hort. Vind.

Ex hujus stirpis ramulis Oleum templinum (Krummholzöhl) paratur. Balsamum hungaricum s. carpaticum vere sponte e ramulorum apicibus efluit.

1536. **Pinus uncinata** Ramond in DC. Flor. Fr. III. 726. Antoine Conif. 12. t. 3. f. 3. — ♄ — *Habitat in alpinis et subalpinis, nec non in turfosis planitierum Europae mediae et austro-occidentalis.*

1537. **Pinus Banksiana** Lambert Pin. ed. 2. 7. t. 3. Loudon Arboret. Brit 2190. f. 2064 — 2067. Pinet. Woburn. 13. t. 3. Antoine Conif. 8. t. 4. f. 2. *Pinus rupestris* Michaux Sylv. III. 118. *Pinus hudsonica* Lam. Dict. V. 339. *Pinus sylvestris γ. divaricata* Aiton Hort. kew. ed 1. III. 366. — ♄ — *Habitat in America boreali usque ad 64° L. B.; in Nova Scotia Scrub-Pine, in Canada inferiore Grey-Pine dicta.*

1538. **Pinus Laricio** Poiret Dict. V. 339. Duham. Arbr. ed. nov. t. 71. et 67. f. 2. Lambert. Pin. ed. 2. p. 11. t. 4. Loudon Arboret. Brit. 2200. f. 2081 — 2084. Pinet. Woburn. 23. *Pinus Laricio α. Poiretiana* Antoine Conif. 4. — ♄ — *Habitat in regione mediterranea.*

1539. **Pinus nigricans** Host Flor. austr. II. 628. *Pinus austriaca* Höss Anleit. 6. Monographie der Schwarzföhre. Wien 1831. fol. Loudon Arboret. Brit. 2205. *Pinus Pinaster* Bluff et Fingerh. Comp. II. 540. Rochel Plant. Banat. t. 38. f. 81. non Ait. *Pinus Laricio β. austriaca* Antoine Conif. 4. — ♄ — *Habitat*

in montibus calcareis territorii Vindobonensis, Styriae superioris, Carinthiae, Banatus, Transylvaniae et Galiciae.

1540. **Pinus Pallasiana** Lambert Pin. ed. 1. II. t. 1. ed. 2. t. 5. Loudon Arboret. Brit. 2206. f. 2086—2089. Pinet. Woburn. 21. t. 7. *Pinus Laricio γ. Pallasiana* Antoine Conif. 4. — 5 — *Habitat in montibus cretaceis Tauriae occidentalis.*

Var. β *Brevicona* Hort. Vindob.

1541. **Pinus halepensis** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 367. Lambert Pin. ed. 1. II. t. 11. ed. 2. t. 7. Loudon Arboret. Brit. 2231. f. 2110—2113. Pinet. Woburn. 23. t. 8. Antoine Conif. 2. t. 1. f. 3. *Pinus hierosolymitana* Duhamel Arbr. 2. 126. — 5 — *Habitat in Europae et Asiae mediterraneae littoribus.*

Var. β. *Maritima. Pinus maritima* Lambert Pin. ed. 2. t. 6. — Habitat in Graecia.

1542. **Pinus brutia** Tenore Prodr. Flor. neap. 69. Lambert Pin. III. t. 82. Loudon Arboret. Brit. 2234. f. 2114—2116. Pinet. Woburn. 27. t. 9. Antoine Conif. 1. t. 1. f. 2. — 5 — *Habitat in nemoribus Calabriae occidentalis.*

1543. **Pinus Pinaster** Soland. in Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 367. Lambert Pin. ed. 1. t. 9. ed. 2. t. 45. Loudon Arboret. Brit. 2213. f. 2100. 2101. Pinet. Woburn. 29. Antoine Conif. 18. t. 6. f. 1. — 5 — *Habitat in Europae australis maritimis.*

Var. β. *Lemoniana* Benth. in Transact. Horticult. Soc. N. S. I. 509. t. 20.

Terebinthinam burdigalensem haec species praebet.

1544. **Pinus Pinea** Linn. Spec. 1419. Du-Roi Harbk. ed. Pott. II. 52. Willdenow Berlin. Baumz. 209. Lambert Pin. ed. 1. t. 6—8. ed. 2. t. 10. 11. Loudon Arboret. Brit. 2224. f. 2106—2109. Antoine Conif. 20. t. 3. f. 2. — Pinie. — 5 — *Habitat in Europa et Africa mediterranea.*

Officin. exolet. Nuces Pineae, vulgo Piniolen. Cortex adstringens.

1545. **Pinus inops** Soland. in Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 367. Willdenow Berlin. Baumz. 208. Du-Roi Harbk. ed. Potter. II. 47. Lambert Pin. ed.

1. t. 13. ed. 2. t. 12. Michaux Sylv. III. t. 137. Loudon Arboret. Brit. 2192. f. 2068—2071. Pinet. Woburn. 15. t. 4. Antoine Conif. 17. t. 6. f. 3. *Pinus virginiana* Miller Dict. n. 9. — 5 — *Habitat in America boreali, a Pensylvania ad Virginiam.*

1546. **Pinus resinosa** Soland. in Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 367. Lambert Pin. ed. 1. t. 14. ed. 2. t. 13. Loudon Arboret. Brit. 2210. f. 2094—2097. Pinet. Woburn. 19. t. 6. Antoine Conif. 7. t 4. f. 1. *Pinus rubra* Michaux Sylv. III. 112. — 5 — *Habitat in America boreali.*

** **Foliis ternis.**

1547. **Pinus Taeda** Linn. Spec. 1419. Wangenheim Beitr. 41. Lambert Pin. ed. II. p. 30. t. 15. Pinet. Woburn. 43. t. 14. — 5 — *Habitat in America boreali, vulgo » Frankincence v. Loblolly Pine. «*

1548. **Pinus variabilis** Lambert Pin. ed. II. p. 29. t. 14. Pinet. Woburn. 35. t. 11. *Pinus Taeda γ variabilis* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 368. *Pinus echinata* Miller Dict. n. 12. Wangenheim Beitr. 74. — 5 — *Habitat in America boreali, in arenosis littoris atlantici.*

1549. **Pinus ponderosa** Douglas msc. Loudon Arboret. Brit. 2244. f. 2133. Pinet. Woburn. 44. t. 15. — 5 — *Habitat in America boreali-occidentali.*

1550. **Pinus Sabiniana** Douglas msc. Lambert Pin. ed. II. t. 80. Loudon Arboret. 2246. f. 2138—2143. Pinet. Woburn. 63. t. 24. — 5 — *Habitat in California.*

1551. **Pinus insignis** Douglas msc. Loudon Arboret. Brit. 2265. f. 2171. 2172. Pinet. Woburn. 51. t. 18. — 5 — *Habitat in California.*

1552. **Pinus sinensis** Lambert Pin. ed. 2. t. 29. Loudon Arboret 2264. f. 2167—2169. — 5 — *Habitat in China.*

1553. **Pinus Teocote** Schiede et Deppe in Linnaea V. 76. XII. 487. Lambert Pin. ed. II. p. 37. t. 20. Loudon Arbor. Brit. 2266. f. 2173. 2174. — 5 —

Habitat in descensu montis Orizaba, et prope Real del Monte Mexicanorum. Arbor centumpedalis.

1554. **Pinus patula** Schiede et Deppe in Lambert Pin. ed. II. p. 36. t. 19. Loudōn Arboret. Brit. 2166. f. 2175. 2176. Schlechtend. in Linnaea XII. 489. — 5 — *Arbor excelsa. Habitat in Mexici regione frigida, in Malpays de la Joya, et in Las-Cruces, inter Lerma et Toluca, nec non ad Real del Monte.*

1555. **Pinus Llaveana** Schiede msc. Loudon Arboret. Brit. 2267. f. 2178. excl. strob. Pinet. Woburn. 49. t 17. Schlechtend. in Linnaea XII. 488. — 5 — *Arbor trigintapedalis, inter Zimapan et Real del Oreo Mexicanorum sylvas efformans.*

Fructus Piñones dicti, seminibus edulibus, in foro mexicano venduntur.

1556. **Pinus oocarpa** Schiede in Linnaea XII. 491. *Pinus Ocate* Loudon. — 5 — *Arbor quadragintapedalis, in regione temperata et calida Mexicanorum, inter Aris et montem ignivomum Jorullo, inter Palmas crescens.*

*** Foliis quaternis.

1557. **Pinus Hartwegii** Lindley in Bot. Reg. 1839. Append. 62. — 5 — *Habitat in » Campanario « Mexicanorum, unde semina in Angliam misit Hartweg.*

Arbor quadraginta- v. quinquagintapedalis, ramis strictissimis, Pini palustris ramis similibus. Folia constanter quaterna, primaria membranacea, elongata, scariosa, secundaria angustissima, sexpollicaria. Strobili aggregati, penduli, quatuor circiter pollices longi, diametro bipollicari, oblongi, utrinque obtusi, griseo-fusci, squamis apice transversis, medio depressis, umbonatis, ecarinatis, umbone recto, rotundato. Semina subrotunda, cuneata, ala testacea quadruplo breviora.

**** Foliis quinis.

1558. **Pinus Cembra** Linn. Spec. 1419. Pallas Flor. ross. I. t. 2. Willdenow Berlin. Baumz. 212. Lambert Pin. ed. 2. p. 48. t. 30. 31. Pinet. Woburn. 50. — 5 — *Habitat in subalpinis Europae australioris usque 48° L. B. et in Sibiria.*

Var. β. *Sibirica* Loudon Arboret. 2276.

Officin. exolet. Nuclei Cembrae (vulgo Zirbelnüsse v. Arveln).

1559. **Pinus Strobus** Linn. Spec. 1419. Wangenheim Beitr. I. t. 1. f. 1. Lambert Conif. 51. t. 32. Pinet. Woburn. 51. — ♄ — *Habitat in America boreali, vulgo » Weymouthskiefer «, a domino Weymouth, qui primus in Comitatu Wiltshire Angliae, circa a. 1705. sylvulam hujus arboris plantavit.*

Var. β *Brevifolia* Hortor. Loudon Arboret. 2280.

1560. **Pinus excelsa** Wallich msc. Lambert Pin. ed 2. p. 55. t. 33. Pinet. Woburn. 52. Loudon Arboret Brit. 2285. f. 2197—2202. — ♄ — *Arbor nonaginta- et centumviginti pedalis, in alpibus Nepaliae indigena, ubi » Deeoshera, Deoologhosee «, a Parbatinis » Dhoop «, hindostanice vero » Raesula «, quod » regem Pinuum « denotat, dicitur.*

1561. **Pinus Lambertiana** Douglas in Linn. Transact. XVI. 500. Lambert Pin. ed. 2. p. 57. t. 34. Loudon Arboret. Brit. 2288. f. 2204—2207. — ♄ — *Arbor centum quinquaginta ad ducentenos pedes alta, in America boreali-occidentali inter 43° et 40° L. B. sparsim crescens, Umptquaensibus autochtonis Nát-cleh dicta. Resina copiose effluens siccata dulcis, saccharina. Semina edulia.*

1562. **Pinus Pseudostrobus** Lindley in Bot. Reg. Append. 1839. n. 99. — ♄ — *Habitat in Auganguco Mexicanorum, octingentorum hexapodum supra mare elevatione. Semina in Angliam misit Hartweg.*

Facies Pini Strobi. Folia quina, tenuissima, glaucescentia. Strobili verticillati, horizontales, ovati, quatuor circiter pollices longi, medio diametro sesquipollicari, squamis apice rhomboideis, pyramidatis, erectis, rectiusculis, linea elevata, transversa. Semina ovalia, ala nigrescente quadruplo v. quintuplo breviora.

1563. **Pinus leiophylla** Schiede et Deppe msc. Lambert Pin. ed. 2. p. 38. t. 21. — ♄ — *Habitat in regione frigida Mexici, inter Cruz blanca et Jalacinga.*

1564. **Pinus Montezumae** Don in Lambert Pin. ed. 2. t. 22. — ♄ — *Habitat in Orizaba, aliisque montibus Mexici.*

1565. **Pinus Devoniana** Lindley in Bot Reg. 1839. Append. n. 96. — 5 — *Habitat in monte Ocotillo, inter Real del Monte et Regla Mexicanorum, ubi »Pino blanco« et »Pino real« dicitur.*

Arbor sexaginta- et octogintapedalis, ramis crassissimis, junioribus pollicaribus, iisdem Pinus palustris similibus. Folia quina, longissima. Strobili solitarii, penduli, coniformes, obtusi, novem v. decem pollices longi, e baseos diametro tripollicari in apicem sesquipollicarem attenuati, squamis apice rotundatis, rhomboideis, linea transversa, paullo elevata, opacis, griseis, medio abrupte umbonatis, obtusis, laevigatis. Semina obovata, ala nigricante quintuplo breviora.

1566. **Pinus Russeliana** Lindley in Bot. Reg. 1839. Append. n. 97. — 5 — *Habitat in Mexico, in via a San Pedro ad San Pablo, prope Real del Monte.*

Arbor praecedenti similis, foliis longissimis. Strobili septem v. octo pollices longi, elongati, horizontales, subcernui, verticillati, subsessiles, squamis apice rhomboideis, pyramidatis, rectis, obtusis. Semina oblonga, ala nigricante quadruplo breviora.

1567. **Pinus macrophylla** Lindley in Bot. Reg. Append. 1839. n. 98. — 5 — *Habitat in monte Ocotillo Mexicanorum, unde Hartwegius semina in Angliam misit.*

Arbor mediocris. Folia quina, longissima (14—15pollicaria). Strobili solitarii, recti, horizontales, ovati, elongati, sex v. septem pollices longi, e baseos diametro sex- v. septempollicari sensim in apicem obtusum attenuati, squamis apice transversis, rhomboideis, uncinatis. Semina subrhomboidea, rugosa, ala testacea quadruplo breviora.

1568. **Pinus apulcensis** Lindley in Bot. Reg. Append. 1839. n. 100. — 5 — *Habitat prope Apulco Mexicanorum, unde semina in Angliam misit Hartweg.*

Arbor quinquagintapedalis, ramis foliisque quinis, tenuibus, abbreviatis (sexpollicaribus), glaucis. Strobili verticillati, penduli, ovati, acuti, quatuor pollices longi, squamis rhomboideis, pyramidatis, rectis, nunc elongatis, medio constrictis. Semina ovalia, ala lineari quadruplo breviora.

1569. **Pinus filifolia** Lindley in Bot. Reg. 1840. Append n. 132. — 5 — *Habitat in monte ignivomo (Volcan del Fuego) Guatimalae, unde semina misit Hartweg.*

Rami rigidi, crassi. Gemmae squamis linearibus acuminatissimis, longissime ciliatis. Folia quinata, sesquipedalia! acute tri-

quetra, vaginis longis, glabris, persistentibus. Strobili conici, elongati (7—8 unciales), obtusi, squamarum apicibus rhombeis, depresso-pyramidatis, apice callosis, obtusis.

b. Abies Tournef. Fichte.

1570. **Pinus Abies** Linn. Spec. 1421. Flor. dan. t. 193. Willdenow Berlin. Baumz. 221. Lambert Pin. ed. 1. t. 25. ed. 2. p. 59. t. 35. *Pinus picea* Du-Roi Harbk. ed. Potter II. 156. *Abies picea* Miller Dict. n. 2. *Abies excelsa* Lam. Fl. fr. II. 202. Pinet. Woburn. 90. *Picea vulgaris* Link Handb. II. 478. Fichte. Rothtanne. — 5 — *Habitat in Europae et Asiae borealis sylvis humidiusculis, subalpinis.*

Variet. α. *Pendula* Loddig. Cat. 1836. Loudon Arboret. 2294. — β. *Viminalis.* — γ. *Clanbrassiliana* Hort. Angl. Link Enum. II. 409.

Officin. exoleta. Turiones Abietis. Thus v. Olibanum sylvestre.

1571. **Pinus alba** Soland. in Aiton Hort. kew. ed. 1 III. 371. Willdenow Berlin. Baumz. 221. Lambert Pin. ed. 2. p 61. t. 36. *Pinus laxa* Ehrhart Beitr. III. 24. *Pinus canadensis* Du-Roi Harbk. 124. Wangenh. Beitr. V. t. 1. f. 2. *Abies canadensis* Miller Dict. n. 4. *Abies alba* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 207. Loudon Arboret. Brit. 2310. f. 2224. Pinet. Woburn. 95. t. 33. — 5 — *Habitat in America boreali, a 43° L. B. usque ad mare glaciale, sub 67° L. B. arbor vigintipedalis.*

Arbor Americanis Terebinthinam, turiones potum Cerevisiae similem, vulgo »Spruce beer«, nec non remedium antiscorbuticum, vulgo »Essence of Spruce« largiuntur.

1572. **Pinus nigra** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 370. Willdenow Berlin. Baumz. 220. Lambert Pin. ed. 2. p. 64. t. 37. *Pinus mariana* Ehrhart Beitr. III. 23. *Abies mariana* Wangenheim Beitr. 75. *Abies denticulata* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 206. *Abies nigra* Loudon Arboret. Brit. 2312. f. 2225. Pinet. Woburn. 97. t. 34. — 5 — *Habitat in Nova Anglia, Canada, et Nova Scotia usque ad 65° L. B.*

Radices longae, tenues, vulgo »Watapeh« dictae, magni apud Americanos in consuendis e cortice betulino naviculis usus.

1573. **Pinus rubra** Lambert Pin. ed. 1. t. 28. ed. 2. p. 66. t. 38. Newfoundland red spruce Fir Potter in Du-Roi Harbk. II. 182. *Abies rubra* Loudon Arboret. Brit. 2316. f. 2228. Pinet. Woburn. 101. t. 35. — ♄ — *Habitat in Nova Scotia.*

1574. **Pinus Smithiana** Wallich Plant. As. rar. III. 24. t. 246. *Pinus Khutrow* Royle Himalay. 353. t. 84. f. 1. *Pinus Morinda* Hort. Angl. *Abies Smithiana* Pinet. Woburn. 103. t. 36. — ♄ — *Habitat in montibus Himalaya, 5000—10000 pedum elevatione.*

1575. **Pinus canadensis** Linn. Spec. 1421. Du-Roi Harbk. ed. Pott. II. 151. Lambert Pin. ed. 1. t. 32. ed. 2. p. 79. t. 45. *Abies canadensis* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 206. Loudon Arboret. Brit. 2322. Pinet. Woburn. 129. — Die Schierlings-Tanne. — ♄ — *Habitat in Canada.*

1576. **Pinus cephalonica.** *Abies cephalonica* Loudon Gardn. Magaz. N. S. IV. 81. Arboret. Brit. 2325. f. 2235. 2236. Pinet. Woburn. 119. t. 42. *Abies taxifolia* Hort. *Abies luscombeana* Hort. — ♄ — *Habitat in Cephalonia.*

c. Picea. Tanne.

1577. **Pinus Picea** Linn. Spec. 1420. Willdenow Berl. Baumz. 217. Lambert Pin. ed. 1. t. 10. ed. 2. p. 70. t. 40. *Pinus Abies* Du Roi Harbk. ed. Potter II. 133. Reitter et Abel Abbild. t. 98. *Abies alba* Miller Dict. n. 1. *Abies pectinata* DC. Fl. fr. III. 275. *Picea pectinata* Loudon Arboret. Brit. 2338. — Tanne. Weifstanne. Edeltanne. — ♄ — *Habitat in montibus Europae mediae.*

Ex hac specie Terebinthina argentoratensis coquitur.

1578. **Pinus Pichta** Fischer msc. *Abies Pichta* Pinet. Woburn. 115. t. 39. *Picea Pichta* Loudon Arboret. Brit. 2338. *Abies sibirica* Ledebour Ic. t. 500. — ♄ — *Habitat in Altai.*

1579. **Pinus balsamea** Linn. Spec. 1421. Willdenow Berlin. Baumz. 218. Lambert Pin. ed. 1. t. 31. ed. 2. p. 72. t. 41. *Abies balsamea* Miller Dict.

n. 3. Pinet Woburn. 109. t. 37. *Abies balsamifera* Michaux Flor. Bor. amer. II. 206 *Picea balsamea* Loudon Arboret. Brit. 2339. — ♄ — *Habitat in montibus Americae borealis, a Virginia ad Canadam.*

Hujus arboris Terebinthina praestantissima »Balsamum canadense.«

1580. **Pinus Fraseri** Pursh Flor. Bor. Amer. II. 639. Lambert Pin. ed. 2. p. 74. t. 42. *Abies Fraseri* Lindl. in Penny Cyclop. n. 5. Pinet. Woburn. 111. t. 38. *Picea Fraseri* Loudon Arboret. Brit. 2340. f. 2244. — ♄ — *Habitat in Pensylvaniae et Carolinae montibus celsioribus.*

1581. **Pinus religiosa** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. II. 5. Lambert Pin. ed. 2. p. 76. t. 43. Schiede et Deppe in Linnaea V. 77. *Abies religiosa* Lindley in Penny Cyclop. *Picea religiosa* Loudon Arboret. Brit. 2349. f. 2257. — ♄ — *Habitat in montibus Mexici.*

1582. **Pinus Webbiana** Wallich msc. Lambert Pin. ed. 2. t. 44. *Pinus spectabilis* Lambert Pin. ed. 1. II. 3. t. 2. *Abies Webbiana* Lindley in Penny Cyclop. Pinet. Woburn. 117. t. 41. *Picea Webbiana* Loudon Arboret. Brit. 2344. f. 2251. 2252. — ♄ — *Habitat in alpibus nepalensibus Gossaingsthan, et in aliis Himalayae jugis, arbor nonagintapedalis, vulgo »Oremour« dicta.*

d. **Larix** Tournef. Lärche.

1583. **Pinus Larix** Linn. Spec. 1420. Pallas Flor. ross. I. 1. t. 1. Lambert Pin. ed. 2. 83. t. 48. *Abies Larix* Poiret Dict. t. 785. f. 2. *Larix europaea* DC. Fl. fr. III. 277. Loudon Arboret. Brit. 2350. f. 2358. Pinet. Woburn. 133. — Der Lärbaum. Lärchenbaum. — ♄ — *Habitat in subalpinis Europae australioris et Sibiriae.*

Var. α. *Alba.* — β. *Rubra.*

Haec arbor nutrit Polyporum officinalem Fr., largitur Terebinthinam venetam, Mannam laricinam s. brigantinam, et lignum larignum praestantissimum. Igne in Sibiria adusta sudat Gummi uralense s. orenburgense.

1584. **Pinus pendula** Soland. in Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 369. Willdenow Berlin. Baumz. 215. Lambert Pin. ed. 1. t. 36. ed. 2. p. 86. t. 49. *Pinus intermedia* Du-Roi Harbk. ed. Potter II. 115. *Larix pendula* Salisbury Prodr. Pinet. Woburn. 137. t. 46 — 5 — *Habitat in Americae borealis montibus a 45° L. B.*

1585. **Pinus microcarpa** Lambert Pin. ed. 1. t. 37. ed. 2. p. 88. t. 50. *Pinus laricina* Du-Roi Harbk. ed. Potter II. 117. *Larix tenuifolia* Salisbury Prodr. *Larix microcarpa* Pinet. Woburn. 139. t. 47. *Larix americana* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 203. — 5 — *Habitat in America boreali a Pensylvania ad sinum Hudsonis, Canadensibus Gallis vulgo »Epinette rouge.«*

Terebinthinam largitur praestantissimam. Cortex diureticus.

e. **Cedrus** Tournef. Ceder.

1586. **Pinus Cedrus** Linn. Spec. 1460. Willdenow Berl. Baumz. 214. Du-Roi Harbk. ed. Pott. II. 120. Lambert Pin. ed. 1. t. 37. ed. 2. p. 89. t. 51. L. C. Richard Conif. t. 14. f. 1. et t. 17. f. 1. *Larix Cedrus* Miller Dict. n. 3. Duham. Arbr. 1. 332. t. 132. *Cedrus Libani* Barrel. Ic. 499. Loudon Arboret. Brit. 2042. f. 2267. 2268. Pinet. Woburn. 145. — Die Ceder vom Libanon. — 5 — *Habitat in Syriae, Libani, Tauri et Amanae montibus.*

Officinalia exoleta. Lignum Cedri. Resina Cedri s. Cedria. Oleum Cedri s. Cedrium. Manna cedrina (Μελιχέδρινον Hippocrat.).

1587. **Pinus Deodara** Roxburgh Flor. ind. III. 651. Lambert Pin. ed. 2. p. 93. t. 52. *Cedrus Deodara* Loudon Arboret. Brit. 2428. f. 2283. Pinet. Woburn. 149. t. 48. 49. — Die indische Ceder. — 5 — *Habitat in alpibus Nepalensibus et Tubetanis, »Deodar« quod »arborem deum« significat, dicta.*

Oleum Deodarae s. Devadarae, in exanthematibus cutaneis salubre praedicant Indi.

1796. **Cunninghamia** R. Br.

1588. **Cunninghamia lanceolata** R. Brown msc. Hooker Bot. Mag. t. 2743. *Cunninghamia sinensis* Richard Conif. 149. t. 18. Lambert Pin. ed. 2. p. 96. t 53. Pinet. Woburn. 167. t. 57. *Belis jaculifolia* Salisbury in Linn. Transact. VIII 316. *Pinus lanceolata* Lambert Pin. ed. 1. t. 34. *Araucaria lanceolata* Hort. — 5 — *Habitat in China.*

1797. **Araucaria** Juss. Araucarie.

1589. **Araucaria imbricata** Pavon in Mem. Academ. med. Madrit. I. 197. Lambert Pin. ed. 2. II. p. 106. t. 56. 57. Pinet. Woburn. 163. t. 55. 56. *Araucaria Dombeya* Richard Conif. 86. *Dombeya chilensis* Lam. Dict. II. 301. *Colymbea quadrifaria* Salisb. in Linn. Transact. VIII. 315. *Pinus araucana* Molina Sagg. 182. — 5 — *Habitat in Cordilleris reipublicae chilensis, inter 37° — 48° L. A., sylvas vastas (Pinares) efformans.*

Seminibus integrae Chilenum gentes victitant.

1590. **Araucaria brasiliana** Lambert Pin. ed. 2. II. p. 106. t. 58 — 60. Loudon Arboret. Brit. 2439. f. 2294. Pinet. Woburn. 161. t. 53. 54. — 5 — *Habitat in Brasiliae nemoribus montanis Serra d'Orgaos, provinciae Sebastianopolitanae, et Minarum generalium, inter 15° et 25° L. A.*

Semina esculenta.

1797. **Eutacta** Salisb. Säulentanne.

1591. **Eutacta excelsa.** *Eutassa heterophylla* Salisbury in Linn. Transact. VIII. 316. *Araucaria excelsa* R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 412. Lambert Pin. ed. 2. II. 112. t. 61. 62. Loudon Arboret. Brit. 2440. f. 2297. Pinet. Woburn. 153. t. 50. 51. *Dombeya excelsa* Lambert. Pin. ed. 1. p. 179. t. 39. 40. *Colymbea excelsa* Sprengel Cur. post. 315. *Al-*

tingia excelsa Loudon Hort. Brit. 403. — 5 — *Habitat in insula Norfolk.*

1592. **Eutacta Cunninghamii.** *Araucaria Cunninghamii* Aiton msc. Lambert Pin. ed. 2. II. 15. *A. Cunningh.* Ibid. p. 137. Pinet. Woburn. 157. t. 52. *Altingia Cunninghamii* Loudon Hort. Brit. 403. — 5 — *Habitat in Novae Hollandiae ora orientali, inter 14° — 30° L. A.*

Ordo XXXVIII. Taxineae.

1799. Taxus Tournef. Eibenbaum.

1593. **Taxus baccata** Linn. Spec. 1472. Schkuhr Handb. t. 339 Richard Conif. t. 2. f. 1. Nees jun. Plant. offic. III. t. 38. Σμίλαξ Dioscorid. IV. 80. — 5 — *Habitat in Europa australiore et Sibiria.*

Officin. Baccae, lignum, folia s. summitates Taxi.

1800. Podocarpus Herit. Stieleibe.

1594. **Podocarpus elongata** Heritier msc. Persoon Encheir. II. 580. Willd. Enum. 991. *Taxus elongata* Thunb. Prodr. 117. — 5 — *Habitat in Capite bonae spei.*

1595. **Podocarpus macrophylla** Lambert Pin. ed. 2. II. 143. *Taxus macrophylla* Thunberg Flor. japon. 276. *Sin-* vulgo *Maki* s. *Fon Maki* Kaempfer Amoen. exot. V. 780. Banks Ic. Kämpf. t. 24. — 5 — *Habitat in Japonia.*

Usus ligni in Japonia, qualis nobis Taxus baccatae.

1803. Salisburia Smith. Gingko.

1596. **Salisburia adiantifolia** Smith in Linn. Transact. III. 330. Willdenow Spec. IV. 472. Jacquin f. Ueber den Ginkgo in Medic. Jahrb. des österr. Staates. 1819. c. ic. Richard Conif. t. 3. Loudon Arboret. Brit. 2094. f. 1992. 1993. *Ginkgo biloba* Linn. Mant. 313 Gouan Descript. du Ginkgo Montp. 1812. 8.

Gink-go, Gin-an s. *Itsjo* Kaempfer Amoen. exot. 811. c. ic. — ♂ et ♀ — ♄ — *Habitat in China, apud Japones passim culta.*

Ordo XXXIX. Gnetaceae.

1804. **Ephedra** Linn. Meerträubel.

1597. **Ephedra distachya** Linn. Spec. 1472. Schkuhr t. 339. *Ephedra vulgaris* Richard Conif. t. 4. f. 1. *Ephedra minor* Host Flor. austr. II. 671. Τραγος Dioscorid. IV. 51. — ♄ — *Habitat in apricis rupestribus Europae australis.*

Officin. Amenta Uvae marinae.

1598. **Ephedra major** Host Flor. austr. II. II. 671. — ♄ — *Habitat in Dalmatia.*

1599. **Ephedra altissima** Desfont. Flor. atlant. II. 371. t. 253. — ♄ — *Habitat in arvis Barbariae.*

B. Apetalae.

Ordo XL. Piperaceae.

1820. **Piper** Linn. Pfefferstrauch.

a. **Peperi** Endl.

1600. **Piper nigrum** Linn. Spec. 40. Blume in Verhandl. Batav. Genotscap. XI. 191. f. 17. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

b. **Pothemorphe** Miq.

1601. **Piper sidaefolium** Link et Otto Abbild. t. 6. *Piper umbellatum* Jacq. Ic. rar. II. t. 216. non Linn. *Piper peltatum* Ruiz et Pav. Flor. Peruv. t. 59. *Pothomorphe sidaefolia* Miquel Comment. II. 36. *Heckeria sidaefolia* Kunth in Linnaea XIII. 569. *Peperomia sidaefolia* Dietrich Spec. pl. I. 141. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

c. Artanthe Endl.

1602. **Piper prunifolium** Jacq. f. Eclog. 140. t. 94. — ♄ — *Habitat in Carracas.*

d. Steffensia Kunth.

1603. **Piper aduncum** Linn. Spec. 41. Jacq. Ic. rar. II. t. 210. *Steffensia adunca* Kunth in Linnaea XIII. 634. *Artanthe adunca* Miquel Comment. II. 49. — ♄ — *Habitat in India occidentali.*

1604. **Piper flexuosum** Willdenow Enum. Suppl. 3. Jacq. f. Eclog. 139. t. 93. *Piper Jacquinianum* Schultes Mant. I. 234. *Steffensia flexuosa* Kunth in Linnaea XIII. 644. — ♄ — *Habitat in Carracas.*

e. Micropiper Miq.

1605. **Piper pellucidum** Linn. Hort. Cliff. 6. t. 4. Jacq. Observ. I. 16. *Peperomia pellucida* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. I. 64. *Micropiper pellucidum* Miquel Comment. II. 55. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1606 **Piper blandum** Jacq. Collect. III. 210. Ic. rar. II. t. 218. *Peperomia blanda* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. I. 67. Hooker Exot. Flor. t. 21. *Micropiper blandum* Miquel Comment. II. 54. — ♃ — *Habitat ad Caracas.*

1607. **Piper pulchellum** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 50. *Peperomia pulchella* Dietrich Spec. pl. I. 177. — ♃ — *Habitat in Jamaica.*

1608. **Piper rubricaule** Nees Hor. phys. berolin. 48. t. 8. *Peperomia rubricaulis* Dietrich Spec. pl. I. 182. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

f. Peperomia Miq.

1609. **Piper amplexifolium** Link Enum. I. 39. *Peperomia talinifolia* Link Jahrb. I. 3. p. 64. non Kunth. *Peperomia amplexifolia* Dietrich Spec. plant. I. 145. — ♃ — *Habitat in Jamaica.*

1610. **Piper magnoliaefolium** Jacq. Collect. III. 210. Ic. rar. II. t. 213. *Peperomia magnoliae-*

folia Dietrich Spec. plant. I. 153. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1611. **Piper polystachyum** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 50. *Piper obtusifolium* Jacq. Collect. I. 141. Ic. rar. I. t. 9. *Peperomia polystachya* Hook. Exot. Flor. t. 23. — ♃ — *Habitat in Jamaica et St. Crux.*

1612. **Piper pereskiaefolium** Jacq. Collect. IV. 126. Ic. rar. II. t. 212. *Peperomia pereskiaefolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. I. 68. Hooker Exot. Flor. t. 67. — ♃ — *Habitat ad Caracas.*

1613. **Piper inaequalifolium** Vahl Enum. I. 355. *Peperomia inaequalifolia* Ruiz et Pavon Flor. Peruv. t. 46. f. a. *Piper aromaticum* Willdenow Enum. Suppl. 3. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

1614. **Piper Guildingianum** Spreng. Cur. post. 20. *Peperomia Guildingiana* Dietrich Spec. I. 162. *Peperomia reniformis* Hook. Exot. Flor. t. 164. — ♃ — *Habitat in insula St. Vincentii.*

1615. **Piper maculosum** Linn. Spec. 42. *Peperomia maculosa* Hook. Exot. Flor. t. 92. — ♃ — *Habitat in St. Domingo.*

1616. **Piper asarifolium.** *Peperomia asarifolia* Schlechtend. in Linnaea V. 75. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

1823. **Ottonia** Spreng. Jaborandistrauch.

* **Enckea** Kunth.

1617. **Ottonia glaucescens** Endl. *Enckea glaucescens* Kunth in Linnaea XIII. 593. *Piper glaucescens* Jacq. f. Eclog. 112. t. 76. — ♄ — *Patria ignota.*

1618. **Ottonia plantaginea** Endl. *Enckea plantaginea* Kunth in Linnaea XIII. 590. *Piper plantagineum* Lam. Illustr. I. 80. *Piper medium* Jacq. Collect. I. 141. Ic. rar. I. t. 8. — ♃ — *Habitat in Antillis et Mexico.*

Ordo XLI. Saurureae.

1824. **Saururus** Linn. Echsenpfeffer.

1619. **Saururus cernuus** Linn. Spec. 489. Schkuhr t. 103. — ♃ — *Habitat in paludosis Americae borealis.*

1620. **Saururus lucidus** Donn Catalog. hort. Cantabrig. 1804. p. 66. Jacq. f. Eclog. I. 29. t. 18. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1825. **Houttuynia** Thunb. Krötenpfeffer.

1621. **Houttuynia cordata** Thunberg Flor. Jap. 234. t. 26. Wallich in Roxburgh Flor. ind. I. 78. Hooker in Bot. Mag. t. 2731. *Polypara cochinchinensis* Loureiro Flor. cochinch. 78. — ♃ — *Habitat in Asia tropica et Japonia.*

1825. **Anemopsis** Nutt.

1622. **Anemopsis californica** Hooker in Annal. of nat. hist. I. 136. *Anemia californica* Nuttall l. c. — ♃ — *Habitat in paludosis Californiae superioris, circa St. Barbara et St. Diego.*

1827. **Aponogeton** Thunb.

1623. **Aponogeton distachys** Linn. Suppl. 215. Thunberg Nov. gen. IV. 74. c. ic. Andrews Bot. Reposit. t. 290. Sims Bot. Mag. t. 1292. Reichenb. Hort. Bot. t. 13. Schultes f. Syst. VII. 1592. — ♃ — *Habitat in rivulis Capitis bonae spei.*

Ordo XLII. Casuarineae.

1838. **Casuarina** Rumph. Keulenbaum.

1624. **Casuarina equisetifolia** Forster Prodr. 334. Aiton Hort. kew. III. 320. Willdenow

Spec. IV. 190. Loddig. Bot. Cab. t. 607. — ♄ — *Habitat in India orientali et Nova Caledonia.*

Cortex adstringens.

1625. **Casuarina quadrivalvis** Labillard. Nov. Holl. II. 67. t. 218. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

1626. **Casuarina stricta** Aiton Hort. kew. III. 320. Willdenow Spec. IV. 190. Andrews Bot. Reposit. t. 346. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

1627. **Casuarina muricata** Roxburgh Flor. Ind. orient. III. 519. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1628. **Casuarina torulosa** Aiton Hort. kew. III. 320. Willdenow Spec. IV. 191. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

1629. **Casuarina repens** Sieber msc. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

Ordo XLIII. Myriceae.

1839. Myrica Linn. Gagelbaum.

a. Gale Tournef.

1630. **Myrica Gale** Linn. Spec. 1453. Flor. dan. t. 327. Willd. Spec. IV. 745. — ♄ — *Habitat in Europae et Americae septemtrionalis uliginosis.*

Offic. exolet. Folia Myrti brabantici.

1631. **Myrica cerifera** Linn. Spec. 1453. Willd. Spec. IV. 745. — ♄ — *Habitat in Americae borealis sylvis.*

Radix emetica.

1632. **Myrica Faya** Aiton Hort. kew. III. 397. Willd. Spec. IV. 747. — ♄ — *Habitat in Lusitania, Madera et Azoris.*

1633. **Myrica segregata** Jacq. Collect. II. 273. Ic. rar. III. t. 625. Willdenow Spec. IV. 747. — ♀ — *Habitat in America calidiore.*

1634. **Myrica serrata** Lam. Dict. II. 587.

Willdenow Spec. IV. 747. *Myrica banksiaefolia* Hort. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1635. **Myrica laciniata** Willdenow Enum. 1012. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1636. **Myrica cordifolia** Linn. Spec. 1454. Willdenow Spec. IV. 748. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Comptonia** Banks.

1637. **Myrica asplenifolia** Blume Flor. Jav. Myric. p. 5. *Comptonia asplenifolia* Banks in Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 334. Willdenow Spec. IV. 320. *Liquidambar asplenifolium* Linn. Spec. 1418. — ♄ — *Habitat in America boreali, a Nova-Anglia ad Virginiam, et in montibus altioribus Carolinae.*

Offic. Decoctum ramulorum adversus Diarrhoeam.

Ordo XLIV. Betulaceae.

1840. **Betula** Tournef. Birke.

1638. **Betula alba** Linn. Spec. 1393. Spach in Nouv. Annal. sc. nat. XIV. 186. — ♄ — *Habitat in Europa et in America boreali.*

A. *Vulgaris. Betula alba* Auct.

α. *Pendula* Roth Flor. germ. 1. 405. — β. *Nutans* Hort. Vindob.

B. *Populifolia. Betula populifolia* Ait. Hort. kew. III. 336. — *Habitat in America boreali.*

C. *Dalecarlica. Betula dalecarlica* Linn. f. Suppl. 416.

D. *Pubescens. Betula pubescens* Ehrh. Beitr. VI. 98.

β. *Carpathica* Willd. Spec. IV. 464. — γ. *Pontica* Desf. Hort. paris. — δ. *Daurica* Hort. non Pall.

E. *Urticaefolia. Betula urticaefolia* Loddig. Cat. 1836.

F. *Papyrifera. Betula papyrifera* Michx. Arbr. II. t. 1. *Betula papyracea* Aiton Hort. kew. III. 337. — *Habitat in America boreali.*

β. *Undulata* Hort. Vindob. — γ. *Grandis* Schrader Ind. sem. Hort. Götting. 1833. p. 2.

Offic. exolet. Oleum moscoviticum. Succus Betulae.

1639. **Betula excelsa** Aiton Hort. kew. III. 337. Watson Dendrolog. Brit. t. 95. — 5 — *Habitat in America boreali.*

1640. **Betula humilis** Schrank Flor. Bav. 1. 420. *Betula fruticosa* Auct. non Pall. — ♄ — *Habitat in turfosis Europae mediae et borealis.*

β. *Oycoviensis* Besser Flor. galic. 289. *B. Sokolowii* Jacq. f. msc. — ♄ — *Habitat in Ukraina.*

1641. **Betula nana** Linn. Spec. 1394. Flor. dan. t. 91. — ♄ — *Habitat in spongiosis montanis et subalpinis Europae.*

β. *Major* Hort. Vindob. — γ. *Stricta* Loddig. Catalog. 1836.

1841. Alnus Tournef. Erle.

a. Alnobetula Koch.

1642. **Alnus viridis** DC. Flor. fr. III. 304. Loddig. Bot. Cab. t. 1141. *Alnus fruticosa* Schmidt österr. Baumz. III. t. 189. *Betula ovata* Schrank Flor. Bavar. 1. 419. *Betula alnobetula* Ehrhart Beitr. II. 72. *Betula viridis* Chaix in Villars Delph. III. 789. *Alnaster viridis* Spach in Nouv. Annal. sc. nat. XV. 201. — ♄ — *Habitat in subalpinis et alpinis Europae, in graniticis frequens.*

b. Alni verae.

1643. **Alnus serrulata** Willd. Spec. IV. 336. Spach in Nouv. Annal. sc. nat. XV. 205. — 5 — *Habitat in America boreali.*

β. *Alnus latifolia* Desf. Cat. hort. Paris. ed. 3. p. 352. *Alnus rubra* Desf. msc.

1644. **Alnus incana** Willd. Spec. IV. 335. *Betula Alnus incana* Linn. Spec. 1394. — 5 — *Habitat in Europae mediae et orientalis montibus, cum fluviis in planitiem descendens.*

1645. **Alnus glutinosa** Gärtner Carp. II. 54. t. 90. Spach in Nouv. Annal. sc. nat. XV. 207. *Betula Alnus α. glutinosa* Linn. Spec. 1394. — 5 — *Habitat in paludosis et ad fluviorum ripas Europae totius.*

A. *Vulgaris* Spach l. c.

B. *Acutifolia* Spach l. c. — α. *Alnus oblongata* Willd. Spec. IV. 335. *Habitat in Europa orientali.* — β. *Alnus intermedia* Schrader Index Sem. hort. Götting. 1826. *Patria ignota.* — γ. *Alnus barbata* C. A. Meyer Verzeichn. caucas. Pflanz. 43. — *Habitat trans Caucasum.*

C. *Pinnatifida* Spach l. c. *Alnus glutinosa laciniata* Willd. Spec. IV. 334.

D. *Quercifolia* Spach l. c. *Alnus glutinosa quercifolia* Willd. l. c.

E. *Oxyacanthaefolia.* *Alnus Oxyacanthaefolia* Loddig. Catalog. 1836.

Offic. exolet. Cortex Ani.

1646. **Alnus cordifolia** Tenore Flor. neap. II. 340. t. 99. — ♄ — *Habitat in demissis paludosis circa Neapolim et in montibus Calabriae.*

Ordo XLV. Cupuliferae.

1842. Ostrya Michel. Hopfenbuche.

1647. **Ostrya vulgaris** Willdenow Spec. IV. 469. *Ostrya carpinifolia* Scopoli Carn. ed. 2. n. 1191. *Carpinus Ostrya* Linn. Spec. 1417. Duham. Arbr. ed. nov. II. 200. t. 59. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

1648 **Ostrya virginica** Willdenow Spec. IV. 469. *Carpinus virginiana* Abbot Insect. II. 151. t. 75. Willd. Baumz. 53. *Carpinus Ostrya* Michaux Arbr. III. 30. t. 107. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

1843. Carpinus Linn. Hainbuche.

1649 **Carpinus Betulus** Linn. Spec. 1416. E. B. t. 2032. Flor. dan. t. 1345. Loudon Arboret. 2004. — ♄ — *Habitat in Europa et Caucaso.*

Var. β *Carpinizza.* *Carpinus Carpinizza* Host Flor. austr. II. 626. — *Habitat in Transylvania, Valachis vulgo* »Carpinizza.«

Var. γ *Incisa* Loddig. Catalog. 1836. *Carpinus Betulus quercifolia* v. *heterophylla* Hortor.

1650. **Carpinus americana** Michaux Flor. Bor. Amer. II. 201. Willd. Spec. IV. 468. Michaux

f. Arbr. III. 78. t. 108. Loudon Arboret. 2013. — 5 — *Habitat in America boreali.*

1651. **Carpinus orientalis** Lam. Dict. 1. 700. Willdenow Spec. IV. 468. Loudon Arboret. 2014. *Carpinus duinensis* Scopoli Carn. ed. 2. t. 60. — 5 — *Habitat in Carniolia, Slavonia, Banatu, Asia minore.*

1844. Corylus Linn. Hasel.

1652. **Corylus Avellana** Linn. Spec. 1417. London Arboret. 2017. — 5 — *Habitat per Europam omnem nec non in Asia boreali.*

Var. α. *Sylvestris* Aiton Hort. kew. V. 363. (E. Bot. t. 723.) — β. *Humilis* Willd. Enum. 985. — ? *C. pumila* Loddig. Catalog. 1836. — γ. *Heterophylla* Loddig. Catalog. 1836. *Corylus laciniata* et *Corylus urticaefolia* Hort. — δ. *Purpurea* Loddig. Catalog. 1836. — ε. *Ovata* Willd. Spec. IV. 470. — ζ. *Globosa.* η. *Depressa.* — θ. *Tubulosa. Corylus tubulosa* Willd. Spec. IV. 470. *Corylus maxima* Miller Dict. n. 2. *Corylus sativa rubra* Aiton l. c. Lambertsnufs. — ι. *Barcelonensis* Loddig. Catalog. 1836. *C. A. grandis* Loddig. Catalog. 1836. — κ. *Lamberti* Loddig. Catalog. 1836. — λ. *Sicula.*

1653. **Corylus Colurna** Linn. Spec. 1417. Loudon Arboret. 2029. *Corylus Byzantina* Hermann Lugd. Bat. 91. — Türkische Haselnufs. — 5 — *Habitat in Asia minore.*

Var. β. *Intermedia* Loddiges Catalog. 1836. — ? γ. *Arborescens* Fischer ex Loudon Arboret. 2029. f. 1949.

Sunt in Austria prope thermas Caecias, juxta Castelli Rauhenek rudera, annosae Colurni arbores, medio aevo satae. *Corylum byzantinam,* humilem fruticem, e seminibus a Davide Ungnadio 1582 Constantinopoli Vindobonam missis natum (Clusius Hist. 11.), ad suam speciem referre nescio.

1654. **Corylus rostrata** Aiton Hort. kew. III. 364. Willdenow Baumz. 80. t. 1. f 2. Michaux Arbr. II. 201. Loudon Arboret 2030. *Corylus cornuta* Hortor — 5 — *Habitat in America boreali.*

1655. **Corylus americana** Michaux Flor. Bor. Amer II. 201. Loudon Arboret. 2030. *Corylus americana humilis* Wangenh. Amer. 88. t. 29. f. 63. — 5 — *Habitat in Canada.*

1845. Quercus Linn. Eiche.

1656. **Quercus sessiliflora** Smith Brit. Flor. III. 1026. *Quercus Robur* Roth Tentam. 1. 408. Schkuhr t. 301. b. *Quercus sessilis* Ehrh. Arb. 78. — 5 — *Habitat in Europa monticola, sylvas vastas efformans.*

Var. β. *Subintegra.* — γ. *Variegata.*

1657. **Quercus pedunculata** Ehrh. Arb. 77. *Quercus Robur* Smith Brit. Flor. III. 1026. — 5 — *Habitat in planitiebus Europae.*

Var. β. *Fastigiata. Quercus fastigiata* Lam. Dict. I. 725. Duham. ed. nov. VII. 178. t. 55. *Quercus pyramidalis* Hort. Chêne Cyprès, Chêne des Pyrénées. — γ. *Heterophylla* Loudon Arboret. Brit. 1732. f. 1569 — 1571. *Quercus laciniata* Loddig. Catalog. 1836. *Quercus salicifolia* Hort. *Quercus filicifolia* Hort. *Quercus Fennessii* Hort.

1658. **Quercus pubescens** Willdenow Spec. IV. 450. Koch Synops. 639. *Quercus lanuginosa* Thuill. Flor. Paris. I. 502. *Quercus collina* Schleicher Herb. *Quercus faginea* Rohrer et Meyer Flora von Mähren 210. non Lam. *Quercus Robur* δ. Lam. Dict. 717. *Quercus hungarica* et *Quercus pannonica* Hort. — 5 — *Habitat in collibus et montibus calcareis Europae mediae.*

1659. **Quercus Cerris** Linn. Spec. 141. *Quercus crinita* Lam. Dict. I. 718. *Quercus Cerris* et *austriaca* Willdenow Spec. IV. 454. — 5 — *Habitat in montosis sylvaticis Europae australioris.*

Var. β. *Angustifolia.* — γ. *Fulhamensis* Loudon Arboret. 1850. f. 1710. 1711. *Quercus dentata* Watson Dendrolog. t. 93. *The Fulham Oak.*

Offic. Cortex Quercus.

1660. **Quercus alba** Linn. Spec. 1414. Michaux Chen. Amer. t. 5. Arbr. I. t. 1. Willdenow Spec. IV. 449. — 5 — *Habitat in America boreali, arbor octogintapedalis.*

1661. **Quercus macrocarpa** Michaux Chen. Amer. t. 2. 3. Arbr. I. t. 4. Willdenow Spec. IV. 449. — 5 — *Habitat in America boreali, arbor sexagintapedalis, vulgo Bur-Oak.*

1662. **Quercus palustris** Du-Roi Harbk. II. t. 5. f. 4. Wangenh. Amer. t. 5. f. 10. Michaux Chen.

Amer. t. 33. 34. Arbr. I. t. 27. Willdenow Spec. IV. 446. — ♄ — *Habitat in Americae borealis paludosis fluviorum ripis, arbor octogintapedalis, vulgo Pin-Oak.*

1663. **Quercus nigra** Linn. Spec. 1413. Michaux Chen. Amer. I. 22 23. *Quercus ferruginea* Michaux f. Arbr. I. 79. t. 20. — ♄ — *Habitat in America boreali, ingentes soli argillacei sterilis tractus occupans, arbor trigintapedalis, vulgo » Barrens Oak. «*

1664. **Quercus aquatica** Solander in Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 357. Michaux Chen. Amer. t. 19—21. *Quercus uliginosa* Wangenheim Amer. t. 6. f. 18. — ♄ — *Habitat in Americae borealis uliginosis, arbor quadragintapedalis.*

1665. **Quercus petiolaris** Bentham Plant. Hartweg. n. 420. — ♄ — *Habitat in Mexico ad Barranca secca, Jacala et San Diego prope Bolaños, arbor quadragintapedalis.*

1666. **Quercus Ilex** Linn. Spec. 1412. Duhamel Arbr. VII. 156. t. 43. 44. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

1847. Fagus Tournef. Buche.

1667. **Fagus sylvatica** Linn. Spec. 1416. Willdenow Spec. IV. 459. E. B. t. 1846. Loudon Arboret. 1950. — ♄ — *Habitat in Europa, nec non in Asia boreali.*

Var. α. *Purpurea* Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 297. *Fagus sylvatica atrorubens* Du-Roi. Hêtre noir. Arbores in hortis vulgares, atrorubente coma singulares, ex unica matre, sylvestri arbore in Germania elapso saeculo fortuito reperta, surculis propagatae. — β. *Cuprea* Loddiges Catalog. ed. 1836. praecedentis varietatis vilis lusus. — γ. *Foliis variegatis* Loddig. Catalog. 1836. — δ. *Heterophylla* Loudon l. c. f. 1875. 1876. *Fagus sylvatica asplenifolia et laciniata* Loddig. Catalog. 1836. *Fagus incisa* et *F. salicifolia* Hortor. Hêtre à feuilles de Saule. — ε. *Cristata* Loddig. Catalog. 1836. *F. crispa* Hort. *Hêtre Crête de Coq.* — Monstrum. — ζ. *Pendula* Loddig. Catalog. 1836. *Hêtre Parasol.*

1668. **Fagus ferruginea** Aiton Hort. kew. III. 362. Willdenow Spec. IV. 460. Michaux f. Arbr.

III. t. 106. Loudon Arboret. 1980. *Fagus americana latifolia* Du-Roi Harbk. I. 269. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

1848. **Castanea** Tournef. Kastanie.

1669. **Castanea vesca** Gärtner Carp. I. 181. t. 37. Willdenow Spec. IV. 460. Loudon Arboret. 1983. *Castanea sativa* Bauhin Pin. 418. *Castanea vulgaris* Lam. Dict. I. 708. Duham. Arbr. ed. nov. III. 66. t. 19. *Fagus Castanea* Linn. Spec. 1416. — ♄ — *Habitat in Europa australi et Asia minore, in media passim culta, etiam in America boreali obvia.*

Var. β *Americana* Persoon Encheir. II. 571. *Castanea vesca* Michaux f. Arbr. III. 9. — γ. *Cochleata* Loddig. Catalog. 1836.

Ordo XLVI. Ulmaceae.

1849. **Zelkova** Spach.

1670. **Zelkova crenata** Spach in Nouv. Annal. sc. nat. XV. 358. *Planera Richardi* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 248. Bieberst. Flor. Taur. Cauc. Suppl. 187. Loudon Arboret. 1409. *Planera crenata* Michaux Mémoire sur le Zelkova. Paris 1831. *Planera carpinifolia* Watson Dendrolog. t. 106. *Ulmus polygama* Richard. in Act. Paris. 1781. *Ulmus nemoralis* Aiton Hort. kew. 2. II. 108. *Ulmus crenata* Hort. Paris. *Rhamnus carpinifolius* Pallas Flor. ross. I. t. 60. — ♄ — *Crescit inter mare nigrum et Caspium, a 35° ad 47° L. B. vulgo » Zelkowa. «*

1850. **Ulmus** Linn. Rusten.

1671. **Ulmus campestris** Linn. Spec. 327. — ♄ — *Habitat passim in sylvis multiplici formarum lusu.*

Var. A. *Nuda* Koch Synops. 637.

a. *Ulmus campestris* Smith Engl. Flor. II. 20. *Ulmus nuda* Ehrhart Beitr. VI. 86.

α. Stricta Lindley Synops. 227. —? *Ulmus cornubiensis* Hort. — *β. Tiliaefolia* Host Flor. Austr. I. 329. — *γ. Sarniensis* Loddig. Catalog. 1836. — *δ. Betulaefolia* Loddig. Catalog. 1836. — *ε. Viminalis* Loddig. Catalog. 1836. — *ζ. Variegata* Loddig. Catalog. 1836. — *η. Viscosa* Loddig. Catalog. 1836.

b. *Ulmus montana* Smith Engl. Flor. II. 22. *Ulmus excelsa* Borkh. Forstbot. 839. *Ulmus corylifolia* Host Flor. austr. I. 329.

α. Cinerea Hort. — *β. Crispa* Hort. — *γ. Cucullata* Hort. — *δ. Fastigiata* Hort. — *ε Hayneana* Hort. Vindob. — *ζ Longifolia* Hort. — *η Rotundifolia* —? *θ. Rugosa* Audib. — *ι. Tortuosa* Host Flor. austr. I. 330.

c. *Ulmus glabra* Miller Dict. n. 4. Smith Engl. Flor. II. 23. *Ulmus montana* Host Flor. austr. I. 330.

α Hostii Hort. Vindob. — *β. Vegeta* Loudon Arboret. 1404. — *γ Scamptoniana. The Scampton Elm* Loudon Arboret. 1404. — *δ Microphylla* Hort. Soc. Lond. ex Loudon Arboret. 1405.

Var. B. *Suberosa* Koch Synops. 637.

a. *Ulmus major* Smith Engl. Flor. I. 21. *Ulmus hollandica* Miller Dict. n. 4.

α. Anglica (E. B. t. 2642). — *β. Pendula* Hort.

b. *Ulmus suberosa* Ehrhart Beitr. VI. 87.

β Fungosa Hort.

Offic. Cortex Ulmi interior.

1672. **Ulmus effusa** Willdenow Baumz. 393. Spec. I. 1325. *Ulmus ciliata* Ehrhart Beitr. VI. 88. *Ulmus racemosa* Borkhausen Forstbot. 851. *Ulmus octandra* Schkuhr Handb. t. 57. a. b. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis Europae.*

1673 **Ulmus fulva** Michaux Flor. Bor. Amer. I. 172. *Ulmus rubra* Michaux Arbr. III. 278. t. 278. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

Ordo XLVII. Celtideae.

1851. **Celtis** Tournef. Zurgelbaum.

* Armatae.

1674. **Celtis rhamnoides** Willdenow Spec. IV. 998. *Rhamnus iguaneus* Cavanill. Ic. III. 48. t. 294. — ♄ — *Habitat in Nova Hispania.*

1675. **Celtis aculeata** Swartz Flor. Ind. occid. I. 545. Willdenow Spec. IV. 998. *Rhamnus iguaneus* Jacq. Amer. 16. — ♄ — *Habitat in montosis Jamaicae et Hispaniolae.*

1676. **Celtis spinosa** Sprengel Syst. I. 931. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

** **Inermes.**

1677. **Celtis australis** Linn. Spec. 1478. Willdenow Spec. IV. 994. — ♄ — *Habitat in Europa australi et in Africa boreali.*

1678. **Celtis occidentalis** Linn. Spec. 1478. Miller Ic. t. 88. Willd. Spec. IV. 994. — ♄ — *Habitat in Pensylvania et Virginia.*

Var. β. *Latifolia.*

1679. **Celtis chinensis** Persoon Encheir. II. 291. — ♄ — *Habitat in China.*

»Thé de l'Abbé Gallois« Gallorum.

1680. **Celtis crassifolia** Lam. Dict. IV. 132. Willdenow Spec. IV. 995. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

1681. **Celtis Tournefortii** Lam. Dict. IV. 132. Willdenow Spec. IV. 994. (Tournef. it. II. 425. t. 41.) — ♄ — *Habitat in Oriente.*

1682. **Celtis laevigata** Willdenow Enum. Suppl. 86. — ♄ — *Habitat in Louisiana.*

1683. **Celtis aspera** Desfont. Catalog. Hort. Paris. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

1684 **Celtis canescens** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 28. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1685. **Celtis micrantha** Swartz Flor. Ind. occid. I. 547. *Rhamnus micranthus* Linn. Spec. 280. — ♄ — *Habitat in Jamaica.*

1854. Bosea Linn. Yervamora.

1686. **Bosea Yervamora** Linn. Spec. ed. 1. p. 225. Jacq. f. Eclog. 1. 41. t. 25. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

Ordo XLVIII. Moreae.

1856. **Morus** Tournef. Maulbeerbaum.

1687. **Morus nigra** Linn. Spec. 1398. Duham. Arbr. ed. nov. IV. t. 22. — ♄ — *Habitat in Persia, passim culta.*

Offic. Baccae Mororum.

1688. **Morus alba** Linn. Spec. 1398. Duham. Arbr. ed. nov. IV. 87. Loudon Arboret. 1348. — ♄ — *Habitat in China, passim culta.*

Var. a. *Morus multicaulis* Perrottet in Annal. Soc. Linn. Paris. 1824. p. 126. Annal. de Fromont. Janvr. 1830. c. ic. Archives Bot. I. 229. *Morus tatarica* Desfont. Catalog. hort. Paris. ed. 3. p. 1347. non alior. *Morus bullata* Balbis msc. *Morus cucullata* Bonafous Mem. 1831. — Mûrier Perrottet. Mûrier des Philippines. — b. *Morus intermedia* Perrottet in Archiv. bot. I. 234. t. 7. *Morus alba sinensis* Bosc. msc. Mûrier de la Chine. — c. *Morus Morettiana* Gera msc. Jacq. f. msc. *Morus macrophylla* Moretti Bibliot. agrar. XII. 18. Morone indiano. Mûrier Dandolo. — d. *Morus venosa* Delile in Bullet. Soc. d'Agricult. du Depart. de l'Herault. Octob. 1826. c. ic. — e. *Morus italica* Poiret Dict. IV. 377. — f. *Morus latifolia* Poiret Dict. IV. 381. — g. *Morus nervosa* Delile ex Moretti Bibliot. Agrar. XII. 38. — h. *Morus hispanica* Hort. — i. *Morus flava* Hort. — k. *Morus gentilis* Hort. — l. *Morus japonica* Hort. — m. *Morus membranacea* Hort. — n. *Morus nana* Hort. — o. *Morus alba nigra* Hort. — p. *Morus rosea* Hort.

1689. **Morus constantinopolitana** Poiret Dict. IV. 381. Duhamel Ed. nov. IV. t. 24. Sprengel Syst. 1. 492. *Morus byzantina* Sieber msc. — ♄ — *Habitat circa Byzantium et in Asia minore culta.*

1690. **Morus tatarica** Pallas Flor. ross. II. 9. t. 52. — ♄ — *Habitat juxta Wolgam et Tanaim.*

1691. **Morus rubra** Linn. Spec. 1399. Willdenow Baumz. 197. Wangenheim Amer. 37. t. 15. f. 35. — ♄ ♂ et ♀ — *Habitat in America boreali.*

1692. **Morus scabra** Willdenow Enum. 967. — ♄ — ♀ — *Habitat in America boreali.*

1857. **Maclura** Nutt. Gilbbeerbaum.

1693. **Maclura aurantiaca** Nuttall Gen. bor. Amer. 11. 234. Lambert Pin. Ed. 1. II. App.

32. Delile in Bullet. soc. d'Agric. du Départem. de l'Herault. Jul. 1835. c. ic. — ♄ — *Habitat in Americae borealis solo fertili, juxta fluvii rubri (Red-River) ripam, in territorio Arkansas, Anglo-Americanis vulgo: » the Ossage Orange. «*

1858. **Broussonetia** Vent.

1694. **Broussonetia papyrifera** Venten. Tabl. III. 547. *Morus papyrifera* Linn Spec. 1399. — ♄ — *Habitat in China, Japonia et in Oceani insulis.*

β. *Cucullata* Nois. Bon. Jard. 1833. p. 919. — γ. *Macrophylla* Hort.

1859. **Ficus** Linn. Feige.

α. **Religiosae.** Foliis integerrimis, cordatis.

1695. **Ficus nymphaeaefolia** Linn. Mant. 305. Vahl Enum. II. 182. — ♄ — *Habitat ad Caracas.*

1696. **Ficus religiosa** Linn. Mant. 504. Vahl Enum. II. 181. *Arbor conciliorum* Rumph Amboin III. 142. t. 91. 92. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1697. **Ficus intermedia** Hort. Schönbr. — ♄ — *Patria ignota.*

1698. **Ficus pedunculata** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 450. Vahl Enum. II. 184. — ♄ — *Habitat in insulis Caribaeis.*

1699. **Ficus eximia** Schott in Spreng. Cur. post. 410. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

1700. **Ficus cordata** Thunb. Dissert. Fic. 6. c. ic. Prodr. 12. Vahl Enum. II. 182. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1701. **Ficus myrtifolia** Link Enum. II. 450. — ♄ — *Patria ignota.*

1702. **Ficus ovata** Vahl Enum. II. 185. — ♄ — *Habitat in Guinea.*

1703. **Ficus crassinervia** Desfont Cat. Hort. Paris. ed. 1. p. 209. Willdenow Spec. IV. 1138. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1704. **Ficus laevigata** Vahl Enum. II. 183. — ♄ — *Habitat in India occidentali.*

1705. **Ficus coriacea** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 453. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1706. **Ficus lentiginosa** Vahl Enum. II. 183. — ♄ — *Habitat in insula Monserrat.*

1707. **Ficus venosa** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 451. *Ficus infectoria* Willdenow Spec. IV. 1137. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1708. **Ficus leucosticta** Spreng. Syst. III. 779. *Ficus venosa* Willdenow Hort. Berolin. I. 36. t. 36. Spec. IV. 1136. *Ficus leucostoma* Poiret Dict. X. 654. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1709. **Ficus holosericea** Schott in Spreng. Cur. post. 410. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

b. **Benjaminae.** Foliis integerrimis, ovatis.

1710. **Ficus Benjamina** Linn. Spec Mant. 129. Vahl Enum. II. 187. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1711. **Ficus benghalensis** Linn. Spec. 1514. Vahl Enum. I. 187. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1712. **Ficus superstitiosa** Link Enum. II. 449. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1713. **Ficus populnea** Willdenow Spec. IV. 1141. *Ficus populifolia* Desfont. Catalog. hort. Paris. ed. 1. p. 209. non Vahl. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1714. **Ficus pumila** Thunb. Dissert. Fic. 10. Vahl Enum. II. 190. *Ficus sylvestris procumbens folio simplici* Kaempfer Amoen. exot. 803. t. 804. — ♄ — *Habitat in China et Japonia.*

c. **Elasticae.** Foliis integerrimis, oblongis.

1715. **Ficus retusa** Linn. Mant. 129. Vahl Enum. II. 193. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1716. **Ficus elastica** Roxburgh Flor. Ind. or. III. 541. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1717. **Ficus adhatodaefolia** Schott in

Sprengel Cur. post. 409. — 5 — *Habitat in Brasilia.*

1718. **Ficus nitida** Thunb. Dissert. Fic. 10. Vahl Enum. I. 191. — 5 — *Habitat in India orientali.*

1719. **Ficus ciliolosa** Link Enum. II. 450. — 5 — *Patria ignota.*

1720. **Ficus americana** Aublet Guian. II. 952. Swartz Flor. Ind. occid. III. 1569. Vahl Enum. II. 188. — 5 — *Habitat in America tropica.*

1721. **Ficus ligustrifolia** Dieffenb. msc. — ♄ — *Patria ignota.*

1722. **Ficus longifolia** Schott in Sprengel Cur. post. 409 — 5 — *Habitat in Brasilia.*

1723. **Ficus microcarpa** Vahl Enum. II. 188. — 5 — *Habitat in Guinea.*

1724. **Ficus cestrifolia** Schott in Spreng. Cur. post. 409 — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

1725. **Ficus clusiaefolia** Schott in Sprengel Cur. post. 409. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

1726. **Ficus camelliaefolia** Dieffenb. msc. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia, e seminibus a b. Hunneman communicatis enata.*

1727. **Ficus rubiginosa** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 1. p. 209. *Ficus australis* Willd. Spec. IV. 1138. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

1728. **Ficus cotoneaefolia** Vahl Enum. II. 189. *Ficus indica* Lam. Dict. II. 494. Willd. Spec. IV. 1146. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

1729. **Ficus hirsuta** Schott Cur. post. 410. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

d. **Lanceolatae.** Foliis integerrimis, lanceolatis.

1730. **Ficus laurifolia** Lam. Dict. II. 495. Vahl Enum. II. 194. *Ficus virens* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 451. *Ficus martinicensis* Willd. Spec. IV. 1137. — 5 — *Habitat in India occidentali.*

e. **Dentatae.** Foliis dentatis v. serratis.

1731. **Ficus capensis** Thunb. Dissert. Fic.

13. Vahl Enum. II. 197. — 5 — *Habitat in Capite bonae spei.*

1732. **Ficus ulmifolia** Lam. Dict. II. 499. Vahl Enum. II. 197. — 5 — *Habitat in Java.*

1733. **Ficus exasperata** Vahl Enum. II. 197. — 5 — *Habitat in Guinea.*

1734. **Ficus oppositifolia** Roxb. Flor. Ind. or. III. 561. — 5 — *Habitat in India orientali.*

1735. **Ficus symphytifolia** Lam. Dict. II. 498. Vahl Enum. II. 198. — 5 — *Habitat in Java.*

f. **Sycomori.** Foliis angulatis, sinuatis.

1736. **Ficus Sycomorus** Linn. Spec. 1513. Vahl Enum. II. 198. — 5 — *Habitat in Aegypto, unde semina misit Th. Kotschy.*

g. **Caricae.** Foliis divisis.

1737. **Ficus Carica** Linn. Spec. 1513. Vahl Enum. II. 204. — 5 — *Habitat in Asia minore, nunc per Europam australem diffusa.*

1738. **Ficus denticulata** Vahl Symb. I. 83. Enum. II. 202. — 5 — *Habitat in India orientali.*

1860. Dorstenia Plum.

a. **Dorstenia** Desv.

1739. **Dorstenia brasiliensis** Lam. Dict. II. 314 Willdenow Spec. I. 682. — ♃ — *Habitat in Brasilia, Monte-Video et ad fretum Magellanicum.*

1740. **Dorstenia fruticulosa** Schott msc. — 5 — *Habitat in Brasilia.*

1741. **Dorstenia Contrajerva** Linn. Spec. 176. Jacq. Collect. III. 200. Ic. rar. III. t. 614. Willd. Spec. IV. 683. *Drakena radix* Clus. Exot. 83. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

b. **Sychinium** Desv.

1742. **Dorstenia ceratosanthes** Loddig. Bot. Cab. t. 1216. *Sychinium* Desvaux in Annal. Soc.

Linn. Paris. IV. 216. t. 12. — ♃ — *Habitat in America australi.*

Ordo XLIX. Artocarpeae.

1861. **Brosimum** Swartz.

1743. **Brosimum microcarpum** Schott in Sprengel Cur. post. 403. — 5 — *Habitat in Brasilia.*

1865. **Cecropia** Linn.

1744. **Cecropia palmata** Willd. Spec. IV. 652. — 5 — *Habitat in Brasilia.*

1745. **Cecropia peltata** Linn. Amoen. V. 410. Jacq. Observ. II. t. 46. f. 4. — 5 — *Habitat in America tropica.*

1869. **Conocephalus** Blum.

1746. **Conocephalus suaveolens** Blume Bijdr. 484. Bennett in Horsfield Plant. Jav. rar. 47. t. 12. *Conocephalus naucleiflorus* Lindley in Bot. Reg. t. 1203. A. et B. *Urtica naucleiflora* Roxburgh Flor. ind. III. 592. — 5 — *Habitat in Asia tropica.*

1868. **Artocarpus** Linn.

1747. **Artocarpus incisa** Linn. f. Suppl. 411. Hooker in Bot. Mag. t. 2869 2870. 2871. *Rademachia incisa* Thunb. Act. Holm. XXXVI. 250. — 5 — *Habitat in Oceania tropica.*

Ordo L. Urticaceae.

1879. **Urtica** Tournef. Nessel.

α. **Urtica** Gaudich.

1748. **Urtica Dodartii** Linn. Spec. 1395. Blackw. Herb. t. 321. f. 2. Willdenow Spec. IV. 347. — ⊙ — *Patria ignota.*

1749. **Urtica pilulifera** Linn. Spec. 1395. Schkuhr Handb. t. 289. E. B. t. 148. — ☉ — *Habitat in Europa australiore.*

1750. **Urtica urens** Linn. Spec. 1396. E. B. t. 1236. Flor. dan. t. 739. — ☉ — *Habitat in cultis Europae totius.*

1751. **Urtica dioica** Linn. Spec. 1396. E. B. t. 1750. Flor. dan. t. 746. — ♃ — *Habitat in ruderatis Europae totius, Asiae et Americae borealis.*

Offic. Herba Urticae majoris.

1752. **Urtica ardens** Link Enum. II. 384. — ☉ — *Habitat in Nepalia.*

1753. **Urtica cannabina** Linn. Spec. 196. Willdenow Spec. IV. 355. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

1754. **Urtica scabrella** Roxburgh Flor. Ind. or. III. 581. Link Enum. II. 384. — ♃ — *Habitat in India orientali.*

b. Urera Gaudich.

1755. **Urtica aestuans** Linn. Spec. 1397. Willdenow Spec. IV. 362. — ☉ — *Habitat in Surinam.*

1756. **Urtica horrida** Link Enum. II. 385. — ☉ — *Habitat in Nepalia.*

1757. **Urtica baccifera** Linn Spec. 1398. Jacq. Hort. Schönbr. III. 71. t. 387. Willdenow Spec. IV. 367. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

1758. **Urtica tenacissima** Roxburgh Flor. Ind. III. 590. *Caloose* Marsden Sumatr. 57. — ♃ — *Habitat in Sumatra.*

Ex hac specie funes tenacissimi apud Indos parantur.

c. Laportea Gaudich.

1759. **Urtica canadensis** Linn. Spec. 1397. Michaux Flor. Bor. Amer. II. 178. Willd. Spec. IV. 365. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

1882. **Pilea** Lindl.

1760. **Pilea muscosa** Lindley Collect. t. 4. *Parietaria microphylla* Linn. Spec. 1492. *Urtica micro-*

phylla Swartz Flor. Ind. occid. 1. 305. —⊙— *Habitat in America tropica.*

1884. **Böhmeria** Jacq. Nesselstrauch.

1761. **Böhmeria nivea** Gaudichaud ad Freyc. 499. *Urtica nivea* Linn. Spec. 1398 Jacq. Hort. Vindob. t. 166. —♃— *Habitat in India orientali.*

1762. **Böhmeria elongata** Fischer ex Hornem. Hort. Havn. Suppl. 107. —⊙— *Habitat in Brasilia.*

1885. **Parietaria** Tournef.

1763. **Parietaria officinalis** Linn. Spec. 1492. Schkuhr t. 344. E. B. t. 879. Flor. dan. t. 521. Hayne Arzneigew. V. t. 12. —♃— *Habitat in ruderatis Europae totius.*

Offic. exolet. Herba Parietariae.

1885. **Freirea** Gaudich.

1764. **Freirea microphylla.** *Parietaria microphylla* Ledebour Flor. Alt. IV. 303. Ic. t. 22. —⊙— *Habitat in fissuris rupium Sibiriae altaicae.*

1765. **Freirea filiformis.** *Parietaria filiformis* Tenore Sylloge 77. —⊙— *Habitat in regno neapolitano.*

1885. **Gesnouinia** Gaudich.

1766. **Gesnouinia arborea** Gaudich. ad Freycinet. p. 502. *Parietaria arborea* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 429. *Urtica arborea* Linn. Suppl. 417. Heritier Stirp. t. 20. *Böhmeria rubescens* Jacq. Fragm. 8. t. 5. f. 1. Willd. Spec. IV. 344. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis humidis Teneriffae.*

1887. **Forskolea** Linn. Hanfnessel.

1767. **Forskolea tenacissima** Linn. Suppl. 245. Jacq. Hort. Vindob. I. 18. t. 48. Lam. Illustr. t. 388. —⊙— *Habitat in Aegypto.*

1768. **Forskolea viridis** Ehrenb. msc. —⊙— *Habitat in Aegypto.*

1769. **Forskolea angustifolia** Retz Observ. III. 31. Murray Comm. Götting. 1784. p. 24. t. 2. —⊙— *Habitat in insula Teneriffa.*

*Cynocrambeae.

1888. Thelygonum Linn. Hundskohl.

1770. **Thelygonum Cynocrambe** Linn. Spec. 1411. Lam. t. 777. Delile in Annal. sc. nat. XIX. 1370. t. 13. Nees jun. Gen. Plant. II. 69. —⊙— *Habitat in regione mediterranea.*

Herba acridula, leniter purgans.

Ordo LI. Cannabineae.

1890. Cannabis Tournef.

1771. **Cannabis sativa** Linn. Spec. 1457. Nees jun. Gen. Plant. II. 30. —⊙— *Habitat in India orientali.*

Offic. Semen Cannabis.

1891. Humulus Linn.

1772. **Humulus Lupulus** Linn. Spec. 1457. Nees jun. Gen. Plant. II. 31. — ♄ — ○ — *Habitat in sepibus et juxta vias montanas.*

Offic. Strobili Lupuli.

*Garryaceae.

1900. Garrya Dougl.

1773. **Garrya elliptica** Douglas ex Lindley Bot. Reg. t. 1686. Loudon Arboret. Brit. 2031. f. 1951. — ♄ — *Habitat in California.*

Ordo LII. Plataneae.

1901. **Platanus** Linn. Platane.

1774. **Platanus orientalis** Linn. Spec. 1417. Willdenow Spec. IV. 473. Duhamel Arbr. t. 33. Ed. nov. II. t. 1. — Doolb. Arab. — ♄ — *Habitat in Oriente.*

Var. β. *Acerifolia* Aiton Hort. kew. ed. 2. III. 364. *Platanus acerifolia* Willdenow Spec. IV. 474. — *αα. Digitata.* — ββ. *Grandifolia* —? *P. hispanica* Loddig. Catalog. 1836. — γγ. *Longiloba.*

Var. γ. *Undulata* Aiton Hort. kew. ed. 2. III. 364. *Platanus cuneata* Willdenow Spec. IV. 473. Baumz. 283.

1775. **Platanus occidentalis** Linn. Spec. 1418. Willdenow Spec. IV. 475. Duhamel Arbr. t. 35. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

β. *Macrophylla.*

Ordo LIII. Balsamifluae.

1902. **Liquidambar** Linn. Storaxbaum.

1776. **Liquidambar styraciflua** Linn. Spec. 1418. Duhamel Arbr. 1. t. 139. Michaux f. Arbr. III. 194. t. 4. — Amerikanischer Storaxbaum. Copalme-Tree. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

Offic. exolet. Storax liquida (Baume Copalme).

Ordo LIV. Salicineae.

1903. **Salix** Tournef. Weide.

§. 1. Fragiles Koch.

1777. **Salix pentandra** Linn. Spec. 1442. Koch Salic. 13 — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in convallibus subalpinis, cum fluviis ad radices alpium descendens, nec non in paludosis dumosis Europae borealioris obvia.*

1778. **Salix fragilis** Linn. Spec. 1443. Koch Salic. 15. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in ripis fluviorum et juxta sepes humidas.*

Var. *α. Salix fragilissima* Host Sal. t. 22. 23. Flor. austr. II. 636. ♂ et ♀. — *β Salix palustris* Host Sal. t. 24. 25. Flor. austr. II. 637. ♂ et ♀. — *γ. Salix excelsior* Host Sal. t. 28. 29. Flor. austr. II. 638. ♂ et ♀.

Ex hac et affinibus Cortex Salicis officinarum.

1779. **Salix alba** Linn. Spec. 1449. Koch Salic. 16. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat cum antecedente ad fluviorum ripas.*

Var. *β. Salix vitellina* Linn. Spec. 1442. ♂ et ♀. — *αα. Aurea* Hort. ♂ et ♀. — *ββ. Argentea* Hort. ♀.

1780. **Salix nigra** Mühlenb. in N. Abhandl. Berlin. naturf. Freunde. IV. 237. t. 4. f. 5. Koch Salic. 17. *Salix caroliniana* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 226. — ♄ — ♀ — *Habitat ad rivos Pensylvaniae, Carolinae et Georgiae.*

1781. **Salix conifera** Wangenh. Amer. 123. t. 31. f. 72. Willdenow Spec. IV. 705. — ♄ — ♀ — *Habitat in America boreali.*

β. Angustifolia Hort. ♀.

1782. **Salix babylonica** Linn. Spec. 1443. Koch Salic. 17. — ♄ ♀ — *Habitat in Oriente, nunc passim per orbem terrarum culta, unius stirpis surculis multiplicata proles.*

§. 2. Amygdalinae.

1783. **Salix amygdalina** Linn. Spec. 1443. Koch Salic. 18. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in fluviorum ripis aliisque locis paludosis.*

A. *Discolor* Koch Synops. 644. — *α. Salix Villarsiana* Willdenow Spec. IV. 655. ♂. — *β. Salix tenuiflora* Host. Sal. t. 7. 8. Flor. austr. II. 633. ♂.

B. *Concolor* Koch Synops. 644. — *α. Salix ligustrina* Host Sal. t. 15. 16. Flor. austr. II. 634. ♂.

1784. **Salix undulata** Ehrhart Beitr. VI. 101. Koch Salic. 20. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat ad ripas fluviorum Germaniae, imprimis septemtrionalis.*

Var. *β. Salix lanceolata* Smith E. B. t. 1436. ♂ et ♀.

1785. **Salix hippophaëfolia** Thuillier Flor. Paris. 514. Koch Salic. 20. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat juxta ripas et fossas Europae mediae.*

1786. **Salix tristis** Mühlenb. in N. Abhandl. Berlin. naturf. Freunde. IV. 241. t. 6. f. 9. *Salix Mühlenbergiana* Willdenow Spec. IV. 692. Koch Salic. 21. *Salix incana* Michaux Flor Bor Amer. II. 225. — 5 — ♀ — *Habitat in America boreali.*

1787. **Salix grisea** Willdenow Spec. IV. 699. Koch Salic. 21. *Salix sericea* Mühlenb. in N. Abhandl. Berlin. naturf. Freunde. IV. 239. — 5 — ♂ — *Habitat in America boreali.*

Var. β. *Subglabrata* Koch l. c. ♂.

§. 3. Pruinosae Koch.

1788. **Salix acutifolia** Willdenow Spec. IV. 688. Koch Salic. 22. *Salix violacea* Andrews Bot. Reposit. t. 581. — 5 — ♂ — *Habitat ad ripas Germaniae borealis, Podoliae et in Norvegia.*

1789. **Salix daphnoides** Villars Delph. III. 765. Koch Salic. 23 — 5 — *Habitat in convallibus subalpinis, et in paludosis Germaniae borealis.*

Var. β *Salix cinerea* Willdenow Spec. IV. 460. ♂ et ♀. — γ. *Salix pomeranica* Willdenow Enum. Suppl. 66. ♀.

§. 4. Purpureae Koch.

1790. **Salix Pontederana** Willdenow Spec. IV. 461. excl. synon. Koch Salic. 24. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat in sylvis montanis Europae mediae.*

Var. a. *Salix discolor* Host Sal. t. 60. 61. Flor. austr. II. 645. ♂ et ♀. — b. *Salix austriaca* Host Sal. t. 64. 65. Flor. austr. II. 646. ♂ et ♀.

1791. **Salix purpurea** Linn. Spec. 1442. Koch Salic. 24. *Salix monandra* Hoffm. Sal. 18. t. 1. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat ad ripas fluviorum, et in pascuis humidis, etiam in subalpinis obvia.*

Var. γ. *Helix* Koch Synops. 647. *Salix Helix* Linn. Spec. 1444. ♀. — ε *Sericea* Koch Synops. 647 *Salix monandra sericea* Seringe Sal. Helv. 8. ♀.

Modificationes. *α. Salix mutabilis* Host Sal. t. 42. 43. Flor. austr. II. 640. ♂ et ♀. — *β Salix oppositifolia* Host Sal. t. 38. 39. Flor. austr. II. 640. ♀. — *γ. Salix carniolica* Host Sal. t. 44. 45. Flor. austr. II. 641. ♀. — *δ. Salix mirabilis* Host Sal. t. 46. Flor. austr. II. 641. ♂ et ♀.

1792. **Salix rubra** Hudson Flor. Angl. 423. Koch Synops. 26. *Salix concolor* Host Sal. t. 34. 35. Flor. austr. II. 639. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat ad ripas fluviorum.*

β. Salix Forbyana Smith Brit. Flor. 1041. ♂.

§. 5. Viminales Koch.

§§. 1. *Smithianae.* Amentis femineis rectis.

1793. **Salix mollissima** Ehrhart Beitr. VI. 101. Willdenow Spec. IV. 707. Wahlenb. Carp. 317. Koch Sal. 27. *Salix pubera* Koch in Bönningh. Flor. monast. — 5 — ♀ — *Habitat in Germania boreali et in montibus Carpathis riparia.*

1794. **Salix viminalis** Linn. Spec. 1448. Koch Sal. 29. — 5 — ♀ — *Habitat ad ripas et in dumetis humidis.*

β. Cortice nigro fusco Koch l. c. ♂ et ♀.

1795. **Salix stipularis** Smith Brit. Flor. 1069. Koch Salic. 29. *Salix longifolia* ♀ Host Sal. t. 63. Flor. austr. II. 645. — 5 — ♀ — *Habitat in ripis et humidis Germaniae.*

1796. **Salix acuminata** Smith Brit. Flor. 1068. Koch Salic. 30. *Salix longifolia* ♂ Host Sal. t. 62. Flor. austr. II. 645. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat cum praecedentibus.*

§§. 2. *Seringeanae.* Amentis femineis armatis.

1797. **Salix Seringeana** Gaudin Flor. Helv. VI. 251. Koch Sal. 33. *Salix lanceolata* Seringe Sal. Helv. 37. DC. Fl. fr. V. 348. non Smith. *Salix holosericea* Seringe Sal. exsicc. n. 70. non Willdenow. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat ad rivulos in convallibus subalpinis.*

β. Salix intermedia Host Sal. t. 56. 57. Flor. austr. II. 644. ♂ et ♀.

§. 6. Capreae Koch.

1798. **Salix holosericea** Willdenow Spec. IV. 708. Koch Sal. 35. *Salix velutina* Schrad. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat in pratis humidis Germaniae borealis.*

1799. **Salix cinerea** Linn. Spec. 1449. Wahlenb. Flor. suec. n. 1137. Koch Sal. 35. *Salix acuminata* Hoffm. Sal. 39. *Salix polymorpha* Host Sal. t. 68—70. Flor. austr. II. 650. *Salix Hoffmanniana* Bluff et Fingerh. Flor. germ 568. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat in pascuis et dumetis humidis.*

β. *Salix aquatica* Smith Brit. Flor. 1063. ♂ *Foliis variegatis.*

1800. **Salix nigricans** Fries Nov. Mant. I. 52. Koch Synops. 650. — 5 — *Habitat in nemoribus humidis et pratis paludosis convallium alpinarum, nec non in planitiebus alpium pedi adsitis.*

a. *Phylicifoliae. Salix phylicifolia* Koch Sal. 40. ♂ et ♀. α *Salix Amaniana* Willd. Spec. IV. 663. ♀. — β. *Salix Andersoniana* Smith E. B. t. 2343. ♂ et ♀. — γ. *Salix menthaefolia* Host Sal. t. 79. 80. Flor. austr. II. 649. ♂ et ♀. — δ. *Salix prunifolia* Host Sal. t. 83. 84. Flor. austr. II. 649. ♂. — ε. *Salix parietariaefolia* Host Sal. t. 85. 86. Flor. austr. II. 650.

b. *Eriocarpae* Koch Synops. 651. α. *Salix nigricans* Wahlenb. Flor. Lapp. n. 485. ♂. — β. *Salix Forsteriana* Smith E. B. t. 2343. ♀. — γ. *Salix hirta* Smith E. B. t. 1404. ♀. — δ. *Salix cotinifolia* Smith Flor. Brit. 2342. ♂ et ♀.

1801. **Salix silesiaca** Willdenow Spec. IV. 660. Koch Sal. 40. — 5 — ♀ — *Habitat in Sudetis et vicino Carpatho.*

β. *Salix fagifolia* Willdenow Spec. IV. 704. ♂ et ♀.

1802. **Salix caprea** Linn. Spec. 1448. Koch Sal. 37. — 5 — ♂ et ♀ — *Habitat in nemoribus depressis Europae totius.*

β. *Salix ulmifolia* Thuillier Flor. paris. 518. ♀.

1803. **Salix aurita** Linn. Spec. 1446. Koch Sal. 38. — 5 — *Habitat in pascuis et nemoribus uliginosis.*

α. *Salix heterophylla* Host Sal. t. 87. 88. Flor. austr. II. 650. ♀. — β. *Salix uliginosa* Willdenow Enum. 1007. ♂ et ♀.

1804. **Salix glabra** Scopoli Flor. carn. II. 255. *Salix Wulfeniana* Willdenow Spec. IV. 660. Host Salic. t. 95. 96. Flor. austr. II. 652. — ♄ — *Habitat in subalpinis juxta rivulos.*

1805. **Salix hastata** Linn. Spec. 1443. Koch Synops. 654. — ♄ — ♀ — *Habitat in pascuis subalpinis et alpinis.*

§. 7. Argenteae Koch.

1806. **Salix myrtilloides** Linn. Spec. 1446. Koch Synops. 654. — ♄ — ♀ — *Habitat in turfosis ericetis Germaniae.*

1807. **Salix ambigua** Ehrhart Beitr. VI. 103. Koch Synops. 655. — ♄ — ♀ — *Habitat in pratis spongiosis et paludosis Europae borealioris.*

β. *Salix spathulata* Willdenow Spec. IV. 700. ♂. — γ. *Salix finmarchica* Willdenow Enum. Suppl. 66. ♀.

1808. **Salix repens** Linn. Spec. 1447. Koch Sal. 47. Synops. 655. — ♄ — *Habitat in pratis sterilibus et in turfosis Germaniae et Angliae.*

α. *Vulgaris. Salix repens* Smith Flor. Brit. III. 1061. ♂ et ♀. — β. *Argentea. Salix argentea* Smith Flor. Brit. III. 1069. ♀. ? — δ. *Depressa. Salix depressa* Hoffm. Deutsch. Flor. II. 265.

1809. **Salix angustifolia** Wulfen in Jacq. Collect. III 48. Fries Novit. ed. 2. Mant. 1. 65. Koch Synops. 656. *Salix pratensis* Host Sal. t. 50. 51. Flor. austr. II. 642. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in turfosis montium Europae.*

1810. **Salix rosmarinifolia** Linn. Spec. 1148. Koch Synops. 656. — ♄ — *Habitat in paludosis et turfosis frigidiusculis Germaniae.*

α. *Salix tenuis* Host Sal. t. 47. 48. Flor. austr. II. 642. ♀. — β *Salix parviflora* Host Sal. t. 49. Flor. austr. II. 642. ♂ et ♀.

§. 8. Frigidae Koch.

1811. **Salix limosa** Wahlenb. Flor. Lapp.

n. 478. Koch Salic. 54. — ♄ — *Habitat in uliginosis alpinis Europae totius.*

β. *Salix canescens* Willdenow Spec. IV. 687.

1812. **Salix Arbuscula** Wahlenb. Flor. Lapp. n. 476. Koch Synops. 657. — ♄ — *Habitat in subalpinis Europae totius.*

α. *Salix Weigeliana* Willdenow Spec. IV. 678. ♂ et ♀. — β *Salix laurina* Smith in Linn. Transact. VI. 122. ♀. — γ. *Salix tenuifolia* Smith Flor. Brit. 1052. ♂. — δ. *Salix Croweana* Smith Flor. Brit. 1043. ♂ et ♀. — ε. *Salix humilis* Willdenow Baumz. 439. ♂ et ♀. — ζ. *Salix tetrapla* Walker ex Link Enum. II. 415. ♂.

1813. **Salix prunifolia** Smith Flor. Brit. 1054. Koch Salic. 58. — ♄ — *Habitat in alpibus Helvetiae et Scotiae.*

β. *Salix formosa* Willdenow Spec. IV. 680. ♀.

§. 9. Glaciales Koch.

1814. **Salix retusa** Linn. Spec. 1445. Koch Synops. 660. — ♄ — ♀ — *Habitat in petrosis alpinis et subalpinis.*

1815. **Salix herbacea** Linn. Spec. 1445. Koch Synops. 660. — ♄ — ♂ — *Habitat in alpibus, juxta nivem.*

1904. **Populus** Tournef. Pappel.

1816. **Populus alba** Linn. Spec. 1463. Smith Engl. Flor. IV. 243. *Populus nivea* Willdenow Baumz. 227. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat passim in Europa.*

β. *Anglica* ♀. (E. B. t. 1618.) — γ. *Nivea* Loddig. Catalog. 1836. ♀.

1817. **Populus canescens** Smith Flor. Brit. 1080. Engl. Flor. IV. 243. *Populus alba* Miller Dict. n. 1. Willdenow Baumz. 227. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat cum praecedente sparsim.*

β. *Anglica* (E. B. t. 1619). — γ. *Belgica* Loddig. Catalog. 1836. ♂.

1818. **Populus tremula** Linn. Spec. 1464.

E. B. t. 1909. — ♄ — *Habitat in sylvis planitierum Europae fere totius.*

β. *Pendula* Loddig. Catalog. 1836.

1819. **Populus trepida** Mühlenb. ex Willdenow Spec. IV. 803. *Populus tremuloides* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 243. Arbr. III. t. 8. f. 1. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in America boreali.*

1820. **Populus laevigata** Aiton Hort. kew. III. 406. — ♄ — ♀ — *Habitat in America boreali.*

1821. **Populus grandidentata** Michaux Flor. Bor. Amer. II. 243. Loudon Arboret. 1650. f. 1511. — ♂ — ♄ — *Habitat in America boreali.*

1822. **Populus graeca** Aiton Hort. kew. III. 407. Duhamel Arbr. ed. nov. II. 185. t. 54. — ♄ — ♀ — *Habitat in Archipelago graeco.*

1823. **Populus nigra** Linn. Spec 1464. E. B. t.. 1910. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat ad ripas fluviorum Europae passim.*

β *Serotina* ♂ et ♀. — γ *Salicifolia* Loddig.

1824. **Populus betulaefolia** Pursh Flor. Bor. Amer. II. 619. *Populus nigra* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 244. *Populus hudsonica* Michaux Arbr. III. 293. t. 10. — ♄ — ♂ — *Habitat in America boreali.*

1825. **Populus monilifera** Aiton Hort. kew. III. 406. Watson Dendrolog. t. 102. *Populus virginiana* Desfont. Tabl. 467. *Populus glandulosa* Mönch Method. 339. *Populus caroliniensis* Mönch Weissenst. 81. *Populus marylandica* Bosc Nouv. Cours. 409. *Populus acladesca* Lindley in Encyclop. of Plants. 840. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in America boreali.*

β *Lindleyana* Booth. — γ *Variegata* Hort. ♀.

1826. **Populus dilatata** Aiton Hort. kew. III. 406. *Populus fastigiata* Desfont. Arbr. II. 465. *Populus italica* Mönch Weissenst. 79. *Populus pyramidalis* Rozier ex Lam. Dict. V. 235. — ♄ — ♂ et ♀ — *Habitat in Europa australi et Oriente, passim secus vias culta.*

β. *Pannonica* Jacq. f. ♀.

1827. **Populus angulata** Aiton Hort. kew.

III. 407. Michaux Arbr. III. t. 12. — ♄ — ♂ — *Habitat in America boreali.*

β. *Boothii* Hort. —? *Populus Medusae* Booth.

1828. **Populus heterophylla** Linn. Spec. 1464. Michaux Arbr. III. t. 9. — ♄ — ♂ — *Habitat in America boreali.*

1829. **Populus balsamifera** Linn. Spec. 1464. Michaux Arbr. III. t. 13. f. 1. *Populus Tacamahaca* Miller Dict. n. 6. — ♄ — ♂ — *Habitat in America boreali.*

β. *Suaveolens* Fischer in Loddig. Catalog. 1836.
Offic. Tacamahaca communis.

1830. **Populus laurifolia** Ledebour Flor. Alt. IV. 297. Ic. t 479 *Populus balsamifera* Pallas Flor. ross. I. 67. t. 41. *Populus viminalis* Loddig. Catalog. 1836. *Populus salicifolia* Hort. *Populus longifolia* Hort. — ♄ — *Habitat in Altai, juxta radices montium et ad fluviorum ripas.*

1831. **Populus candicans** Aiton Hort. kew. III. 406. *Populus macrophylla* Lindley in Encyclop. of Plants 840. *Populus latifolia* Mönch Meth. 338. *Populus ontariensis* Hort. Paris. *Populus cordata* Loddig. Catalog. 1836. — ♄ — ♀ — *Habitat in America boreali.*
Offic. Tacamahaca communis.

Ordo LV. Chenopodeae.

1909. **Halocnemum** Bieberst. Salzstrauch.

* **Arthrocnemum** Moq.

1832. **Halocnemum fruticosum** Link in Dietrich Spec. I 88. *Arthrocnemum fruticosum* Moq. Tand. Chenopod. 111. *Salicornia fruticosa* Brotero Flor. lusit. I. 18. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 293. — ♄ — *Habitat in littoribus mediterraneis.*

β. *Macrostachya Salicornia macrostachya* Moricand Flor. Venet. 1.

1911. Eurotia Adans.

1833. **Eurotia ceratoides** C. A. Meyer in Ledebour Flor. Alt. IV. 239. Moq. Tandon Chenop. 81. *Ceratospermum papposum* Persoon Encheir. II. 552. *Diotis ceratoides* Linn. Spec. 1389. Jacq. Ic. rar. t. 189. Gärtner Carp. II. 210. t. 128. f. 1. *Krascheninikowia ceratoides* Guldenst. in Nov. Comment. Petropolit. XVI. 548. t. 17. f. 1—6. et f. 13. — ♄ — *Habitat in lapidosis et campestribus aridis subsalsis Sibiriae.*

1912. Atriplex Linn. Melde.

α. Euatriplex.

1834. **Atriplex Hermanni** Villem. Phytogr. 1222. Moq. Tandon Chenop. 51. *Atriplex nitens* Schkuhr t. 348. f. 1. *Atriplex acuminata* Waldst. et Kit. Plant. Hung. rar. t. 7. — ☉ — *Habitat in Germaniae, Hungariae et Tatariae sepibus et vineis.*

1835. **Atriplex hortense** Linn. Spec. 1493. Schkuhr t. 349. Moq. Tandon Chenop. 52. — ☉ — *Habitat in Asia media, vulgaris nunc hortorum hospes.*

β. *Rubrum.* — γ *Viride.*

1836. **Atriplex tataricum** Linn. Spec. 1493. Schkuhr t. 344 Moq. Tandon Chenop. 53. — ☉ — *Habitat in Hungaria et Sibiria.*

β. *Atriplex oblongifolium* Waldst. et Kit. Plant. rar. Hung. II. t. 221.

1837. **Atriplex hastatum** Linn. Spec. 1494. Flor. dan. t. 1286. Moquin Tandon Chenop. 53. — ☉ — *Habitat in Europa borealiore.*

1838. **Atriplex patulum** Linn. Spec. 1494. Moq. Tandon Chenop. 54. *Atriplex hastatum* Schkuhr t. 348. et *Atriplex laciniatum* Schkuhr t. 349. — ☉ — *Habitat in ruderatis et versuris Europae totius.*

1839. **Atriplex laciniatum** Linn. Spec. 1494. Wahlenb. Flor. suec. 661. Moq. Tandon Chenop. 56. — ☉ — *Habitat in Europa, Asia et America boreali.*

1840. **Atriplex roseum** Linn. Spec. 1493.

Schkuhr Handb. t. 350. Moq. Tandon Chenop. 57. — ⊙ — *Habitat in Europa australi.*

β *Argenteum* Hort.

1841. **Atriplex littorale** Linn. Spec. 1494. E. B. t. 708. Flor. dan. t. 1287. Moq. Tandon Chenop. 59. — ⊙ — *Habitat in littoribus Europae borealis, et in desertis salsis Hungariae et Asiae mediae.*

b. **Obione** Gärtner.

1842. **Atriplex sibiricum** Linn. Spec. 1493. Schkuhr t. 350. *Obione muricata* Gärtn. II. 198. t. 126. f. 5. Moq. Tandon Chenop. 70. — ⊙ — *Habitat in Sibiria.*

1843. **Atriplex portulacoides** Linn. Spec. 1493. E. B. t. 261. *Obione portulacoides* Moq. Tandon Chenop. 75. — ⊙ — *Habitat in maritimis Europae totius.*

1913. Axyris Linn.

1844. **Axyris amarantoides** Linn. Spec. 1389. Amoen. Academ. III. 24. Schkuhr Handb. t. 285. b. Moquin Tandon Chenop. 79. — ⊙ — *Habitat in Dauria.*

1845. **Axyris hybrida** Linn. Spec 1390. Amoen. Academ. III. 24. Schkuhr Handb. t. 285. b. Moquin Tandon Chenop. 80. — ⊙ — *Habitat in Sibiria.*

1917. Panderia Fisch. et C. A. Meyer.

1846. **Panderia pilosa** Fisch. et C. A. Meyer Index Sem. Hort. Petrop. 1835. II. 46. — ⊙ — *Habitat in montibus Talüsch circa pagos.*

1921. Blitum Linn.

1847. **Blitum capitatum** Linn. Spec. 6 Schkuhr Handb. t. 1. f. 4. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 282. — ⊙ — *Habitat in cultis et glareosis Europae mediae et australis.*

1848. **Blitum virgatum** Linn. Spec. 7. Mer-

tens et Koch Deutschl. Flor. I. 283. — ⊙ — *Habitat in cultis et secus vias Europae mediae et australis.*

1849. **Blitum chenopodioides** Lam. Dict. II. 11. Besser Flor. Gallic. I. 21. — ⊙ — *Habitat in Europa australi et orientali.*

1850 **Blitum rubrum** Reichenb. Flor. germ. 582. *Blitum polymorphum* C. A. Meyer in Ledebour Flor. alt. I. 13. *Chenopodium rubrum* Linn. Spec. 318. Flor. dan. t. 1149. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Europae totius.*

1851. **Blitum glaucum** Koch Synops. 608. *Chenopodium glaucum* Linn. Spec. 320. Flor. dan. t. 1151. — ⊙ — *Habitat in humidis circa pagos Enropae totius.*

1922. Agathophytum Moq. Tand.

1852. **Agathophytum Bonus - Henricus** Moq. Tandon in Nouv Annal. sc. nat. I 291. t. 10. f. C. *Chenopodium Bonus - Henricus* Linn. Spec. 318. E. B. t. 1033. Flor. dan. t. 579. Schult Syst. VI. 252. *Blitum Bonus - Henricus* C. A. Meyer in Ledebour Flor. Alt. I. 11. in not. Koch Synops. 607. — ♃ — *Habitat in ruderatis Europae totius.*

Offic. exolet. Herba Lapathi unctuosi.

1924. Beta Tournef. Mangold.

1853. **Beta vulgaris** Linn. Spec. 322. Plenk. Plant. offic. t. 169 Schkuhr Handb. t. 56. Schultes Syst. V. 290. — ♂ — *Habitat in maritimis regionis mediterraneae.*

1854 **Beta Cicla** Linn. Spec. 322. Plenk. Plant. offic. t. 170. Schultes Syst. V. 291. — ⊙ — *Patria ignota.*

1855. **Beta trigyna** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 34. t. 35 Schultes Syst. V. 292. — ♃ — *Habitat in Hungaria Syrmiensi, Tauria et Iberia.*

1856. **Beta maritima** Linn. Spec. 322. E. B.

t. 285. — ⨀ — *Habitat in littoribus marinis Europae totius.*

1857. **Beta orientalis** Roth Nov. Spec. 181. *Beta bengalensis* Roxburgh Flor. ind. II. 59. *Beta maritima* Bieberst. Flor. Taur. Cauc. I. 192. *Beta foliosa* Ehrenberg msc. — ⨀ — *Habitat in India, Aegypto et Tauria.*

1858. **Beta patula** Aiton Hort. kew. I. 315. Schultes Syst. VI. 293. — ⨀ — *Habitat in Madera.*

1927. Echinopsilon Moq. Tand.

1859. **Echinopsilon eriophorum** Moq. Tandon in Nouv. Annal. sc. nat. II. 127. *Villemetia eriophora* Moq Tandon in Nouv. Annal sc. nat. I. 209. *Kochia eriophora* Schrader Haloph. t. 3. Trattinik Arch. t. 24. *Salsola eriophora; S. eriantha; S. laniflora* Hort. — ⨀ — *Habitat in Hispania et in monte Sinai.*

1860. **Echinopsilon lanatum** Moq. Tandon in Nouv. Annal. sc. nat. II. 127 *Villemetia lanata* Märklin in Schrad. Journ. I. 2. 321. III. 2. 330 Moq. Tandon in Nouv. Annal. sc nat. t 209. *Kochia hyssopifolia* Roth N. Beitr. 176. Schultes Syst. VI. 247. *Suaeda hyssopifolia* Pallas Illustr. t. 36. 37. *Salsola hyssopifolia* Pallas Iter. t. 1. — ⨀ — *Habitat in salsis Sibiriae, regionis caucasico-caspicae et Barbariae.*

1928. Kochia Roth.

1861. **Kochia scoparia** Schrader Haloph. t. 1. f. 1. Schultes Syst. VI. 246. *Salsola scoparia* Bieberst. in Mem. soc. nat. Mosq. I. 144. IV. 17. *Chenopodium Scoparia* Linn. Spec. 321. — ⨀ — *Habitat in aridis Europae australioris et Caucasi.*

Offic. exolet. Herba Linariae Scopariae. Herba Belvedere. Herba studiosorum.

1862. **Kochia sericea** Schrader Haloph. II. Schultes Syst. VI. 250. *Salsola sericea* Aiton Hort. kew. ed. 1. I 317. — ħ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1929. **Cyclolepis** Moq. Tand.

1863. **Cyclolepis platyphylla** Moquin Tandon in Nouv. Annal. sc nat. I. 204 t. 9. f. a. *Salsola platyphylla* Michaux Flor. Bor. Amer. I 174. *Salsola radiata* Desfont. Annal. Mus II. 28. t. 34 *Salsola atriplicifolia* Spreng. Hort. Hall. Suppl. II. 35. *Salsola atriplicis* Schultes Observ. 52. *Kochia atriplicifolia* Roth in Schrad. n. Journ. 1800. p. 305. *Kochia dentata* Willd. Enum. I. 28. *Chenopodium radiatum* Schrader Haloph. t. 1. f. 2. *Salsola chenopodioides; S. latifolia; S. stellata; S. paniculata* Hort. —☉— *Habitat in Americae borealis regione Illinois.*

1930. **Chenopodium.**

1864. **Chenopodium Quinoa** Willd. Spec. I. 1301. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 153. —☉— *Habitat in Chili, in regno Novo-granatensi et Quitensi cultum.*

1865. **Chenopodium hybridum** Linn. Spec. 319. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 295. —☉— *Habitat in cultis Europae totius.*

1866. **Chenopodium urbicum** Linn. Spec. 318. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 295. —☉— *Habitat secus vias et in ruderatis Europae totius.*

1867. **Chenopodium murale** Linn. Spec. 318. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 299. —☉— *Habitat in ruderatis et secus vias Europae totius.*

1868. **Chenopodium album** Smith Flor. Brit. I. 275. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 299. —☉— *Habitat passim in cultis et secus vias Europae totius.*

a. *Spicatum* Koch. *Chenopodium album* Linn. Spec. 319. — b. *Cymigerum* Koch. *Chenopodium viride* Linn. Spec. 319.

1869. **Chenopodium ficifolium** Smith Flor. Brit. I. 276. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 302. —☉— *Habitat in ruderatis Europae mediae.*

1870. **Chenopodium polyspermum** Linn. Spec. 321. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 304.

— ⊙ — *Habitat passim in cultis et ad glareosas fluviorum ripas.*

a. *Cymoso-racemosum* Koch. — b. *Spicato-racemosum. Chenopodium acutifolium* Kitaibel in Schultes Fl. Oest. 1. 458.

1871. **Chenopodium Vulvaria** Linn. Spec. 321. *Chenopodium olidum* Curt. Flor. Lond. III. t. 20. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 304. *Chenopodium foetidum* Lam. Dict. I 196. — ⊙ — *Habitat in fimetis et ruderatis Europae totius.*

Offic. exolet. Herba Atriplicis foetidi.

1872. **Chenopodium caudatum** Jacq. Collect. II. 325. Ic. rar. t. 3. — ⊙ — *Habitat in Guinea.*

1873. **Chenopodium Botrys** Linn. Spec. 321. Sibthorp Flor. graec. t. 253. *Botrydium aromaticum* Spach Suites de Buffon V. 299. *Ambrina Botrys* Moq. Tandon Chenop. 37. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 305. — ⊙ — *Habitat in Europa australi.*

Offic. Herba Botryos vulgaris.

1874. **Chenopodium chilense** Schrader Index Sem. Hort. Götting. 1832. *Ambrina chilensis* Spach Suit. de Buff. V. 297. Moq. Tandon Chenop. 40. — ⊙ — *Habitat in Chili.*

1875. **Chenopodium bonariense** Tenore Index Sem. Hort. Neap. 1833. p. 13. — ⊙ — *Habitat in Bonaria.*

1932. Rhagodia R. Br.

1876. **Rhagodia hastata** R. Brown Prodr. 408. Schultes Syst. V. 567. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia circa Port-Jackson.*

1877. **Rhagodia nutans** R. Brown Prodr. 408. Schultes Syst. V. 568. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

1878. **Rhagodia Billardierii** R. Brown Prodr. 408. Schultes Syst. V. 567. *Chenopodium baccatum* Labillard Nov. Holl. I. 71. t. 96. — ♃ — *Habitat in Van-Diemens-Island.*

1933. Teloxys Moq. Grannenmelde.

1879. **Teloxys aristata** Moq. Tand. in Nouv. Annal. sc. nat. I. 290. *Chenopodium aristatum* Linn. Spec. 321. Schultes Syst. VI. 264. Ledebour Flor. Alt. I. 410. (Gmelin Sibir. III. t. 15. f. 1. Haller Comment. Götting. II. t. 15. f 2.) — ⊙ — *Habitat in siccis arenosis circa Irkutzk et Barnóul.*

1934. Lecanocarpus Nees.

1880. **Lecanocarpus cauliflorus** Nees Amoen. Bot. Bonn. II. 5 t. 2. *Acroglochin chenopodioides* Schrader Catalog. Hort. Götting. 1824 *Blitanthus nepalensis* Reichenb Catalog. Hort. Dresd. 1824. *Amarantus diandrus* Sprengel N. E. III. 20 *Amarantus cauliflorus* Link Enum. II. 389. — ⊙ — *Habitat in Nepalia.*

1935. Hablitzia Bieberst.

1881. **Hablitzia tamnoides** Bieberst. Flor. taur. cauc. III. 170. et 647. Plant. ross. II. t. 54. Reichenb. Iconogr. t. 754. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

1937. Anredera Juss.

1882. **Anredera spicata** Persoon Encheir. I. 297. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 190. Decaisne in Nouv. Annal. sc. nat. IV. 197. *Basella vesicaria* Lam. Dict. I. 382. Illustr. t. 215. f. 1. *Polygonum scandens* Linn. Spec. 522. — ♃ — *Habitat in Antillis et Mexico.*

1938. Boussingaultia H. B. K.

1883. **Boussingaultia baselloides** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VII. 196. t. 645. bis. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

α Vulgaris. Boussingaultia baselloides Hort. Vindob. — *β. Intermedia. Boussingaultia baselloides* Hort. Hügel. — *γ. Crassifolia. Boussingaultia baselloides* Hort. Macquoi.

1939. **Basella** Linn.

1884. **Basella rubra** Linn. Spec. 390. —⊙— *Habitat in India orientali.*

1885. **Basella alba** Linn. Spec. 390. —⊙— *Habitat in India orientali.*

1886. **Basella lucida** Linn. Spec. 390. —⊙— *Habitat in India orientali.*

1887. **Basella ramosa** Jacq. f. Eclog. II. t. 161. Spreng. Syst. I. 450. —♃— *Patria ignota.*

1941. **Suaeda** Forsk.

1888. **Suaeda maritima** Moq Tandon in Nouv. Annal. sc. nat. IV. 217. *Chenopodium maritimum* Linn. Spec. 321. E. B. t. 633 Flor. dan. t. 489. Schultes Syst. VI. 272. —⊙— *Habitat in maritimis Europae totius.*

1889. **Suaeda baccifera** Pallas Illustr. t. 41. *Salsola baccifera* Schrader Haloph. Schultes Syst. VI. 237. *Schoberia baccifera* C. A. Meyer. —⊙— *Habitat in salsuginosis ad Borysthenem.*

1890. **Suaeda altissima** Pallas Illustr. t. 42. *Chenopodium altissimum* Linn. ed. 1. 221. Schrader Haloph. t. 1. f. 3. Schultes Syst. VI. 267. —⊙— *Habitat in salsuginosis Hungariae et Russiae australis.*

1891. **Suaeda fruticosa** Forskael Aegypt. 70. *Chenopodium fruticosum* Schrader Haloph. t. 1. f. 4. Schultes Syst. VI. 265. *Salsola fruticosa* Linn. Spec. 324. Sibthorp Flor. graec. t. 255. E. B. t. 635. — ♄ — *Habitat in maritimis mediterraneis et Angliae.*

1944. **Salsola** Linn.

1892. **Salsola Kali** Linn. Spec. 322. E. B. t. 634. Flor. dan. t. 818. Schultes Syst. V 225. —⊙— *Habitat in littoribus maritimis, et in salsuginosis Europae totius.*

1893. **Salsola ericoides** Bieberst. in Mem. soc. nat. mosq. I. 41. IV. 13. Schultes Syst. VI. 234. —⊙— *Habitat in desertis salsis regionis Caspicae.*

1894. **Salsola Soda** Linn. Spec 323. Jacq. Hort. Vindob. I. t. 68. Schultes Syst. VI. 236. —⊙— *Habitat in maritimis mediterraneis.*

1895. **Salsola brevifolia** Desfont. Flor. atlant. I. 218. Schultes Syst. VI. 239. —♃— *Habitat in sabulosis Barbariae.*

1950. Agriophyllum Bieberst.

1896. **Agriophyllum arenarium** Bieberst. Flor. Taur. cauc. III. 6. in not. *Corispermum pungens* Vahl Enum. I. 117. Bieberst. Op. cit. I. 3. III. 5. Röm. et Schult. Syst. I. 46. *Corispermum squarrosum* Steven in Mem. soc. Mosq. V. 337. —⊙— *Habitat in arenosis aridis deserti caspico-caucasici.*

1951. Corispermum Ant. Juss.

1897. **Corispermum hyssopifolium** Linn. Spec. 6. Pallas Flor. ross. II. t. 98. f. a. excl. b. Sibthorp Fl. graec. t. 1. Vahl Enum. I. 16. Steven in Mem. soc. nat. Mosq. V. 334. —⊙— *Habitat in arvis arenosis Galliae australis, Hungariae et Asiae mediae.*

1898. **Corispermum Mareschalii** Steven in Mem. soc. nat. Mosq. V. 336. Römer et Schult. Mant. I. 63. *Corispermum squarrosum* Vahl Enum. I. 16. *Corispermum bracteatum* Vivian. —⊙— *Habitat ad ripas fluviorum Russiae australis.*

1899. **Corispermum canescens** Kitaibel in Schultes Oesterr. Flor. I. 7. —⊙— *Habitat in Hungaria.*

1900. **Corispermum nitidum** Kitaibel in Schultes Oesterr. Flor. I. 7. *Corispermum purpurascens* Host Flor. austr. I. 318. —⊙— *Habitat in arenosis insularum Danubii.*

1952. Anthochlamys Fenzl.

1901. **Anthochlamys polygaloides.** *Corispermum polygaloides* Fischer et C. A. Meyer Ind.

Sem. Hort. Petrop. 1835. I. 24. —⊙—. *Habitat in montibus Talüsch.*

Genus dubium.

1953. **Monolepis** Schrad.

1902. **Monolepis trifida** Schrader Index Sem. Hort. Götting. 1830 —⊙— *Habitat in America boreali. Mihi nondum floruit.*

Ordo LVI. Amarantaceae.

1954. **Iresine** Willd. Straufsfeder.

Iresine R. Br.

1903. **Iresine celosioides** Linn. Spec. 1456. Michaux Flor. Bor. Amer. II. 244. Willd Spec. IV. 764. —⊙— *Habitat in Virginia et Florida, locis hyeme inundatis.*

1956. **Alternanthera** Forsk.

1904. **Alternanthera sessilis** R. Brown Prodr. 417. Schultes Syst. V. 554 *Illecebrum sessile* Linn. Mant. 345. *Gomphrena sessilis* Linn. Spec. 225. *Paronychia sessilis* Desfont. Cat. Hort. Paris. 1815. p. 54. *Allaganthera Forskalii* Martius Catalog. Hort. Erlang. 69. —♃— *Habitat in Asia tropica.*

1905. **Alternanthera spinosa** Schultes Syst. V. 555. *Achyranthes spinosa* Hornem. Cat. Hort. Hafn. 240 *Achyranthes axillaris* Willdenow Enum. I. 270. *Alternanthera axillaris* DC. Catalog. Hort. Monsp. 77.

1957. **Teleianthera** R. Br.

a. **Bucholzia** Mart.

1906. **Teleianthera frutescens.** *Alternanthera frutescens* R. Brown Prodr. 417. in not. Schultes

Syst. V. 557. *Bucholzia frutescens* Martius in N. A. N. C. XIII. 315. *Illecebrum frutescens* Heritier Stirp. t. 75. t. 37. *Paronychia frutescens* Desfont. Cat. Hort. Paris. 1815. p. 54. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

b. Brandesia Mart.

1907. **Teleianthera porrigens.** *Brandesia porrigens* Martius in N. A. N. C. XIII. 314. *Achyranthes porrigens* Jacq. Hort. Schönbr. t. 350. Sims Bot. Mag. t. 830. Schultes Syst. V. 548. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

c. Mogiphanes Mart.

1908. **Teleianthera brasiliensis.** *Mogiphanes brasiliensis* Martius in N A. N. C. X. 313. *Philoxerus brasiliensis* Schultes Syst. V. 542. *Gomphrena brasiliensis* Jacq. Collect. II. 278. Ic. rar. II. t. 346. — ♃ — *Habitat in Brasilia.*

1958. **Gomphrena** Linn.

1909. **Gomphrena decumbens** Jacq. Hort. Schönbr. IV. t. 482. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 162. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

1960. **Polycnemum** Linn.

1910. **Polycnemum arvense** Linn. Spec. 50. Jacq. Flor. austr. t. 365. — ⊙ — *Habitat in arvis arenosis Europae, Caucasi et Sibiriae.*

1966. **Achyranthes** Linn.

1911. **Achyranthes argentea** Lam. Dict. I. 545. Sibthorp Flor. graec. t. 244. Willd. Spec. I. 1191. Schultes Syst. V. 544. — ♃ — *Habitat in Sicilia et Graecia.*

1912. **Achyranthes aspera** Linn. Spec. 295. Schultes Syst. V. 544. *Achyranthes obtusifolia* Lam. Dict. I. 545. — ♃ — *Habitat inter tropicos Asiae et Africae.*

1968. **Aerva** Forsk.

1913. **Aerva lanata** Jussieu. Schultes Syst. X. 564. *Illecebrum lanatum* Linn. Syst. 206. *Achyranthes lanata* Linn. Spec. 296. —☉— *Habitat in cultis Asiae tropicae.*

1969. **Digera** Forsk.

1914. **Digera arvensis** Forskael Descript. 65. Schultes Syst. V. 535. *Achyranthes polygonoides* Retz Observ. II. 12. —☉— *Habitat in Arabia et Nubia, unde semina misit Th. Kotschy.*

1970. **Desmochaeta** DC.

1915. **Desmochaeta atropurpurea** DC. Catalog. Hort. Monsp. 1813. p. 102. Schultes Syst. V. 549. *Achyranthes atropurpurea* Lam. Dict. I. 546. —? *Achyranthes lappacea* Linn. Spec. 295. —♃— *Habitat in India orientali.*

1916. **Desmochaeta flavescens** DC. Catalog. Hort. Monsp. 1813. p. 102. Schultes Syst. V. 550. *Achyranthes echinata* Retz Observ. II. 12. —♃— *Habitat in India orientali.*

1971. **Pupalia** Mart.

1917. **Pupalia densiflora** Martius Nov. gen. et sp. II. 61. t. 156. 158. *Desmochaeta uncinata* Schultes Syst. V. 554. *Achyranthes uncinata* Willd. msc. —♃— *Habitat in America tropica.*

1972. **Amarantus** Linn. Amarant.

1918. **Amarantus tenuifolius** Willdenow Spec. IV. 381. —☉— *Habitat in India orientali.*

1919. **Amarantus angustifolius** Bieberst. ex Willdenow Spec. IV. 381. —☉— *Habitat ad mare Caspium.*

1920. **Amarantus tricolor** Linn. Spec. 1403. Knorr Delic. II. t. A. 3—5. Willdenow Amarant. 19.

Spec. IV. 383. —⊙— *Habitat in India orientali et China.*

1921. **Amarantus caudatus** Linn. Spec. 1406. Willdenow Amarant. 36. Spec. IV. 393. —⊙— *Habitat in India orientali, Zeylona et Persia.*

1922. **Amarantus flavus** Linn. Spec. 1406. Willdenow Amarant. 35. t. 3. f 6. Spec. IV. 391. —⊙— *Habitat in India orientali.*

1923. **Amarantus speciosus** Ker in Bot. Mag. t. 2227. —⊙— *Habitat in Nepalia.*

1924. **Amarantus paniculatus** Linn. Spec. 1406. Willdenow Amarant 32. t. 2. f. 4. Spec. IV. 390. —⊙— *Habitat in America boreali.*

β. *Glomeratus.* — γ. *Virens.*

1925. **Amarantus retroflexus** Linn. Spec. 1407. Willdenow Amarant. 33. t. 11. f. 21. Spec. IV. 391. —⊙— *Habitat in Pensylvania.*

1926 **Amarantus hybridus** Linn. Spec. 1406. Willdenow Amarant. 26. t. 9. f. 17. Spec. IV. 389. —⊙— *Habitat in Virginia.*

1927. **Amarantus graecizans** Linn. Spec. 1405. Willdenow Amarant. 8. t. 4. f. 7. Spec. IV. 382. —⊙— *Habitat in Virginia.*

1928. **Amarantus parisiensis** Schkuhr Handb. 247. —⊙— *Patria ignota.*

1929. **Amarantus inamoenus** Willdenow Amarant. t. 7. f. 14. Spec. IV. 386. —⊙— *Habitat in Japonia.*

1930. **Amarantus sanguineus** Linn. Spec. 1407. Willdenow Amarant. 31. t. 2. f. 3. Spec. IV. 390. —⊙— *Habitat in insulis Bahama.*

1931. **Amarantus viridis** Linn. Spec 1405. Willdenow Amarant. 18. t. 8. f 16. Spec. IV. 388. —⊙— *Habitat in Jamaica, Brasilia, Africa boreali.*

1932. **Amarantus spinosus** Linn. Spec. 1407. Willdenow Amarant. 38. t. 4. f. 8. Spec. IV. 393. —⊙— *Habitat in Antillis, India orientali et insula Borbonia.*

1933. **Amarantus lineatus** R. Brown Prodr. — — *Habitat in Nova Hollandia.*

1934. **Amarantus bullatus** Besser ex Link Enum. II. 388. —⊙— *Patria ignota.*

1972. Albersia Kunth.

1935. **Albersia polygonoides.** *Amarantus polygonoides* Linn. Spec. 1405. Willdenow Amarant. 11. t. 6. f. 12. *Römeria polygonoides* Mönch. —⊙— *Habitat inter tropicos totius orbis.*

1936. **Albersia oleracea.** *Amarantus oleraceus* Linn. Spec. 1403. Willdenow Amarant. t. 5. f. 9. —⊙— *Habitat in India orientali.*

1975. Celosia Linn.

1937. **Celosia virgata** Jacq. Collect. II. 279. Ic. rar. t. 339. Willd. Spec. I. 1201. *Lestibudesia virgata* Schultes Syst. V. 533. —⊙— *Habitat in Columbia.*

1938. **Celosia cernua** Andrews Bot. Reposit. t. 635. —⊙— *Patria ignota.*

1939. **Celosia melanocarpos** Poiret Suppl. IV. 319. Schultes Syst. V. 531. —⊙— *Habitat in Senegambia et in Senaar, unde semina misit Theodorus Kotschy.*

1940. **Celosia trigyna** Willdenow Spec. I. 1201. Jacq. Hort. Vindob. III. t. 15. *Lestibudesia trigyna* Schultes Syst. V. 534. —⊙— *Habitat in Senegambia.*

1978. Deeringia R. Br.

1941. **Deeringia celosioides** R. Brown Prodr. 413. Schultes Syst. V. 534. excl. syn. Hooker in Bot. Mag. t. 2717. Endl. Iconogr. t. 62. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia tropica et orientali.*

1942. **Deeringia indica** Spreng. Syst. I. 816. *Celosia baccata* Retz Observ. V. 23. Willd. Spec. I. 1202. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

Ordo LVII. Polygoneae.

1979. **Pterostegia** Fisch. et Mey.

1943. **Pterostegia drymarioides** Fischer et C. A. Meyer Index Sem. Hort. Petrop. 1835. II. 48. — ⨀ — *Habitat ad portum Bodega Novae Californiae.*

1984. **Rheum** Linn. Rhabarber.

1944. **Rheum rhaponticum** Linn. Spec. 531. Plenk Plant. med. t. 320. Hayne Arzneigew. XII. t. 7. Nees jun. Plant. offic. t. 113. 114. 115. *Rhaponticum* Alpinus Rhapont. I. t. 1. — ♃ — *Habitat juxta orientale ponti Euxini littus, frequentius ad septemtrionem maris Caspici, in desertis inter Volgam et Yaik, nec non in Sibiriae montibus Krasnojar.*

Officin. Radix Rhapontici, Rhapontici v., eri s. moscovitici v. sibirici. — Colitur in Gallia prope Lorient.

1945. **Rheum caspicum** Fischer ex Lindley Med. Flor. 357. — ? *Rheum rhaponticum* Ledebour Flor. alt. II. 91. — ♃ — *Habitat ad mare Caspicum.*

1946. **Rheum undulatum** Linn. Spec. 531. Amoen. Academ. III. 212. t. 4. Plenk Plant. med. t. 321. Hayne Arzneigew. XII. t. 8. Nees jun. Plant. offic. t. 116. 117. *Rheum rhabarbarum* Linn. Syst. 385. — ♃ — *Habitat in Bucharia.*

Officin. Radix Rhei bucharici. Olim in Russia, nunc hinc inde in Gallia cultum.

1947. **Rheum palmatum** Linn. Spec. 531. Plenk Plant. med. t. 322. Hayne Arzneigew. XII. t. 6. Nees Plant. offic. XVI. t. 6. 8. — ♃ — *Habitat in jugo montium aridorum Tatariae sinicae, ab urbe Selia ad lacum Kokonor protenso.*

Hanc speciem Rhei rossici v. moscovitici matrem hodiedum putant pharmacognostae peritiores.

1948. **Rheum hybridum** Murray Comment. Götting. II. t. 1. Nees jun. Plant. offic. Suppl. II. t. 1. — ♃ — *Hybrida Rhei palmati et Rh. undulati proles, in hortis enata.*

Species frequentissime in hortis Angliae culta. Petioli inter

olera, flores juniores cum offis. (Rhabarb. Pye v. Spring Tort) parati inter lautiorum delicias. Ex hujus et sequentium specierum petiolis Galli » Syrupum petiolorum Rhei « parant.

1949. **Rheum compactum** Linn. Spec. 531. Miller Ic. t. 218. Hayne Arzneigew. XII. t. 9. —♃— *Habitat in Tataria.*

Colitur in Gallia, Rheo moscovitico admiscenda.

1950. **Rheum leucorhizum** Pallas in Nov. Comment. Petrop. X. 381. Ledebour Flor. Alt. II. 92. Ic. t. 491. *Rheum nanum* Sievers in Pallas nord. Beitr. VII. 264. —♃— *Habitat in lapidosis montium Dolenkara, Tschingistan et Arkalyki deserti Soongoro-Khirghisici, nec non prope fluvios Dschargurban et Kurtschum.*

Speciem hanc » Radicem Rhei albi s. imperialis « aulae petropolitanae privam largiri, nonnulli perhibent.

1951. **Rheum tataricum** Linn. Suppl. 229. Willdenow Spec. II. 490. —♃— *Habitat in Tataria minori.*

1952. **Rheum tetragonopus** Martius Ind. Sem. Hort. Monac. 1840. n. 8. —♃— *Patria ignota.*

1953. **Rheum crassinervium** Fischer et Lindley Med. Flor. 950. Martius Ind. Sem. Hort. Monac. 1840. n. 9. —♃— *Patria ignota.*

Radicem Rheo moscovitico non multum cedere perhibent Angli.

1954. **Rheum Emodi** Wallich Catalog. n. 1727. Hooker in Bot. Mag. t. 3508. *Rheum australe* Don Nepal. 75. Sweet Fl. gard. t. 269. —♃— *Habitat in Kamaon montibus Gossain-Than.*

Plantam vanis rumoribus multum venditatam Rhei moscovitici matrem non esse, satis nunc constat.

1955. **Rheum Ribes** Gronov. Orient. 130. Aiton Hort. kew. ed. 1. II. 42. Desfont. Annal. Mus. II. t. 94. —♃— *Habitat in Persia, Libano et Carmelo.*

Ex hujus speciei caulibus et petiolis » Roob Ribis « ab Arabibus olim paratum.

1986. Polygonum Linn. Knöterich.

a. Bistorta Tournef.

1956. **Polygonum Bistorta** Linn. Spec. 516. E. B. t. 509. Flor. dan. t. 421. Meisner Polygon. 51.

— ♃ — *Habitat in pratis montanis et alpinis humidis Europae totius.*

Offic. Radix Bistortae.

1957. **Polygonum amplexicaule** Don Nepal. 70. Meisner Polygon. 51. Lindley in Bot. Reg. 1839. t. 46. — ♃ — *Habitat in India boreali.*

1958. **Polygonum viviparum** Linn. Spec. 516. E. B. t. 669. Meisner Polygon. 52. — ♃ — *Habitat in pascuis alpinis et subalpinis Europae totius.*

b. **Amblygonon** Meisn.

1959. **Polygonum orientale** Linn. Spec. 519. Curtis Bot. Mag. t. 213. Meisner Polygon. 54. — ♃ — *Habitat in Oriente, India, Capite bonae spei et Nova Hollandia, passim in hortis cultum.*

c. **Persicaria** Tournef.

1960. **Polygonum amphibium** Linn. Spec. 517. E. B. t 436. Flor. dan. t. 182. Meisner Polygon. 67. — ♃ — *Habitat in fossis et inundatis Europae totius et Sibiriae.*

1961 **Polygonum Persicaria** Linn. Spec. 518. E. B. t. 756. Flor. dan. t. 702. Meisner Polygon. 68. — ♃ — *Habitat in inundatis hemisphaerae borealis.*

1962. **Polygonum Donii** Meisner Polygon. 72. *Polygonum hispidum* Don Nepal. 71. — ⊙ — *Habitat in Nepalia.*

1963. **Polygonum Hydropiper** Linn. Spec. 517. E. B. t. 989. Meisner Polygon. 76. — ⊙ — *Habitat in fossis Europae totius, Sibiriae et Americae borealis.*

1964. **Polygonum tinctorium** Loureir. Flor. cochinch. 1. 297. Aiton Hort. kew. ed 2. II 31. Meisner Polygon. 81. — ♃ — *Habitat in China.*

1965. **Polygonum virginianum** Linn. Spec. 516. Michaux Flor. Bor. Amer. I. 238. Meisner Polygon. 81. — ♃ — *Habitat in sylvis umbrosis Carolinae et Virginiae.*

d. **Aconogonon** Meisn.

1966. **Polygonum alpinum** Allioni Flor.

pedemont. II. 206. t. 68. f. 1. Meisner Polygon. 56. — ♃ — *Habitat in vallibus alpium Europae totius.*

β. *Undulatum. Polygonum undulatum* Murray Comment. Götting. 1774. p. 34. t. 5. *Polygonum sibiricum* Linn. Suppl. 228. — Habitat in Sibiria.

1967. **Polygonum divaricatum** Linn. Spec. 520. Meisner Polygon. 57. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

β. *Acidulum. Polygonum acidulum* Willd. Enum. 429.

1968. **Polygonum Laxmanni** Lepechin ex Sprengel Nov. prov. 34. Syst. II. 256. Meisner Polygon. 57. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

e. **Avicularia** Meisn.

1969. **Polygonum elegans** Tenore Flor. Neap. I. 207. t. 3. Meisner Polygon. 86. — ♃ — *Habitat in Italia australi et Lusitania.*

1970. **Polygonum arenarium** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 69. t. 67. Meisner Polygon. 87. — ⊙ — *Habitat in arenis Hungariae et Ucraniae.*

1971. **Polygonum aviculare** Linn. Spec. 519. Meisner Polygon. 87. excl. synon. nonnull. — ⊙ — *Habitat in viis tritis totius fere orbis.*

1972. **Polygonum oxyspermum** Meyer et Bunge ex Ledebour Hort. Dorp. 1815. p. 5. — ⊙ — *Habitat in Sibiria.*

1973. **Polygonum alpestre** C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. 157. — ♃ — *Habitat in rupestribus alpinis montis Kasbek.*

1974. **Polygonum Bellardi** Allioni Flor. Pedement. t. 90. f. 2. Willdenow Spec. II. 450. — ⊙ — *Habitat in viis et agris arenosis Europae australioris.*

1975. **Polygonum maritimum** Linn. Spec. 519. Meisner Polygon. 89. — ♃ — *Habitat in littoribus mediterraneis et atlanticis Europae et Americae borealis.*

f. **Tiniaria** Meisn.

1976. **Polygonum Convolvulus** Linn. Spec.

montevidensis Sprengel Cur. post. 144. — ♃ — *Habitat in America australi extratropica.*

1994. **Rumex brasiliensis** Link Enum. I. 349. Schultes f. Syst. VII. 1417. *Rumex incomptus* Weinmann in Flora 1821. p. 28. — ⊙ — *Habitat in Brasilia*

1995. **Rumex salicifolius** Weinm. in Flora 1821. p. 28. Cham. et Schlechtend. in Linnaea III. 60. Schultes f. Syst. VII. 1418. — ♃ — *Habitat ad portum St. Francisci Californiae.*

1996. **Rumex Britannica** Linn. Spec. 476. Schultes f. Syst. VII. 1420. — ♃ — *Habitat in paludosis Americae borealis a Canada ad Carolinam.*

1997. **Rumex domesticus** Hartm. Fl. Scand. 1. 148. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 617. Reichenb. Iconogr. t. 345. Schultes f. Syst. VII. 1424. — ♃ — *Habitat in ruderatis Europae borealis, nec non Asiae et Americae arcticae.*

1998. **Rumex aquaticus** Linn. Spec. 479. Mertens et Koch Deutschl. Flor. II. 617. Reichenb. Iconogr. t. 369. Schultes f. Syst. VII. 1425. — ♃ — *Habitat in fossis Europae mediae.*

1999. **Rumex Hydrolapathum** Hudson Flor. Angl. 154. Reichenb. Iconogr. t. 370. *Rumex longifolius* DC. Fl. fr. Suppl. 568. — ♃ — *Habitat in fossis Europae totius.*

2000. **Rumex Fischeri** Reichenb. Iconogr. IV. p. 58. Schultes f. Syst. VII. 1431. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2001. **Rumex Patientia** Linn. Spec. 476. Schkuhr Handb. t. 100. Campdera Rum. 102. Schultes f. Syst. VII. 1432. — ♃ — *Habitat in pratis et secus rivulos Europae australioris.*

2002. **Rumex confertus** Willdenow Enum. 397. Campdera Rum. 107. t. 2. f. 2. Besser Volhyn. 14. — ♃ — *Habitat in Volhynia.*

2003. **Rumex undulatus** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 3. p. 389. Besser Volhyn. 14. — ♃ — *Habitat in Volhynia.*

2004. **Rumex cristatus** DC. Catalog. Hort. Monsp. 1813. p. 139. Campdera Rum. 104. Schultes f. Syst. VII. 1436. — ♃ — *Patria ignota.*

2005. **Rumex roseus** Linn. Spec. 480. Sibthorp. t. 346. Campdera Rum. 128. Schultes f. Syst. VII. 1462. — ⊙ — *Habitat in Aegypto et Cypro.*

2006. **Rumex vesicarius** Linn. Spec. 479. Campdera Rum. 129. t. 3. f. 1 — 8. Schultes f. Syst. VII. 1462. — ⊙ — *Habitat in maritimis Siciliae et Barbariae.*

b. **Rumastra** Campd.

2007. **Rumex abyssinicus** Jacq. Hort. Vindob. III. 48. t. 93. Mirbel in Annal. Mus. XIII. t. 4. f. 46. Campdera Rum. 108. t. 3. f. 7. Schultes f. Syst. VII. 1441. *Rumex arifolius* Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 487. — 5 — *Habitat in Abyssinia.*

c. **Acetosae** Campd.

2008. **Rumex montanus** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 2. p. 48. Schultes f. Syst. VII. 1443. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae totius.*

2009. **Rumex Acetosa** Linn. Spec. 481. E. B. t. 127. Schultes f. Syst. VII. 1450. — ♃ — *Habitat in pratis et pomariis Europae totius et Sibiriae.*

2010. **Rumex thyrsoides** Desfont. Flor. atlant. I. 321. Campdera Rum. 119. Schultes f. Syst. VII. 1452. *Rumex intermedius* Gussone Prodr. Flor. sic. I. 449. — ♃ — *Habitat in regione mediterranea.*

2011. **Rumex hastaefolius** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 290. III. 280. Link Enum. I. 351. Campdera Rum. 135. — ♃ — *Habitat in rupestribus Caucasi.*

2012. **Rumex Lunaria** Linn. Spec. 479. Campdera Rum. 136. t. 2. f. 5. Schultes f. Syst. VII. 1470. — ♃ — *Habitat in insulis Canariis.*

2013. **Rumex Bucephalophorus** Linn. Spec. 479. Sibthorp Flor. graec. t. 345. Campdera

522. E. B. t. 941. Flor. dan. t. 744. Meisner Polygon 63. —☉— *Habitat in dumetis Europae totius, Sibiriae et Americae borealis.*

1977. **Polygonum dumetorum** Linn. Spec. 522. Flor. dan. t. 756. Meisner Polygon. 63. *Polygonum scandens* Linn. Spec. 522. —♃— *Habitat in dumetis et sepibus Europae totius, Sibiriae et Americae borealis.*

Dubiae sectionis.

1978. **Polygonum complexum** A. Cuningh. in Annal. of nat. hist. I. 454. — ♄ — *Habitat in Novae Zeelandiae borealis littoribus arenosis, prope Bay of Islands dumos densos formans. (Hügel.) Nondum floruit, nec siccam vidi nisi sterilem.*

1987. **Fagopyrum** Tournef. Buchweitzen.

1979. **Fagopyrum esculentum** Mönch Method. 290. *Polygonum Fagopyrum* Linn. Spec. 522. E. B. t. 1044. Meisner Polygon. 61. —☉— *Habitat in Asia media, per omnem Europam culta.*

1980. **Fagopyrum tataricum** Gärtner Carp. II. 182. t. 119. *Polygonum tataricum* Linn. Spec. 521. Meisner Polygon. 62. —☉— *Habitat in Tataria, in Europa »Frumenti saracenici« nomine cultum.*

1989. **Calligonum** Linn. Flügelnufs.

1981. **Calligonum Pallasia** Aiton Hort. kew. ed. 1. II. 242. Willdenow Spec. II. 927. *Calligonum polygonoides* Pallas It. III. 536. *Pallasia caspica* Linn. f. Suppl. 252. *Pterococcus aphyllus* Pallas It. II. App. p. 738. t. 5. — ♄ — *Habitat in Sibiriae collibus arenosis.*

1990. **Coccoloba** Jacq. Ampferbaum.

1982. **Coccoloba uvifera** Linn. Spec. 523. Jacq. Amer. 112. t. 73. Willd. Spec. II. 457. —♄— *Habitat in America tropica.*

1983. **Coccoloba pubescens** Linn. Spec. 523. Willd. Spec. IV. 457. *Coccoloba grandifolia* Jacq. Amer. 113. — ♄ — *Habitat in America tropica cis aequatorem.*

1984. **Coccoloba excoriata** Linn. Spec. 524. Willd. Spec. IV. 458. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1985. **Coccoloba punctata** Linn. Spec. 523. Willd. Spec. IV. 459. *Coccoloba coronata* Jacq. Amer. 114. t. 77. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1986. **Coccoloba laurifolia** Willd. Enum. 431. Link Enum. I. 386. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1987. **Coccoloba fagifolia** Hort. Carlsruh. — ♄ — *Patria ignota.*

1988. **Coccoloba ferruginea** Hort. Berolin. — ♄ — *Patria ignota.*

1993. **Rumex** Linn. Ampfer.

a. **Lapatha** Campd.

1989. **Rumex ucranicus** Fischer ex Spreng. Nov. Prov. 36. Schultes f. Syst. VII. 1393. — ☉ — *Habitat in Ucrania.*

1990. **Rumex pulcher** Linn. Spec. 477. E. B. t. 1576. Campdera Rum. 82. Schultes f. Syst. VII. 1399. — ☉ — *Habitat in glareosis Europae mediae et australis.*

1991. **Rumex hamatus** Treviran. in N. A. N. C. XIII. 174. Schultes f. Syst. VII. 1401. *Rumex uncatus* et *uncinatus* Hort. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

1992. **Rumex sanguineus** Linn. Spec. 476. E. B. t. 1533. Campdera Rum. 93. Schultes f. Syst. VII. 1415. — ♃ — *Habitat in paludosis Europae totius et Americae borealis.*

1993. **Rumex cuneifolius** Campdera Rum. 95. Sprengel Syst. II. 159. Cham. et Schlechtend. in Linnaea III. 58. Schultes f. Syst. VII. 1416. *Rumex*

2004. Oxybaphus Herit.

2027. **Oxybaphus viscosus** Heritier Monogr. c. ic. Vahl Enum. II. 39. Bot. Mag. t. 434. Römer et Schultes Syst. I. 549. *Calyxhymenia viscosa* Ruiz et Pav. Flor. Peruv. I. 46. *Mirabilis viscosa* Cavanill. Ic. t. 19. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

2028. **Oxybaphus glabrifolius** Vahl Enum. II. 40. Römer et Schult. Syst. I. 549. *Calyxhymenia glabrifolia* Ortega Decad. V. t. 1. *Calymenia corymbosa* Persoon Encheir. I. 37. *Mirabilis corymbosa* Cavanill. Ic. t. 379. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

2005. Allionia Linn.

2029. **Allionia nyctaginea** Michaux Flor. Bor. Amer. I. 100. Römer et Schult. Syst. III. 89. *Calymenia nyctaginea* Nuttall Gen. Am. I. 26. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2030. **Allionia ovata** Pursh Flor. Bor. Am. I. 197 Röm. et Schult. Mant. III. 46. *Calymenia ovata* Nuttall Gen. Am. I. 26. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2008. Bugenvillea Commers.

2031. **Bugenvillea rubicunda** Schott msc. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

2011. Neea Ruiz et Pav.

2032 **Neea glabra** Schott msc. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

2033. **Neea hirsuta** Schott msc. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

2034. **Neea lancifolia** Schott msc. — ♄ — *Habitat in Brasilia.*

2012. Pisonia Plum.

2035. **Pisonia aculeata** Linn. Spec. 1511. Jacq. Amer. 274. Willdenow Spec. II. 283. Link Enum. II. 353. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

2036. **Pisonia fragrans** Link Enum. I. 353. — ♄ — *Patria ignota.*

2037. **Pisonia obovata** Link Enum. I. 354. — ♄ — *Patria ignota.*

2038. **Pisonia subcordata** Swartz Flor. Ind. occid. II. 641. Willdenow Spec. II. 283. — ♄ — *Habitat in Antigoa.*

2039. **Pisonia mexicana** Willd. Suppl. 20. Link Enum. I. 354. *Boerhavia arborea* Lagasca ex Röm. et Schult. Syst. I. 66. *Boerhavia arborescens* Persoon Encheir. I. 30. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

2040. **Pisonia Brunoniana** Endl. Flor. Norf. n. 88. Iconogr. t. 60. — ♄ — *Habitat in insula Norfolk.*

Ordo LIX. Monimiaceae.

2019. Boldoa Juss.

2041. **Boldoa fragrans.** *Peumus fragrans* Persoon Encheir. II. 624. *Peumus Boldus* Molina Chili 200. *Ruizia fragrans* Pavon Syst. 266—268. Endlicher Iconogr. t. 21. — ♄ — *Habitat in reipublicae chilensis sylvis, nec non in campis arenosis et maritimis.*

Ordo LX. Laurineae.

2023. Cinnamomum Burm. Zimmtbaum.

2042. **Cinnamomum nitidum** Fr. Nees Plant. Offic. Suppl. IV. t. 8. Nees Laurin. 43. *Laurus nitida* Roxburgh Hort. Calc. 30. — ♄ — *Habitat in Sumatra, Malayis* » Coolit manes « *dicta.*

2043. **Cinnamomum aromaticum** Nees Laurin. 52. *Cinnamomum Cassia* Nees jun. et Dierb. Handb. II. 424. Hayne Plant. med. XII. t. 23. *Laurus Cassia* Nees fratr. Cinnam. t. 3. *Laurus Cinnamomum* Andrews Bot. Reposit. t. 595. *Persea Cassia* Sprengel Syst. II. 267. — ♄ — *Habitat in China, ubi vulgo* » *Iu-kiouei* « *dicitur.*

» Cortex et petioli Cinnamomi gaudent sapore et odore acri

Rum. 139. t. 3. f. 2. Schultes f. Syst. VII. 1472. — ⊙ — *Habitat in littoribus mediterraneis.*

1994. **Tragopyrum** Bieberst.

2014. **Tragopyrum lanceolatum** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. III. 285. *Polygonum frutescens* Linn. Spec. 516. Lam. t. 315. f. 2. Gärtner Carp. t. 119. f. 5. — ♄ — *Habitat in Sibiria.*

1996. **Atraphaxis** Linn.

2015. **Atraphaxis spinosa** Linn. Spec. 475. Heritier Nov. Stirp. t. 14. Gärtner Carp. t. 119. Schultes f. Syst. VII. 1380. — ♄ — *Habitat in Persia, Tauria et Sibiria.*

2016. **Atraphaxis undulata** Linn. Spec. 475. Schultes f. Syst VII. 1382. *Polygonum atraphaxoides* Thunb. Prodr. 77. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

1997. **Triplaris** Linn.

2017. **Triplaris Americana** Linn. Spec. 130. Bredemey. in Willdenow Spec. IV. 812. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

1998. **Brunnichia** Banks.

2018. **Brunnichia cirrhosa** Banks apud Gärtner Carp. I. 213. t. 45. Nuttall Gen. I. 256. — ♄ ◌ — *Habitat in America boreali.*

Ordo LVIII. Nyctagineae.

2000. **Boerhavia** Linn.

2019. **Boerhavia erecta** Linn. Spec. 4. Jacq. Hort. Vindob. t. 5. 6. Vahl Enum. 1. 284. Römer et Schult. Syst. 1. 63. Mant. I. 71. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

2020. **Boerhavia viscosa** Lagasca et Rod-

rig. in Anal. cienc. nat. IV. 256. Vahl Enum. I. 288. Römer et Schultes Syst. I. 66. Mant. I. 74. — ♃ — *Habitat in Peruvia et Quito.*

2021. **Boerhavia hirsuta** Linn. Mant. 170. Jacq. Hort. Vindob. t. 7. Vahl Enum. II. 286. Römer et Schultes Syst. I. 65. Mant. I. 73. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

2022. **Boerhavia scandens** Linn. Spec. 4. Jacq. Hort. Vindob. t. 4. Vahl Enum. I. 289. Römer et Schultes Syst I. 66. Mant. I. 74. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

2003. **Mirabilis** Linn.

2023. **Mirabilis dichotoma** Linn. Spec. 252. Röm. et Schultes Syst. IV. 1. *Jalapa officinarum* Martin. Cent. I. t. 1. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

Var. β. *Major.* — γ. *Pallida.*

2024. **Mirabilis Jalapa** Linn. Spec. 252. Röm. et Schultes Syst. IV. 1. *Nyctago hortensis* Curtis Bot. Mag. t. 371. *Jalapa congesta* Mönch Method. 508. — ♃ — *Habitat in India orientali et occidentali.*

Folia oblique cordata, supra margineque pubescentia, petiolata. Flores congesti, subdeni, breviter pedicellati. Involucrum basi cuneatum, usque ad medium quinquefidum. Perigonii infundibuliformis tubus involucrum ter, limbum bis superans. Ovaria tenuiter sed dense pubescentia. Fructus parce pubescentes, obsolete quinquequetri.

Var. a. *Alba.* — b. *Coccinea.* — c. *Lutea.*

2025. **Mirabilis planiflora** Trautvett. in Bullet. Academ. St. Petersb. Tom. VI. n. 14. — ♃ — *Patria ignota.*

Folia oblique cordata, supra margineque pubescentia, petiolata. Flores congesti, subdeni, subsessiles. Involucrum basi truncatum, fere ad basim quinquepartitum Perigonii hypocraterimorphi tubus involucrum ter, limbum bis superans. Ovaria fructusque glabri, decangulati, angulis alternis acutis.

2026. **Mirabilis longiflora** Linn. Spec. 252. Smith Exot. Bot. I. 43. t. 23. Römer et Schult. Syst. IV. 2. *Jalapa longiflora* Mönch Method. 508. — ♃ — *Habitat in montibus Mexici.*

et praestantissimo, folia autem, saltem in cultis caldariorum nostrorum, fere insipida sunt, mucilaginosi magis saporis et subausteri, neque Cinnamomi, neque Caryophyllorum aliquid prodentis.« Nees l. c.

2044. **Cinnamomum zeylanicum** Blume Bydr. 568. Nees Laurin. 45. Hayne Plant. med. XII. t. 20. *Persea Cinnamomum* Sprengel Syst. II. 267. *Laurus Cinnamomum* Nees fr. Cinnam. 48. *Laurus Cassia* Curt. Bot. Mag. t. 1636. excl. synon. — ♄ — *Arbuscula v. frutex in Zeylona spontanea, inter tropicos totius orbis colitur.*

2024. **Camphora** Nees. Kampherbaum.

2045. **Camphora officinarum**. Bauhin Pinax 500. Blackwell Herb. t. 347. Nees Laurin. 88. *Cinnamomum Camphora* Nees jun. Plant. offic. 8. t. 24. *Persea Camphora* Sprengel Syst. II. 268. *Laurus Camphora* Linn. Mat. med. 107. Jacquin Collect. IV. 221. t. 3. f. 2. *Laurus camphorifera* Kämpfer Amoen. exot. 770. t. 771. — ♄ — *Habitat in Japonia et China.*

»Ex hujus arboris ligno, ramis foliisque concisis sicca destillatione paratur Camphora chinensis sive japonica, quae intra alembica e terra cocta stramineque oryzeo juncisve repleta excepta, in Europam transvehitur, nostrisque in terris iterata destillatione adjecta calce viva aut carbone depuratur, ac in medicina adhibetur. Est Stearopteni species, post evaporatum arboris vivae Elaeoptenum (sive oleum aethereum) residua.« Nees l. c.

2027. **Persea** Gärtn.

2046. **Persea indica** Sprengel Syst. II. 268. Nees Laurin. 135. *Laurns indica* Linn. Spec. 529. Wendland Observ. 21. t. 3. f. 22. — ♄ — *Habitat in insula Madeira, ubi vulgo »Viñatico« dicitur, ligno Swieteniae et pulchritudine et duritie aequiparando.*

2057. **Benzoin** Nees.

2047. **Benzoin aestivale** Nees Laurin. 495. *Laurus Benzoin* Willd. Baumz. 207. Hayne Dendrogr. Flor. 52, non Linn. *Laurus aestivalis* Wangenh. Beitr. 87. *Evosmus aestivalis* Nuttall Gen. amer. I. 259. —

— ♄ — *Habitat in America boreali, passim pro Lauro Benzoin Linn., quae Benzoin odoriferum Nees, in hortis cultum.*

Folia in nostro oblongo-acuminata, umbellulae florum praecocium subsolitariae, sessiles, gemmae florales glabrae, in illo vix in Europa culto, folia oblonga v. elliptico-cuneiformia, umbellulae praecoces aggregatae, pedunculatae, gemmae glabriusculae.

2059. Tetranthera Jacq.

2048. **Tetranthera laurifolia** Jacq. Hort. Schönbr. I. 59. t. 113. Nees Laurin. 519. *Tomex Tetranthera* Willd. Spec. II. 839. *Litsaea Tetranthera* Persoon Encheir. II. 4 *Litsaea Chinensis* Lam. Dict. III. 574. — ♄ — *Habitat in China et in India orientali.*

2061. Laurus Tournef.

2049. **Laurus nobilis** Linn. Mat. med. 107. Nees jun. Plant. offic. V. t. 13. Nees Laurin. 579. *Laurus vulgaris* Bauhin. Pinax. 460. Duham. Arbr. t. 134. 135. — ♄ — *Habitat in Asia minori, nunc per regionem mediterraneam diffusa.*

Ordo LXI. Gyrocarpeae.

2068. Gyrocarpus Jacq.

2050. **Gyrocarpus americanus** Jacq. Amer. 282. t. 178. f. 80. Lam. t. 850. f. 1. — ♄ — *Habitat in sylvis Carthagenae.*

2051. **Gyrocarpus asiaticus** Willdenow Spec. IV. 982. *Gyrocarpus Jacquini* Roxburgh Plant. Corom I. 1. t. 1. excl. synon. Jacq. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

Ordo LXII. Santalaceae.

2072. Thesium Linn.

2052. **Thesium intermedium** Schrader Spicileg. 27. *Thesium linophyllum* Pollich Flor. Palat. 1.

238. — ♃ — *Habitat in pratis montanis virgultosis Europae fere totius.*

2078. **Osyris** Linn.

2053. **Osyris alba** Linn. Spec. 1450. — ♄ — *Habitat in sterilibus rupestribus Europae australis.*

Ordo LXIII. Daphnoideae.

2091. **Dirca** Linn.

2054. **Dirca palustris** Linn. Spec. 512. Lam. Illustr. t. 293. Duhamel Arbr. I. t. 212. — ♄ — *Habitat in paludibus Virginiae.*

2092. **Daphne** Linn. Kellerhals.

2055. **Daphne Mezereum** Linn. Spec. 509. Wagner Pharm. Bot. t. 85. — ♄ — *Habitat in nemoribus montanis, primo vere florens.*

Offic. Cortex Mezerei.

2056. **Daphne Laureola** Linn. Spec. 510. Jacq. Flor. austr. t. 183. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis.*

2057. **Daphne pontica** Linn. Spec. 511. Bot. Mag. t 1282. — ♄ — *Habitat in Imeretia.*

2058. **Daphne Gnidium** Linn. Spec. 511. Hayne Arzneigew. III. t. 23. — ♄ — *Habitat in Europa mediterranea.*

2059. **Daphne altaica** Pallas Flor. ross. I. 53. t. 35. Wickström Daphne 25. — ♄ — *Habitat in alpibus Sibiriae altaicae.*

2060. **Daphne alpina** Linn. Spec. 510. — ♄ — *Habitat in rupestribus alpinis.*

2061. **Daphne Blagayana** Freyer in Flora 1838. I. 176. — ♄ — *Habitat in sylva St. Laurenti prope Pilichgratz Carnioliae.*

2062. **Daphne Cneorum** Linn. Spec. 510. Jacq. Flor. austr. t. 426. — ♄ — *Habitat in pascuis*

siccis Europae australioris, in Austria circa Bruk ad Laytham frequens.

2063. **Daphne odora** Thunberg Flor. jap. 159. Banks Ic. Kämpf. t. 16. Jacq. Hort. Schönbr. t. 351. Sims Bot. Mag. t. 1587. *Daphne sinensis* Lam. Dict. III. 438. — ♄ — *Habitat in China et Japonia.*

2093. Dais Linn. Füllhornstrauch.

2064. **Dais cotinifolia** Linn. Spec. 556. Willdenow Spec. II. 570. Lam. t. 368. f. 1. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2095. Passerina Linn.

2065. **Passerina filiformis** Linn. Spec. 513. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2098. Pimelea Banks et Sol.

a. Heterolaena Endl.

2066. **Pimelea decussata** R. Brown Prodr. 360. *P. ferruginea* Labillard. Nov. Holl. I. 10. t. 5. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

2067. **Pimelea hispida** R. Brown Prodr. 360. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

b. Phyllolaena Endl.

2068. **Pimelea sylvestris** R Brown Prodr. 361. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

2069. **Pimelea drupacea** Labillard. Nov. Holl. I. 10. t. 7. R. Brown Prodr. 361. — ♄ — *Habitat in Van - Diemens Island.*

2070. **Pimelea prostrata** Vahl Enum. I. 306. Lindley in Bot. Reg. App. 1839. n. 81. *Pimelea Novae Zeelandiae* Hort. — ♄ — *Habitat in Nova Zeelandia.*

2100. Gnidia Linn.

2071. **Gnidia simplex** Linn. Mant. 67.

Bot. Mag. t. 812. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

*Hernandiaceae.

2108. **Hernandia** Plum.

2072. **Hernandia sonora** Linn. Spec. 1391. Lam. Illustr. t. 755. — ♄ — *Habitat in India.*

Ordo LXIV. Elaeagneae.

2112. **Hippophaë** Linn. Sanddorn.

2073. **Hippophaë rhamnoides** Linn. Spec. 1452. Schkuhr Handb. t. 321. E. B. t. 452. — ♄ — *Habitat in paludosis Europae occidentalis et borealis, in Tauria et Sibiria.*

α. Taurica. — *β Sibirica.*

2074. **Hippophaë salicifolia** Don Prodr. Prodr. Flor. nep. 67. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

2113. **Shepherdia** Nutt. Silberblatt.

2075. **Shepherdia canadensis** Nuttall Gen. Bor. Amer. II. 241. *Hippophaë canadensis* Linn. Spec. 1452. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

2076. **Shepherdia argentea** Nuttall Gen. Bor. Amer. II. 241. *Hippophäe argentea* Pursh Flor. Bor. Amer. 1. 115. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

2115. **Elaeagnus** Tournef. Wilder Oehlbaum.

2077. **Elaeagnus hortensis** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. 68. — ♄ — *Habitat in Europa australi et Oriente.*

α. Elaeagnus angustifolia Linn. Spec. 176. Bot. Reg. t. 1156. — *β. Elaeagnus songarica* Fisch. — *γ. Elaeagnus tiflensis* Fisch. — *δ. Elaeagnus eriwanensis.*

2078. **Elaeagnus parvifolia** Royle Himalay. 323. — 5 — *Habitat in India orientali.*

2079. **Elaeagnus argentea** Pursh Flor. Bor. Amer. I. 114. — 5 — *Habitat in America boreali.*

Ordo LXV. Protaeaceae.

2120. Leucadendron Herm. Silberbaum.

2080. **Leucadendron Levisanus** R. Brown in Linn. Transact. X. 165. *Protea fusca Levisanus* Linn. Mant. 194. — 5 — *Habitat in campis sabulosis et ericatis Capitis bonae spei.*

2081. **Leucadendron cinereum** R. Brown in Linn. Transact. X. 165. *Protea cinerea* Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 127. *Protea alba* Thunb. Diss. 32. Prodr. 26. — 5 — *Habitat in Capite bonae spei.*

2082. **Leucadendron corymbosum** Bergius in Act. Holm. 1766. p. 325. R. Brown in Linn. Transact. X. 165. *Protea corymbosa*. Thunb. Dissert. 28. t. 2. Prodr. 26. — 5 — *Habitat in Capite bonae spei.*

2083. **Leucadendron uliginosum** R. Brown in Linn. Transact. X. 165. *Protea saligna* Thunb. Diss. n. 47. — 5 — *Habitat in uliginosis Capitis bonae spei.*

2121. Petrophila R. Br.

2084. **Petrophila pulchella** R. Brown in Linn. Transact. X. 169. Prodr. 364. *Protea pulchella* Schrader Sert. Hanov. II. p. 15. t. 7. Willd. Spec. 1. 507. Cavan. Ic. VI. 33. t. 550. Sims Bot. Mag. t. 796. *Protea fucifolia* Salisbury Prodr. 48. *Protea dichotoma* Cavanill. Ic. VI. 34. t. 551. — 5 — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

2123. Protea Linn.

2085. **Protea cynaroides** Linn. Mant. 190. Andr. Bot. Rep. t. 288. Bot. Mag. t. 770. R. Brown

in Linn. Transact. X. 70. — ₺ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2125. **Mimetes** Salisb.

2086. **Mimetes divaricata** R. Brown in Linn. Transact. X 71. *Protea divaricata* Linn. Mant. 194. Thunb. Dissert. 57. *Leucadendron divaricatum* Berg. Act. Holm. 1766. p. 324. — ₺ — *Habitat in Capite bonae spei, in campis et collibus.*

2142. **Manglesia** Endl.

2087. **Manglesia cuneata** Endl. Nov. stirp. Mus. Vind. Dec. p. 25 in not *Manglesia glabrata* Lindley Swan-Riv. 37. *Grevillea Manglesii* Hortul. — ₺ — *Habitat in Nova Hollandia austro-occidentali.*

2143. **Grevillea** R. Br.

α. **Lissostylis.**

2088. **Grevillea sulphurea** All. Cunningham in Fields New-South-Wales 329. R. Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl. 17. *Gr. aciphylla* Sieber Herb. Nov. Holl. n. 28. *Gr. acifolia* Sprengel Cur. post. 46. *Gr. acicularis* Römer et Schult. Syst. Mant. III. 278. — ₺ — *Habitat in Nova Hollandia orientali prope Port-Jackson.*

β. **Eriostylis.**

2089. **Grevillea salicifolia** Endl. msc. — ₺ — *Habitat in interioribus coloniae Swan-River.*

Inter *Gr. fasciculatam* et *Gr. depauperatam* media. Folia lanceolato-linearia, margine revoluta, supra laevia, glabra, subtus pilis adpressis incana, mucrone sphacelato. Flores longe pedunculati, fasciculati. Perigonium extus adpresse pilosum, intus barbatum.

δ. **Ptychocarpa.**

2090. **Grevillea Baueri** R. Brown in Linn. Transact. X. 173. Prodr. 378. Suppl. 19. *α.* Foliis novellis semper, adultis quandoque supra pubescen-

tibus. *Gr. pubescens* Hooker Exot. Flor. t. 216. Sprengel Cur. post. 46. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali prope Port-Jackson.*

2091 **Grevillea mucronulata** R. Brown in Linn. Transact. X. 173. Prodr. 378. *Lysanthe podalyriaefolia* Knight et Salisbury Prot. 117. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali prope Port-Jackson.*

2092. **Grevillea rosmarinifolia** A. Cunningham in Fields New-South-Wales 328. Sweet Flor. Austral. t. 30. Loddiges Bot. Cab. t. 1479. R. Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl. 20. *Grevillea riparia* Sieber Herb. Nov. Holl. n. 33. Schultes Mantiss. III. 278. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae orientalis montibus prope Port-Jackson.*

c. **Calothyrsus** R. Br.

2093. **Grevillea Thelemanniana** Hügel msc. Endl. Nov. stirp. Mus. Vind. Dec. n. 8. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia austro-occidentali.*

2094. **Grevillea acanthifolia** A. Cunningh. in Fields N. S. Wales p. 328. c. ic. Sieber Herb. Nov. Holl. n. 32. Hooker Exot. Flor. t. 216. Loddig. Bot. Cab. t. 1153. R. Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl. 2. — ♄ — *Habitat in montibus prope Port-Jackson.*

2144. **Hakea** Schrad.

2095. **Hakea pugioniformis** Cavanill. Ic. VI. 24. t. 533. R. Brown in Linn. Transact. X. 178. Prodr. 381. *Conchium pugioniforme* Smith in Linn. Transact. IX. 122. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2096. **Hakea gibbosa** Cavanill. Ic. VI. 24. t. 534. R. Brown in Linn. Transact. X. 181. Prodr. 382. *Banksia gibbosa* Smith in White's Voy. 224. t. 22. f. 2. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

2097. **Hakea acicularis** R. Brown in Linn. Transact. X. 181. Prodr. 383. *Conchium aciculare* Vent. Malmais. t. 111. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2098. **Hakea suaveolens** R. Brown in Linn. Transact. X. 182. Prodr. 383. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, in saxosis prope littora.*

2099. **Hakea microcarpa** R. Brown in Linn. Transact. X. 182. Prodr. 383. — ♄ — *Habitat in insula Diemen.*

2100. **Hakea tuberculata** R. Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl. 28. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae austro-occidentalis King-Georges-Sound.*

2101. **Hakea florida** R. Brown in Linn. Transact. X. 183. Prodr. 384. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, ad latera collium.*

2102. **Hakea cristata** R Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl. 28. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia austro-occidentali ad Swan-River.*

2103. **Hakea Baxteri** R. Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl. 28. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae austro-occidentalis King-Georges-Sound.*

2104 **Hakea amplexicaulis** R. Brown in Linn. Transact. X. 184 Prodr. 384. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, in collibus sterilibus.*

2105. **Hakea ceratophylla** R. Brown in Linn. Transact X. 184. Prodr. 384. *Conchium ceratophyllum* Smith in Linn. Transact. IX. 124. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, in campis et collibus.*

2106. **Hakea oleaefolia** R. Brown in Linn. Transact. X. 185. Prodr. 385. *Conchium oleifolium* Smith in Linn. Transact. IX. 124. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, in campis et collibus.*

2107. **Hakea saligna** R Brown in Linn. Transact. X. 185. Prodr. 385. *Embothrium salignum* Andrews Bot. Rep. t. 215. *Conchium salignum* Smith in Linn Transact. IX. 124. *Conchium salicifolium* Gärtner f. Carp. III. 217. t. 219. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, in ericetis elatioribus.*

2108. **Hakea dactyloides** Cavanill. Ic. VI. 25. t. 535. R Brown in Linn. Transact X 186. Prodr. 385. *Banksia dactyloides* Gärtner Carp. I. 221. t. 47. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2109 **Hakea angustifolia** Mackay. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

2110. **Hakea petrophiloides** Mackay. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

2111. **Hakea elliptica** R. Brown in Linn. Transact. X. 187 Prodr. 386. *Conchium ellipticum* Smith in Linn. Transact. IX. 123. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae ora australi.*

2145 Lambertia Smith.

2112. **Lambertia formosa** Smith in Linn. Transact. IV 214. t. 20. Cavanill. Ic. t 547. R Brown Prodr. 387 Bot. Reg. t. 528. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2154. Telopea R. Br.

2113 **Telopea speciosissima** R. Brown in Linn. Transact. X 90 Prodr. 388. *Embothrium speciosissimum* Smith Nov. Holl. 19. t. 7. Sims Bot. Mag. t 1128. *Embothrium spathulatum* Cavanill. Ic. IV. 60. t. 388. Gärtner f Carp III 214 t. 218. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali prope Port-Jackson, locis saxosis umbrosis.*

2155 Lomatia R. Br.

2114 **Lomatia silaifolia** R. Brown in Linn. Transact X 199 Prodr. 389. *Embothrium silaifolium* Smith Nov Holl 23 t. 8 *Embothrium herbaceum* Cavanill Ic. IV. 60. t. 388. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2115. **Lomatia longifolia** R. Brown in Linn. Transact. X 200 Prodr. 390 *Embothrium myricoides* Gärtner f Carp. III. 215. t. 218. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2156. Stenocarpus R. Br.

2116. **Stenocarpus salignus** R Brown in Linn. Transact X. 202 Prodr. 391. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali prope Port-Jackson, in saxosis juxta rivulorum ripas.*

2157. Banksia Linn.

2117. **Banksia ericaefolia** Linn. f. Suppl. 127 Willd Sp I. 536. Andrews Bot. Reposit t. 156. Cavanill. Ic. VI. 27. t. 538. R. Brown in Linn Transact X. 203. Prodr 391. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae orientalis ericetis saxosis prope Port-Jackson.*

2118 **Banksia Cunninghamii** Sieber Herb. Nov Holl n. 6. Sprengel Cur post. 47. Schultes Mant. III. 289. Reichenbach Hort. Bot I 58. t. 81. R Brown Suppl Prodr. Nov. Holl 35. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae orientalis montosis prope Port-Jackson, et in orae australis Wilson's Promontory.*

2119. **Banksia integrifolia** Linn Suppl. 127. Cavanill. Ic VI 30. t 540. R. Brown in Linn. Transact. X. 206. Prodr 393. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali prope Port-Jackson, juxta littora.*

2120. **Banksia latifolia** R Brown in Linn. Transact. X 208 Prodr. 394 B. Robur Cavanill. Ic. VI. 29. t. 543 — *Frutex tri-quadripedalis.* — ♄ — *Crescit in Novae Hollandiae paludosis prope Port-Jackson.*

2121. **Banksia Baueri** R. Brown Suppl. Prodr. Flor. Nov. Holl 35 — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae austro-occidentalis montosis prope Port-Jackson.*

2158. Dryandra R. Br.

2122. **Dryandra floribunda** R. Brown in Linn. Transact. X. 212. Prodr. 397 — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae australis Lewins Land, in collibus saxosis.*

2123. **Dryandra formosa** R. Brown in Linn. Transact. X. 13. t. 3. Prodr. 397. — ♄ — *Habitat in*

Novae Hollandiae australis Lewius Land, in sterilibus prope littora.

Ordo LXVI. Aristolochieae.

2160. **Asarum** Tournef.

2124. **Asarum europaeum** Linn. Spec. 633. E. B. t. 1083. Nees jun. Plant. offic. 2. t. 23. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis.*

2161. **Heterotropa** Morr. et Decaisn.

2125. **Heterotropa asaroides** Morren et Decaisne in Nouv. Annal. sc. nat. II. 314. t. 10. Hooker in Bot. Mag. t. 3746. *Asarum virginicum* Thunberg Flor. japon. 190. *Asarum japonicum* Hortor. — ♃ — *Habitat in Japonia, a Sieboldio in Europam adlata.*

2162. **Aristolochia** Tournef.

2126. **Aristolochia Clematitis** Linn. Spec. 1363. Schkuhr Handb. t. 276. E. B. t. 398. — ♃ — *Habitat in sepibus Europae mediae et australis.*

2127. **Aristolochia Sipho** Michaux Flor. Bor. Amer. II. 161. Willdenow Spec. IV. 155. Bot. Mag. t. 534. — ♄ ○ — *Habitat in America boreali.*

2128. **Aristolochia arkansana** Loddiges Cat. — ♄ — *Habitat in Americae borealis ditione Arkansas.*

2129. **Aristolochia labiosa** Lindley in Bot. Reg. t. 689. — ♄ ○ — *Habitat in America tropica.*

Ordo LXVII. Nepentheae.

2167. **Nepenthes** Linn.

2130. **Nepenthes destillatoria** Linn. Spec. 1354. — ♄ — *Habitat in Ceylona.*

Ordo LXVIII. Plantagineae.

2170. **Plantago** Linn.

a. **Psyllium** Endl.

2131. **Plantago arenaria** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 51. t. 51. — ⊙ — *Habitat in arenosis Hungariae, Galliae et Tauriae.*

2132. **Plantago stricta** Schousboe Marocco 55. — ⊙ — *Habitat in Barbaria.*

2133. **Plantago squarrosa** Murray Comment. Götting. 1781. p. 38. t. 3. *Plantago aegyptiaca* Jacq. Collect. I. 45. Ic. rar. I. t. 28. Fragm. t. 183. — ⊙ — *Habitat in Aegypto et insula Zacyntho.*

2134. **Plantago Psyllium** Linn. Spec. 167. — ⊙ — *Habitat in Europa australiore.*

2135. **Plantago Cynops** Linn. Spec. 167. Jacq. Fragm. t. 182. — ⊙ — *Habitat in Europa meridionali et Sibiria.*

2136. **Plantago amplexicaulis** Cavanill. Ic. II. 22. t. 125. — ⊙ — *Habitat in Hispania.*

b. **Coronopus** Endl.

2137. **Plantago Coronopus** Linn. Spec. 166. — ⊙ — *Habitat in graminosis sterilibus Europae mediae et ad littora mediterranea.*

2138. **Plantago Löflingii** Linn. Spec. 166. Jacq. Hort. Vindob. t. 126. — ⊙ — *Habitat in Hispania et Tauria.*

2139. **Plantago macrorhiza** Poiret It. II. 154. — ⊙ — *Habitat in Barbaria.*

β. *Caspia* Fisch. et Mey.

c. **Lagopus** Endl.

2140. **Plantago serpentina** Lam. Illustr. n. 1686. *Plantago carinata* Schrader msc. *Plantago subulata* Wulfen in Jacq. Collect. I. 204. t. 10. non Linn. *Plantago Gerardi* Schultes Oesterr. Flor. I. 298. — ♃ — *Habitat in saxosis asperis Europae australioris.*

2141. **Plantago maritima** Linn. Spec. 165. — ♃ — *Habitat ad littora marium Europae et in pratis subsalsis passim.*

2142 **Plantago salsa** Pallas It. I. 486. — ♃ — *Habitat ad litto a B spori*

2143. **Plantago saxatilis** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I 100. — ♃ — *Habitat in rupestribus Iberiae.*

2144. **Plantago sericea** Waldst. et Kitaibel Plant Hung rar. II 163. t 151 — ♃ — *Habitat in apricis asperis Europae australioris.*

2145. **Plantago eriostachya** Tenore Prodr. 13. — ⊙ — *Habitat in aris Neap lis.*

2146 **Plantago lanceolata** Linn. Spec. 164. — ♃ — *Habitat in pratis et pascuis passim.*

β. *Irrigua* Bess.

2147 **Plantago altissima** Jacq Observ. IV. 5. t. 83. — ♃ *Habitat in Hungaria.*

2148. **Plantago media** Linn. Spec. 163. — ♃ — *Habitat in graillosis Europae et Caucasi.*

2149. **Plantago maxima** Jacq. Collect. I. 82. Ic. rar t 6 — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2150 **Plantago truncata** Chamisso in Linnaea I. 170. — ♃ — *Habitat in Chili.*

β. *Humilis.*

2151 **Plantago Durvillei** Delile Hort. monsp. Fischer et Meyer Index III Hort Petrop. 1837. p. 45 *Plantago chilensis* Hort. Paris. — ♃ — *Habitat in Chile et Nova Californiа.*

2152. **Plantago camtschatica** Link Enum. I. 120. — ♃ — *Habitat in Camtschatca.*

2153. **Plantago gentianoides** Sibthorp Flor. graec. t. 146. — ♃ — *Habitat in Olympo.*

d. **Arnoglossum** Endl.

2154. **Plantago Cornuti** Gouan Illustr. 6. — ♃ — *Habitat in pascuis maritimis orae mediterraneae.*

β. *Plantago limosa* Kitaibel msc.

2155. **Plantago asiatica** Linn. Spec. 163. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2156. **Plantago crassa** Willdenow Phytogr. I. 3. *Plantago crassifolia* Roth Catalect. I. 29 *Plantago crispa* Jacq Collect. Suppl. 34. t. 16. — ♃ — *Habitat in Italia.*

2157. **Plantago major** Linn. Spec. 163. — ♃ — *Habitat in pascuis Europae passim.*

β. *Plantago bracteata* Mönch Meth. 430.

Ordo LXIX. Plumbagineae.

2171. **Armeria** Willd.

2158. **Armeria vulgaris** Willdenow Enum. I. 333. Römer et Schultes Syst. VI. 771. *Statice Armeria* Willdenow Spec II 1522. excl. syn. Schkuhr Handb. t. 87. — ♃ — *Habitat in arenosis sterilibus Europae.*

2159. **Armeria alpina** Willdenow Enum. I. 333 Römer et Schultes Syst. VI. 771. *Statice Armeria alpina* Hoppe. — ♃ — *Habitat in alpibus.*

2160. **Armeria maritima** Willdenow Enum. I. 333 Römer et Schultes Syst. VI. 772. *Statice Armeria* Linn. Flor. suec. 253. Flor. dan. t 1092. — ♃ — *Habitat in limosis maritimis Europae et Americae borealis.*

2161 **Armeria fasciculata** Willd Enum. I. 334. Römer et Schultes Syst VI. 773 *Statice fasciculata* Venten Cels. t. 38 — ♃ — *Habitat in Corsica et Lusitania.*

2162. **Armeria denticulata** Bertoloni Amoen 77 DC. Catalog. Hort. monsp 7. Römer et Schultes Syst. VI. 776. *Statice denticulata* Bertoloni Plant. It. Dec. 2. p. 34. — ♃ — *Habitat in rupibus Sarzanae.*

2172. **Statice** Willd.

2163. **Statice Limonium** Linn. Spec. 394. E. B. t. 102. Flor. dan. t. 315. Römer et Schultes Syst. VI. 777. — ♃ — *Habitat in maritimis Europae totius.*

2164. **Statice Gmelini** Willdenow Spec. I. 1524. Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 250. Römer et Schultes Syst. VI. 778. — ♃ — *Habitat in salsis Hungariae et Sibiriae.*

2165. **Statice latifolia** Smith in Linn. Transact. I 250. Römer et Schultes Syst. VI. 778. *Statice coriaria* Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 249. Suppl. 250. *Statice coriacea* Hortor. — ♃ — *Habitat ad Tanaim et in demissioribus Caucasi.*

β. *Caspica.*

2166. **Statice purpurata** Linn. Mant. 59. Römer et Schultes Syst. VI. 779. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2167. **Statice bellidifolia** Sibthorp Flor. graec. t. 295. — ♃ — *Habitat in littoribus insularum Archipelagi.*

2168. **Statice globulariaefolia** Desfont. Flor. atl. I. 274. Sibthorp Flor. graec. t. 296. Römer et Schult. Syst. VI. 780. *Statice ramosissima* Poiret Voy. Barb. II. 142. — ♃ — *Habitat in maritimis mediterraneis.*

2169. **Statice oleaefolia** Pourret msc. ex Smith Prodr. I. 212. Römer et Schultes Syst. VI. 781. — ♃ — *Habitat in maritimis Graeciae.*

2170. **Statice Willdenowiana** Poiret Dict. Suppl. V. 236. Römer et Schultes Syst. VI. 782. *Statice spathulata* Willdenow Hort. berol. t. 63. excl. synon. — ♃ — *Habitat in maritimis Galliae meridionalis.*

2171. **Statice auriculaefolia** Vahl Symb. I. 25. Römer et Schultes Syst. VI. 782. — ♃ — *Habitat in maritimis Hispaniae.*

β. *Ramosa.*

2172 **Statice incana** Linn. Mant. 59. Vahl Symb. I. 25. Römer et Schultes Syst. VI. 783. — ♃ — *Habitat in Aegypto, Arabia et Sibiria.*

2173. **Statice spathulata** Desfont. Flor. atlant. I. 275. Bot. Mag. t. 1617. Römer et Schultes Syst. VI. 784. *Statice cordata* Poiret Voy. Barb. II.

142. non Linn. — ♃ — *Habitat in maritimis Barbariae.*

2174. **Statice reticulata** Linn. Spec. 394 E. B. t. 328. Römer et Schultes Syst. VI. 785. — ♃ — *Habitat in maritimis Angliae, Galliae et Hispaniae.*

2175. **Statice virgata** Willd. Enum. I. 336. Römer et Schultes Syst. VI. 786. — ♃ — *Habitat in Hispania et Sicilia.*

2176. **Statice speciosa** Linn. Spec. 395. Curtis Bot. Mag. t. 656. Römer et Schultes Syst. VI. 787. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2177. **Statice tatarica** Linn. Spec. 395. Römer et Schultes Syst. VI. 788. — ♃ — *Habitat in herbidis apricis Tauriae.*

2178. **Statice Echinus** Linn. Spec. 395. Sibthorp Flor. graec. t. 300 Römer et Schultes Syst. VI. 789. — ♃ — *Habitat in Olympo et in subalpinis Caucasi.*

2179. **Statice acerosa** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 252. Römer et Schultes Syst. VI. 789. — ♃ — *Habitat in saxosis sterilibus Iberiae.*

2180. **Statice flexuosa** Linn Spec. 395. Römer et Schultes Syst. VI. 790. — ♃ — *Habitat in desertis Sibiriae.*

2181. **Statice monopetala** Linn. Spec. 396. Römer et Schultes Syst. VI. 791. *Statice suffruticosa* Hort. *Statice scabra* Hort. — ♃ — *Habitat in Gallia australi, Sicilia, Barbaria et Lusitania.*

Var. β. *Angustifolia* Hort. Paris.

2182. **Statice sinuata** Linn. Spec. 397. Sibthorp Flor. graec. t. 301. Römer et Schultes Syst. VI. 795. — ♃ — *Habitat in maritimis regionis mediterraneae orientalis.*

2183. **Statice mucronata** Linn. Suppl. 187. Heritier Stirp. I. 25. t. 13. Römer et Schultes Syst. VI. 796. — ♃ — *Habitat in Barbaria.*

2184. **Statice pubescens** DC. ex Poir. Suppl. 300. Römer et Schultes Syst. VI. 797. — ♃ — *Habitat in Gallia meridionali.*

2185. **Statice arborea** Willd. Enum. 1. 337. Römer et Schult. Syst. VI. 797. Lindley in Bot. Reg. 1839. t. 6. — ♄ — *Habitat in rupibus sterilibus insulae canariensis Burgado.*

2174. Plumbago Tournef.

2186. **Plumbago europaea** Linn. Spec. 215. Schkuhr Handb. t. 36. Römer et Schult. Syst. IV. 3. — ♃ — *Habitat in Europa australi et Caucaso.*

2187. **Plumbago lapathifolia** Willd. Spec. I. 837. Enum. 1. 198. Röm. et Schult. Syst. IV. 3. — ♃ — *Habitat in Iberia.*

2188. **Plumbago zeylanica** Linn. Spec. 215. R. Brown Prodr. 426. Römer et Schult. Syst. IV. 3. — ♄ — *Habitat in India orientali et Nova Hollandia.*

2189. **Plumbago rosea** Linn. Spec. 215. Curtis Bot. Mag. t. 230. Römer et Schult. Syst. IV. 4. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

2190. **Plumbago scandens** Linn. Spec. 215. Jacq. Amer. ed. pict. 18. t. 13. Römer et Schultes Syst. IV. 4. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

2191. **Plumbago micrantha** Fischer msc. — ♃ — *Habitat in Persia.*

Ordo LXX. Valerianeae.

2178. Patrinia Juss.

2192. **Patrinia sibirica** Jussieu in Annal. Mus. X. 311. DC. Prodr. IV. 624. Bunge in Nouv. Annal. sc. nat. VI. 61. *Valeriana sibirica* Linn. Spec. 48. Pallas It. III. 266. 267. — ♃ — *Habitat in Sibiria australi et Dauria.*

2193. **Patrinia rupestris** Jussieu in Annal. Mus. X. 311. DC. Prodr. IV. 624. Bunge in Nouv. Annal. sc. nat. VI. 62. *Valeriana rupestris* Pallas It. III. 266. 316. *Valeriana sibirica* Willd. Spec. I. 181.

Sims Bot. Mag. t. 714. non Linn. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2181. Valerianella Mönch.

a. Platycoelae DC.

2194. **Valerianella vesicaria** Mönch Method. 497. DC. Prodr. IV. 628. *Fedia vesicaria* Vahl Enum. II. 20. Reichenb. Iconogr. t. 70. *Valeriana Locusta* β. *vesicaria* Linn. Sibthorp Flor. graec. t. 34. — ⊙ — *Habitat in arvis regionis mediterraneae, imprimis orientalis.*

2195. **Valerianella coronata** DC. Prodr. IV. 628 *Fedia coronata* Reichenb. Iconogr. t. 66. f. β. γ. — ⊙ — *Habitat in regione mediterranea.*

2196. **Valerianella dentata** DC. Fl. fr. n. 3321. Prodr. IV. 627. *Fedia dentata* Vahl Enum. II. 20. — ⊙ — *Habitat in arvis Europae.*

b. Psilocoelae DC.

2197. **Valerianella echinata** DC. Fl. fr. IV. 242. Prodr. IV. 626. *Fedia echinata* Vahl Enum. II. 19. Reichenb. Iconogr. t. 68. *Valeriana echinata* Linn. Spec. 47. — ⊙ — *Habitat in arvis regionis mediterraneae.*

2198. **Valerianella uncinata** Dufresn. Valerian. 60. DC. Prodr. IV. 626. *Fedia uncinata* Steven in Mem. Soc. Mosq. V. 352. Reichenb. Iconogr. t. 69. — ⊙ — *Habitat in arvis Europae totius.*

2199. **Valerianella sclerocarpa** Fischer et C. A. Mey. Index II. Sem. Hort. Petrop. 1835. p. 53. — ⊙ — *Habitat in campis montium alt. Talüsch.*

2183. Fedia Mönch.

2200. **Fedia Cornucopiae** DC. Fl. fr. IV. 240. Prodr. IV. 630. *Valeriana Cornucopiae* Linn. Spec. 44. Sibthorp Flor. graec. t. 32. — ⊙ — *Habitat in arvis et ruderatis regionis mediterraneae.*

2201. **Fedia scorpioides** Dufresn. Valerian.

65. t. 1. DC. Prodr. IV. 630. —⊙— *Habitat circa Tanger Africae borealis.*

2185. Centranthus DC.

2202. **Centranthus ruber** DC. Flor. fr. IV. 239. Prodr. IV. 632. *Valeriana rubra α* Linn. Spec. 44. E. B. t. 1532. —♃— *Habitat in ruderatis Europae mediterraneae.*

β. *Albiflorus.*

2186. Valeriana Neck.

2203. **Valeriana officinalis** Linn. Spec. 45. DC. Prodr. IV. 641. —♃— *Habitat in sylvis depressis humidis Europae totius.*

Var. β. *Angustifolia* Tausch apud Host Flor. austr. I. 36.

2204. **Valeriana sambucifolia** Mikan in Pohl Flor. Bohem. I. 41. —♃— *Habitat in nemorosis humidis Austriae, Bohemiae et Silesiae.*

β. *Exaltata* Mikan. *Valeriana repens* Host Flor. austr. I. 35.

2205. **Valeriana dioica** Linn. Spec. 44. Flor. dan. t. 687 Hayne Arzneigew. III. t. 31. —♃— *Habitat in pratis udis montanis et subalpinis Europae.*

2206. **Valeriana tuberosa** Linn. Spec. 46. —♃— *Habitat in collibus apricis et pratis montanis Europae mediae et australis.*

2207. **Valeriana montana** Linn. Spec. 45. —♃— *Habitat in montanis elatioribus et subalpinis Europae mediae et australis.*

2208. **Valeriana pyrenaica** Linn. Spec. 46. E. B. t. 1591. DC. Prodr. IV. 637. —♃— *Habitat in sylvis Pyrenaeorum et Scotiae.*

Ordo LXXI. Dipsaceae.

2190. Morina Tournef.

2209. **Morina persica** Linn. Spec. 39 Sibthorp Flor. graec. t. 28. Coulter Dipsac. 21. t. 1. f. 1.

DC Prodr. IV. 644. Morina orientalis carlinaefolia Tournef. Voy. II. 282. c. ic. — ♃ — *Habitat in Persia, Syria, Asia minore, in monte Parnasso.*

2210. **Morina longifolia** Wallich Cat. n. 426. DC. Prodr. IV. 644. Lindley in Bot. Reg. 1840. t. 36. — ♃ — *Habitat in Nepalia.*

2191. Dipsacus Tournef.

2211. **Dipsacus sylvestris** Miller Dict. n. 2. Jacq. Flor. austr. t. 402. E. B. t. 1032. Flor. dan. t. 965. DC. Prodr. IV. 645. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Europae totius et Sibiriae.*

2212. **Dipsacus laciniatus** Linn. Spec. 141. Jacq. Flor. austr. t. 403. DC. Prodr. IV. 645. — ⊙ — *Habitat in sepibus et aggeribus Europae totius et Sibiriae.*

2213. **Dipsacus Fullonum** Miller Dict. n. 1. Plenk Plant. off. t. 50. E. B. t. 2080. DC. Prodr. IV. 645. — ⊙ — *Habitat in Europa australi spontaneus, in media passim a fullonibus cultus.*

2214. **Dipsacus ferox** Loisleur Flor. gall. 719. t. 3. Trattinik Tabul. t. 235. DC. Prodr. IV. 646. — ⊙ — *Habitat ad margines agrorum Corsicae et Sardiniae, Austriae, Moraviae et Hungariae.*

2215. **Dipsacus Gmelini** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. I. 92. DC. Prodr. IV. 646. — ⊙ — *Habitat in Tauria, ad Tanaim, et in Sibiria ad Irtym.*

2216. **Dipsacus pilosus** Linn. Hort. upsal. 25. Jacq. Flor. austr. t. 248. E. B. t. 877. Flor. dan. t. 1448. DC. Prodr. IV. 646. — ⊙ — *Habitat ad sepes et in sylvulis Europae totius.*

2192. Cephalaria Schrad.

2217. **Cephalaria alpina** Schrader Ind. Sem. Hort. Götting. 1814. Röm. et Schult. Syst. III. 43. DC. Prodr. IV. 647. *Scabiosa alpina* Linn. Spec. 141. *Succisa alpina* Spreng. Syst. I. 378. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae.*

2218. **Cephalaria tatarica** Schrader Ind.

Sem. Hort. Götting. 1814. Röm. et Schult. Syst. III. 51. DC. Prodr. IV. 647. *Scabiosa tatarica* Gmelin Sibir. I. 159. *Succisa tatarica* Sprengel Syst. I. 378. *Scabiosa elata* Hornem. Hort. Hafn. I. 126. Reichenb. Iconogr. t. 301. non Linn. — ♃ — *Habitat in pratis subalpinis Caucasi et in Sibiria.*

Var. β. *Gigantea* Coult. *Scabiosa altissima* Miller Dict. n. 6. *Scabiosa gigantea* Ledebour Ind. Sem. Hort. Dorpat. 1811.

2219. **Cephalaria transylvanica** Schrader Ind. Sem. Hort. Götting. 1814. DC. Prodr. IV. 647. *Scabiosa transylvanica* Linn. Spec. 141. Jacq. Hort. Vindob. t. 111. Reichenb. Iconogr. t. 121. *Succisa transylvanica* Spreng. Syst. I. 378. — ⊙ — *Habitat in arvis et agris Europae australis.*

2220. **Cephalaria syriaca** Schrad. Ind. Sem. Hort. Götting. 1814. DC. Prodr. IV. 648. *Scabiosa syriaca* DC. Fl. fr. n. 3298. *Succisa syriaca* Spreng. Syst. I. 378. — ⊙ — *Habitat in agris et sylvulis Europae australioris et Orientis.*

2221. **Cephalaria centauroides** Coulter Dipsac. 25. t. 1. f. 8. DC. Prodr. IV. 648. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Europae australioris, Orientis et Sibiriae.*

a. *Communis* Coult. l. c. *Scabiosa centauroides* Lam. Ill. n. 1312.

b. *Corniculata* Coult. l. c. *Scabiosa corniculata* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 13. Reichenb. Iconogr. t. 315. *Cephalaria corniculata* Römer et Schult. Syst. III. 49.

c. *Uralensis* DC. l. c. *Scabiosa uralensis* Murray Comment. Götting. 1782. p. 13. t. 4. Reichenb. Iconogr. t. 314.

d. *Cretacea* DC. l. c. *Cephalaria cretacea* Römer et Schult. Syst. III. 51. *Scabiosa cretacea* Bieberst. Flor. taur. cauc. 1. 93. *Scabiosa coriacea* Willd. Enum. I. 145.

2222. **Cephalaria leucantha** Schrader Ind. Sem. Hort. Götting. 1814. Coulter Dipsac. 26. t. 1. f. 9. DC. Prodr. IV. 648. *Scabiosa leucantha* Linn. Spec. 142. Reichenb. Iconogr. t. 356. *Succisa leucantha* Spreng. Syst. I. 378. — ♃ — *Habitat in Europa australiore, Oriente et Sibiria.*

2193. **Knautia** Coult.

a. **Lychnoides** DC.

2223. **Knautia orientalis** Linn. Spec. 146. Lam. Ill. t. 58. Schkuhr Handb. t. 22. Coulter Dipsac. 28. t. 1. f. 9. DC. Prodr. IV. 650. *Scabiosa orientalis* Lagasc. Nov. gen. et sp. 9. — ⊙ — *Habitat in Oriente.*

b. **Trichereoides** DC.

2224. **Knautia hybrida** Coulter Dipsac. 30. DC. Prodr. IV. 650. *Scabiosa hybrida* Allioni Auct. 9. *Trichera hybrida* Römer et Schult. Syst. V. 58. — ⊙ — *Habitat in Europa australi.*

c. **Trichera** Schrad.

2225. **Knautia arvensis** Coult. Dipsac. 29. DC. Prodr. IV. 651. *Scabiosa arvensis* Linn. Spec. 142. *Trichera arvensis* Schrad. ex Röm. et Schult. Syst. III. 54. — ♃ — *Habitat in pratis et agris Europae totius.*

β. *Integrifolia* Coult. *Scabiosa dipsacifolia* Schott ex Host Flor. austr. I. 191.

2226. **Knautia longifolia.** *Scabiosa longifolia* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 4. t. 5. — ♃ — *Habitat in Hungaria.*

2227. **Knautia ciliata** Coult. Dipsac. 30. DC. Prodr. IV. 651. *Scabiosa ciliata* Sprengel in Schrader Journ. 1800. II. 199. Reichenb. Iconogr. t. 273. — ♃ — *Habitat in pratis Moraviae et Carpathorum.*

β. *Pubescens. Scabiosa pubescens* Wahlenb. Flor. Carp. 38.

2194. **Pterocephalus** Vaill.

2228. **Pterocephalus papposus** Coult. Dips. 32. t. 1. f. 17. DC. Prodr. IV. 652. *Pterocephalus Vaillantii* Lagasc. Nov. gen. et sp. 9. *Scabiosa papposa* Linn. Spec. 146. — ⊙ — *Habitat in regione mediterranea.*

2229. **Pterocephalus multisetus.** *Scabiosa multiseta* Visiani Plant. dalm. 1. t. 1. — ⊙ — *Habitat in Dalmatia.*

2195. **Scabiosa** Röm. et Schult.

a. **Asterocephalus** Coult.

2230. **Scabiosa caucasica** Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 98. DC. Prodr. IV. 654. *Asterocephalus caucasicus* Spreng. Syst. I 381. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

β. Connata. Scabiosa connata Horn. Hort. Havn. I. 128.

2231. **Scabiosa cretica** Linn. Spec. 145. DC. Prodr. IV. 654. *Asterocephalus creticus* Sprengel Syst. I. 380. — 5 — *Habitat in rupibus calcareis Cretae et Siciliae.*

2232. **Scabiosa graminifolia** Linn. Spec. 145. Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 188. Lindley in Bot. Reg. t. 835. DC. Prodr. IV. 655. *Asterocephalus graminifolius* Spreng. Syst. I. 380. —♃— *Habitat in pratis et collibus Europae australioris.*

2233. **Scabiosa prolifera** Linn. Spec. 144. Sibthorp Flor. graec. t. 107. DC. Prodr. IV. 655. *Asterocephalus prolifer* Spreng. Syst. I. 380. — ⊙ — *Habitat in Cypro, Aegypto et Barbaria.*

2234. **Scabiosa monspeliensis** Jacq. Miscell. II 320. Ic. rar. I. t. 24. DC. Prodr. IV. 655. *Asterocephalus stellatus* Spreng. Syst. I. 380. — ⊙ — *Habitat in apricis regionis mediterraneae occidentalis.*

2235. **Scabiosa palaestina** Linn. Mant 37. Jacq. Hort. Vindob. I t. 96. DC. Prodr. IV. 655. *Asterocephalus palaestinus* Sprengel Syst. I. 380. — ⊙— *Habitat in Palaestina.*

2236. **Scabiosa ucranica** Linn. Spec. 144. Reichenb. Iconogr. t. 316. DC. Prodr. IV. 655. —♃— *Habitat in sterilibus Europae australis et Tauriae.*

β. Argentea. Scabiosa argentea Linn. Spec. 145. — *γ. Sicula. Scabiosa sicula* Linn. Mant. 196. *Scabiosa divaricata* Jacq. Hort. Vindob. I. t. 16.

2237. **Scabiosa micrantha** Desfont. in Annal. Mus. XI. t. 25. DC. Prodr. IV. 656. *Scabiosa sicula* Bieberst. Flor. taur. cauc. I. 98. *Astero-*

cephalus micranthus Sprengel Syst. I. 381. — ⊙ — *Habitat in sterilibus Tauriae, Caucasi et Americae.*

2238. **Scabiosa crenata** Cyrillo Plant. rar. neap. I. 11. t. 3. *Scabiosa coronopifolia* Sibthorp Flor. graec. t. 114. *Asterocephalus crenatus* Sprengel Syst. I. 382. — ♃ — *Habitat in rupibus calcareis Calabriae et Graeciae.*

b. **Vidua** Coult.

2239. **Scabiosa atropurpurea** Linn. Spec. 144. Curt. Bot. Mag. t. 247. DC. Prodr. IV. 657. *Asterocephalus purpureus* Spreng. Syst. I. 381. — ⊙ — *Patria plantae in hortis passim cultae ignota.*

2240. **Scabiosa maritima** Linn. Amoen. Academ. IV. 304. — ⊙ — *Habitat in maritimis Galliae australis et Corsicae.*

2241. **Scabiosa Cupani** Gussone Prodr. Fl. sic. I. 160. — ⊙ — *Habitat in Sicilia.*

c. **Succisa** Coult.

2242. **Scabiosa stricta** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. II. 147. t. 138. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Hungariae.*

2243 **Scabiosa Hladnickiana** Host Flor. austr. I. 195. Koch Synops. 346. — ♃ — *Habitat in montibus Carnioliae et Istriae.*

2244. **Scabiosa ochroleuca** Linn. Spec. 146. Jacq. Flor. austr. t. 439. DC. Prodr. IV. 658. *Asterocephalus ochroleucus* Wallroth Sched. crit. 50. — ♃ — *Habitat in pratis siccis Europae et Sibiriae.*

2245. **Scabiosa Columbaria** Linn. Spec. 143. E. B. t. 1311. Reichenb. Iconogr. t. 354. DC. Prodr. IV. 659. *Asterocephalus Columbaria* Spreng. Syst. I. 382. — ♃ — *Habitat in Europa et Sibiria passim.*

2246. **Scabiosa banatica** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 10. t. 12. — ♃ — *Habitat in rupibus Banatus.*

2247. **Scabiosa pyrenaica** Allioni Flor. Pedemont. 1. 140. t. 25. f. 2. DC. Prodr. IV. 659. — ♃ — *Habitat in collibus lapidosis Europae australis.*

2248. **Scabiosa mollis** Willd. Enum Suppl. 7. Reichenb. Iconogr t 353 DC. Prodr. IV. 660. *Scabiosa capillata* Römer et Schult. Syst. III. 64 — ♃ — *Patria ignota.*

2249. **Scabiosa Succisa** Linn. Spec. 142. Flor. dan. t. 279 t. B t. 878 DC. Prodr. IV 660. *Asterocephalus Succisa* Wallroth Sched 1. 52. *Succisa pratensis* Mönch Meth. 489 — ♃ — *Habitat in pratis Europae totius et Caucasi.*

2250. **Scabiosa australis** Wulf. in Römer Archiv III. 216 Reichenb. Iconogr t. 325 DC. Prodr. IV 661. — ♃ — *Habitat in paludosis sylvarum Italiae superioris, Styriae et Hungariae.*

Ordo LXXII. Compositae.

Subordo I. Tubuliflorae.

Tribus I. Vernoniaceae.

2200. **Ethulia** Cass.

2251. **Ethulia conyzoides** Linn Spec. 1171. DC. Prodr. V 12. *Vernonia formosa* Hort Patav. 1839. — ⊙ — *Habitat in Asia et Africa tropica.*

2252. **Ethulia gracilis** Delile in Cailliaud Cent plant. 44. t. 3 f. 5 DC. Prodr V. 13. ⊙ — *Habitat in Senaar, unde semina misit Theodorus Kotschy.*

2204. **Vernonia** Linn.

a. **Tephrodes** DC.

2253. **Vernonia cinerea** Lessing in Linnaea IV. 291 VI 173. DC. Prodr V 24. *Conyza cinerea* Linn Spec. 1208. — ⊙ — *Habitat in India orientali et Africa tropica.*

b. Lepidaploa DC.

2254. **Vernonia scorpioides** Persoon Encheir. II. 404. DC. Prodr. V. 41. *Vernonia centriflora* Link et Otto Abbild t 15. *Lepidaploa scorpioides* Cassini in Dict. sc. nat. XXVI 18. *Conyza scorpioides* Lam. Dict. II. 48. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

c. Ascaricida Less.

2255. **Vernonia anthelminthica** Willdenow Spec III. 1634. DC. Prodr V. 63 *Conyza anthelminthica* Linn. Spec 1207 *Serratula anthelminthica* Roxburgh Catalog. Calc. 60. *Ascaricida indica* Cassini Dict. Suppl III 38 — ⊙ — *Habitat in India orientali.*

2256 **Vernonia noveboracensis** Willd. Spec III. 1632 DC. Prodr. V. 63. *Serratula noaeboracensis* Linn Spec. 1146. — ♃ — *Habitat in pascuis Americae borealis.*

β. *Glauca Vernonia glauca* Willd. Spec. III. 1633. *Serratula glauca* Linn. Spec. 1146. *Suprago glauca* Gärtner II. 402. t. 166.

2257 **Vernonia praealta** DC. Prodr VII. 63. *Serratula praealta* Linn Spec 1146. *Chrysocoma gigantea* Walter Carolin. 196 — ♃ — *Habitat in America boreali juxta paludum ripas.*

2206. Cyanopis Blum.

2258. **Cyanopis pubescens** Blume in DC. Prodr V. 69. *Cyanthillium pubescens* Blume Bijdr. 890. *Conyza patula* Aiton Hort kew III. 184. *Conyza chinensis* Lam. Dict II. 83 non Linn. *Isonema ovata* Cassini Dict sc. nat XXIV. 25 *Centratherum chinense* Lessing in Linnaea IV. 320. *Vernonia chinensis* Lessing in Linnaea VI 674 — ⊙ — *Habitat in graminosis Asiae tropicae passim.*

2231. Elephantopus Linn.

2259 **Elephantopus carolinianus** Willdenow Spec. III. 2390. DC. Prodr V. 86 — ♃ — *Habitat in siccis sterilibus Americae borealis et tropicae.*

2232. Gundelia Tournef.

2260. **Gundelia Tournefortii** Linn. Spec. 1315. Gärtner Carp. II. 386. t. 163. DC. Prodr. V. 88. — ♃ — *Habitat in siccis lapidosis Armeniae, Persiae, Syriae.*

2237. Lagascea H. B. K.

2261. **Lagascea mollis** Cavanill. Anal cienc. nat. VI. 333. t. 44. DC. Prodr. V. 91. Noccaea mollis Jacq. Fragm. t. 13. — ⊙ — *Habitat in insula Cuba et in Mexico.*

Tribus II. Eupatoriaceae.

2253. Piqueria Cav.

2262. **Piqueria trinervia** Cavanill. Ic. III. 19. t. 235. Jacq f. Eclog. I. 70. t. 48. DC. Prodr. V. 104. — ♃ — *Habitat in montanis Mexici.*

Herba febrifuga, Mexicanis » Xoxonitztal « et » Yoloxiltic « dicta.

2259. Ageratum Linn.

2263. **Ageratum conyzoides** Linn. Spec. 1175. Schkuhr Handb. t. 238. Hooker Exot. Flor. t. 15. DC. Prodr. V. 108. — ⊙ — *Habitat inter tropicos totius orbis.*

a. *Caeruleum* Desfont. — b. *Album* Steudel.

2264. Stevia Cav.

* **Exaristatae.**

2264. **Stevia monardaefolia** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 147. DC. Prodr. V. 115. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

** **Aristatae.**

2265. **Stevia Eupatoria** Willd. Spec. III. 1775. Sims Bot. Mag. t. 1849. DC. Prodr. V. 118.

Stevia hyssopifolia Cavanill. Praelect. 465. Lagasca Nov. gen. et sp. n. 340. non Kunth. *Ageratum punctatum* Ortega Decad. III. 37. non Jacq. *Mustelia Eupatoria* Sprengel in Linn. Transact. VI. 152. t. 13. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2266. **Stevia purpurea** Persoon Encheir. II. 402. excl. syn. Jacq. Fragm. 80. t. 127. f. 2. DC. Prodr. V. 118. *Stevia Eupatoria* Bot. Reg. t. 93. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2267. **Stevia suaveolens** Lagasca Nov. gen. et sp. 27. n. 342. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2268. **Stevia mollis** Schrader in DC. Prodr. V. 120. — ♃ — *Patria ignota.*

2269. **Stevia paniculata** Lagasc. Nov. gen. et sp. 343. DC. Prodr. V. 120. *Stevia hyssopifolia* Sims Bot. Mag. t. 1861. non alior. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2270. **Stevia ovata** Lagasca Nov. gen. et sp. n. 344. Willd. Enum. 855. DC. Prodr. V. 120. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2265. Palafoxia Lag.

2271. **Palafoxia linearis** Lagasc. Nov gen. et sp. 1815. n. 335. Bot. Mag. t. 2132. DC. Prodr. V. 125. *Ageratum lineare* Cav. Ic. t. 205. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

2270. Liatris Schreb.

a. Euliatris DC.

2272. **Liatris squarrosa** Willd. Spec. III. 1634. DC. Prodr. V. 129. *Serratula squarrosa* Linn. Spec. 1147. — ♃ — *Habitat in campis et sylvis arenosis Americae borealis.*

b. Suprago Cass.

2273. **Liatris spicata** Willd. Spec. III. 1636. Sims Bot. Mag. t. 1411. DC. Prodr. V. 130. *Serratula spicata* Linn. Spec. 1147 Andrews Bot. Reposit. t. 401. *Suprago spicata* Gärtner Carp. II. 402. t. 167.

Cassini Dict. sc. nat. LI. 385. — ♃ — *Habitat in pratis et pinetis demissis Americae borealis.*

γ *Racemosa* DC. l. c. *Liatris pilosa* Ker in Bot. Reg. t. 395. Loddig. Bot. Cab. t. 356. non Linn.

2274 **Liatris graminifolia** Pursh Flor. Bor. Amer. II. 508. DC Prodr. V. 130 — ♃ — *Habitat in pinetis humidis Carolinae.*

2275. Conoclinium DC.

2275. **Conoclinium coelestinum** DC. Prodr. V 135. *Eupatorium coelestinum* Linn. Spec. 1174. — ♃ — *Habitat in pinguibus umbrosis montium Americae borealis.*

2276. Hebeclinium DC.

2276. **Hebeclinium macrophyllum** DC. Prodr. V. 136. *Eupatorium macrophyllum* Linn. Spec. 1175. *Eupatorium molle* Swartz Prodr. 111. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

2279 Critonia P. Browne.

2277 **Critonia Dalea** DC Prodr. V. 140. *Eupatorium Dalea* Linn. Spec 1171. Jacq. Hort. Schönbr. II. 10. t. 146. ♄ — *Habitat in Jamaica.*

Odor fruticis gratus.

2280. Eupatorium Tournef.

Sect. I. Imbricata.

§ 1. Sessilifolia.

2278 **Eupatorium perfoliatum** Linn. Spec. 1174. Bigelow Med. Bot. I. 33. t. 2. DC Prodr. V. 151. *Eupatorium connatum* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 99. — ♃ — *Habitat in pratis humidis Americae borealis, a Canada ad Floridam.*

Herbae, vulgo »Boneset« dictae, decoctum amarum, emeticum, sudorificum, febrifugum, multi in medicina populari Anglo-americanorum nominis.

§. 2. Verticillata.

2279. **Eupatorium purpureum** Linn. Spec. 1173. DC Prodr. V. 151. — ♃ *Habitat in pinguibus Americae borealis a Canada ad Carolinam.*

2280. **Eupatorium maculatum** Linn. Amoen. Academ. IV. 288. DC Prodr V. 152. — ♃ — *Habitat in humidis Americae borealis, a Canada ad Carolinam.*

Sect. II. Eximbricata.

2281. **Eupatorium deltoideum** Jacq. Hort. Schönbr. III. 63. t 369. Bonpl. Nav. I 38 t. 14. DC. Prodr. V. 166. — ♃ — *Habitat in Mexico, ubi vulgo » Xolochichitl « dicitur.*

2282 **Eupatorium paniculatum** Schrader Index Sem. Hort. Gotting 1832. p. 3. Dissert Blumenb 44. DC. Prodr. V. 167. — ⊙ — *Habitat in Brasilia.*

2283. **Eupatorium ageratoides** Linn. f. Suppl. 355 DC. Prodr. V. 173 *Ageratum altissimum* Linn. Spec. 1176. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2284. **Eupatorium altissimum** Linn Spec. 1171. Jacq. Hort. Vindob t. 164 DC. Prodr. V. 177. — ♃ — *Habitat in sylvis demissis arenosis Americae borealis.*

2285. **Eupatorium cannabinum** Linn Spec. 1173. Flor. dan t 743 E. B t 428. DC Prodr. V. 180. — ♃ — *Habitat in fossis et sylvis insulanis Europae totius, Tauriae et Sibiriae.*

2286. **Eupatorium syriacum** Jacq. Miscell. I. 349. Ic rar. t. 170 DC. Prodr. V. 180. — ♃ — *Habitat in Syria et Persia.*

2282. Mikania Willd.

2287 **Mikania Guaco** Humb et Bonpl Plant. aequinoct II. 84. t 105. DC Prodr V. 193. — ♃ ⌒ — *Habitat in calidissimis humidis ad ripam fluvii St. Magdalenae Americae meridionalis.*

Guaco (s. Huaco) celeberrimum adversus serpentum morsuram antidotum.

2288. **Mikania scandens** Willdenow Spec. III. 1743. Lindley in Horticult. Transact. VII. 250. DC. Prodr. V. 199. *Eupatorium scandens* Linn. Spec. 1171. Jacq. Collect. I. 108. Ic. rar. t. 169. — ♄ ☊ — *Habitat in America boreali ad rivorum margines.*

2285. **Nardosmia** Cass.

2289. **Nardosmia fragrans** Reichenb. Flor. excurs. II. 289. DC. Prodr. V. 205. *Nardosmia denticulata* Cassini in Dict. sc. nat. XXXIV. 187. *Tussilago fragrans* Villars Act. soc. hist. nat. Paris. I. 72. t. 12. *Tussilago suaveolens* Desfont. — ♃ — *Habitat in vallibus humidis et juxta rivulos Italiae et Galliae australis, ubi vulgo » Heliotrope d'hiver « dicitur.*

2290. **Nardosmia laevigata** DC. Prodr. V. 205. *Tussilago laevigata* Willd. Spec. III. 1969. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2286. **Petasites** Tournef.

2291. **Petasites vulgaris** Desfont. Flor. Atlant. II. 270. DC. Prodr. V. 206. *Tussilago Petasites* Willd. Spec. III. 1971. — ♃ — *In humidis Europae totius frequens.*

2288. **Tussilago** Tournef.

2292. **Tussilago Farfara** Linn. Spec. 1214. E. B. t. 429. DC. Prodr. V. 208. — ♃ — *In argillosis hemisphaerae borealis vulgaris, a littore maris ad alpes.*

Tribus III. Asteroideae.

Subtribus I. Asterineae.

2292. **Amellus** Cass.

2293. **Amellus Lychnitis** Linn Spec. 1276. Jacq. Collect. V. t. 10. f. 1. Lam. t. 682. f. 2. DC. Prodr. V. 214. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2297. **Felicia** Cass.

2294. **Felicia angustifolia** Nees Ast. 213. DC. Prodr. V. 220. *Aster angustifolius* Jacq. Hort. Schönbr. t. 370. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2298. **Munychia** Cass.

2295. **Munychia Cymbalariae** Nees Ast. 218. DC. Prodr. V. 223. *Munychia brachyglossa* Cassini Dict. XXXVII. 483. *Felicia brachyglossa* Cassini Dict. XXV. 97. *Aster oppositifolius* Linn. Amoen. V. 369. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2301. **Aster** Nees.

1. Alpigeni.

2296. **Aster alpinus** Linn. Spec. 1226. Jacq. Flor. austr. t. 88. Nees Ast. 26. DC. Prodr. V. 227. — ♃ — *Habitat in pratis montanis et subalpinis a Pyrenaeis ad Sinarum limitem.*

Var β. *Altaicus.* — γ. *Bohemicus.*

2297. **Aster pyrenaeus** DC. Fl. fr. n. 3139. Prodr. V. 229. *Aster sibiricus* Lam. Dict. I. 305. non Linn. — ♃ — *Habitat in montibus Pyrenaeis.*

2. Amelli.

2298. **Aster irkutzianus** DC. Prodr. V. 229. — ♃ — *Habitat in sabulosis Dahuriae, ad ripam fluvii Irkutz.*

2299. **Aster Richardsonii** Spreng. Syst. III. 258. Nees Ast. 30. DC. Prodr. V. 229. — ♃ — *Habitat in America polari et Sibiria.*

2300. **Aster spectabilis** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 209. Lindley in Bot. Reg. t. 1527. Nees Ast. 41. DC. Prodr. V. 230. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2301. **Aster speciosus** Hornem. Catalog. Hort. Hafn. II. 816. — ♃ — *Patria ignota.*

2302. **Aster tataricus** Linn. f. Suppl. 373. DC. Prodr. V. 230. — ♃ — *Habitat in Dahuria, Sibiria et Kamtschatka.*

2303. **Aster Amellus** Linn. Spec. 1226. Jacq. Flor. austr. t. 435. DC. Prodr. V. 231. *Aster Amelloides* Römer Archiv. II. 298. — ♃ — *Habitat in siccis Europae mediae et australis, nec non Asiae occidentalis.*

β. *Bessarabicus. Aster amelloides* Besser Enum. 33. c. ic. *Aster bessarabicus* Bernh. ex Reichenb. Flor. excurs. 246.

2304 **Aster Novae Angliae** Ait. Hort. kew. ed. 1. III. 201. Nees Ast. 46. DC. Prodr. V. 231. — ♃ *Habitat in America boreali juxta rivulorum ripas, a Canada ad Carolinam.*

α. *Agrestis* Nees l. c. *Aster spurius* Willd. Spec. III. 2032. *Aster grandiflorus* Hortul.

2305. **Aster carolinianus** Walter Carolin. 208. DC. Prodr. V. 233. *Aster scandens* Jacq. f. in Sprengel Syst. III. 524. — ♃ — *Habitat in dumetis paludosis Americae borealis.*

β. *Hortensis* Nees l. c. (Bot. Reg. t. 183.)

2306. **Aster grandiflorus** Linn. Spec. 1231. Miller Ic. t. 282 Bot. Reg. t. 273. Nees Ast. 50. DC. Prodr. V. 232. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sylvis siccis, sabulosis.*

2307. **Aster sericeus** Venten. Cels. t. 33. DC. Prodr. V. 233. — ♃ — *Habitat in America boreali, in praeruptis fluminum Missisipi et Missouri ripis.*

3. Genuini.

α. Heterophylli.

2308. **Aster cordifolius** Linn. Spec. 1229. Nees Ast. 52. Lindl. Bot. Reg. t. 1597. DC. Prodr. V. 233. — ♃ — *Habitat in montosis sylvaticis Americae borealis, a Canada ad Floridam.*

2309. **Aster paniculatus** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 207. Nees Ast. 53. DC. Prodr. V. 233. — ♃ — *Habitat in sepibus et pratis Americae borealis a Canada ad Carolinam.*

2310. **Aster diversifolius** Michaux Flor. Bor.

Amer. II. 113. DC. Prodr. VII. 234. *Aster undulatus* Linn. Spec. 1228. Nees Ast. 57. — ♃ — *Habitat in siccis Americae borealis.*

b. Homophylli.

§. 1. Petiolati.

2311. **Aster patulus** Lam. Dict. I. 308. DC. Prodr. V. 234. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sepibus, a Canada ad Virginiam.*

β. *Aster pallens* Willdenow Enum. Suppl. 58. Lindley in Bot. Reg. t. 1509.

2312. **Aster abbreviatus** Nees Synops. 16. DC. Prodr. V. 234. *Aster acuminatus* Nees Ast. 60. excl. synon. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

§. 2. Amelloidei.

2313. **Aster praecox** Willd. Suppl. 58. Nees Ast. 62. DC. Prodr. V. 235. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2314. **Aster firmus** Nees Synops. 25. Ast. 66. DC. Prodr. V. 235. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2315. **Aster puniceus** Linn. Spec. 1229. DC. Prodr. V. 236. — ♃ — *Habitat in America boreali a Canada ad Virginiam.*

2316. **Aster vimineus** Willd. Spec. III. 2046. Nees Ast. 68. DC. Prodr. V. 236. — ♃ — *Habitat in Canada.*

2317. **Aster praealtus** Poir. Suppl. 1. 493. DC. Prodr. V. 236. *Aster virgatus* Nees Ast. 27. non Mönch. — ♃ — *Habitat in America boreali ad fossarum margines, a Noveboraco ad Virginiam.*

§. 3. Versiformes.

2318. **Aster aestivus** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 3. 203. Nees Ast. 74. DC. Prodr. V. 237. — ♃ — *Habitat in sylvis caeduis uliginosis Americae borealis.*

2319. **Aster tardiflorus** Nees Ast. 78. DC.

Prodr. V. 238. — ♃ — *Habitat in udis depressis Americae borealis.*

β. *Adulterinus. Aster adulterinus* Lindley in Bot. Reg. t. 1671.

2320. **Aster Novi-Belgii** Linn. Spec. 1231. Nees Ast. 79. DC. Prodr. V. 238. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

β. *Ampliflorus. Aster serotinus* Nees Synops. 21. *Aster floribundus* Nuttall Gen. Am. II. 158.

γ. *Floribundus. Aster floribundus* Willd. Spec. III. 2048.

2321. **Aster luxurians** Nees Ast. 83. DC. Prodr. V. 238. *Aster Novi-Belgii* Nuttall Gen. Am. II. 158. *Aster prenanthoides* Nees Synops. 23. — ♃ — *Habitat in sepibus et agris Americae borealis.*

2322. **Aster asper** Nees Ast. 84. DC. Prodr. V. 238. — ♃ — *Patria ignota.*

2323. **Aster adulterinus** Willd. Enum. II. 884. Nees Ast. 85. DC. Prodr. V. 238. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2324. **Aster longifolius** Lam. Dict. I. 306. DC. Prodr. V. 239 *Aster junceus* Aiton Hort. kew. III. 204. *Aster eminens* Nees Ast. 87. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

β. *Eminens. Aster eminens* Willdenow Enum. 886.

γ. *Albiflorus* DC. l. c. *Aster virgineus* Nees Synops. 22. *Aster eminens virgineus* Lindley in Bot. Reg. t. 1656.

2325. **Aster salignus** Willdenow Spec. III. 2040. DC. Prodr. V. 239. — ♃ — *Habitat in Europa media, secus fluviorum ripas.*

§. 4. Leucanthi.

2326. **Aster simplex** Willdenow Enum. II. 887. DC. Prodr. VI. 239. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2327. **Aster lanceolatus** Willdenow Spec. III. 2050. DC. Prodr. V. 240. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2328 **Aster recurvatus** Nees Aster 93. DC. Prodr. V. 240. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2329. **Aster leucanthemus** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 3. p. 401. DC. Prodr. V. 240. *Aster dracunculoides* Willdenow Spec. III. 2050. *Aster artemisiaeflorus* Poiret Suppl. I. 500. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2330. **Aster laxus** Willdenow Enum. II. 887. DC. Prodr. V. 240. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2331. **Aster bellidiflorus** Willdenow Enum. II. 886. DC. Prodr. V. 240. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

γ. *Aster rigidulus* Nees Syn. 29.

2332. **Aster Lamarkianus** Nees Ast. 100. DC. Prodr. V. 241. *Aster paniculatus* Lam. Dict. I. 306. non Ait. *Aster Tradescanti* Nees Syn. 28. — ♃ — *Habitat in Canada.*

2333. **Aster divergens** Aiton Hort. kew. III. 205. DC. Prodr. V. 241. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2334. **Aster fragilis** Willdenow Spec. III. 2051. Lindley Bot. Reg. t. 1527. DC. Prodr. V. 241. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2335. **Aster Tradescanti** Linn. Spec. 1230. DC. Prodr. V. 241. *Aster vimineus* Lam. Dict. I. 306. *Aster pinifolius* Nees Syn. 29. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sepibus et dumetis exsiccatis.*

2336. **Aster dumosus** Linn. Spec. 1227. DC. Prodr. V. 241. *Aster foliolosus* Nees Synops. 30. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2337. **Aster ericoides** Linn. Spec. 1227. DC. Prodr. V. 241. — ♃ — *Habitat in Americae borealis locis sterilibus.*

2338. **Aster pilosus** Willdenow Spec. III. 2025. DC. Prodr. V. 242. *Aster villosus* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 113. — ♃ — *Habitat in Americae borealis ditione Illinois.*

§. 5. Densiflori.

2339. **Aster diffusus** Aiton Hort. kew. III. 205. DC. Prodr. V. 242. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sepibus et agris.*

2340. **Aster miser** Linn. Spec. 1232. DC. Prodr. V. 243. — ♃ — *Habitat in pratis udis Americae borealis.*

β. Aster myrtifolius Willd. Enum. Suppl. 59.

2341. **Aster pendulus** Aiton Hort. kew. III. 205. DC. Prodr. V. 243. — ♃ — *Habitat in Americae borealis agris neglectis.*

§. 6. Concinni.

2342 **Aster tenuifolius** Linn. Spec. 1227. DC. Prodr. V. 244. *Aster polyphyllus* Willdenow Enum. II. 888. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2343. **Aster concinnus** Willdenow Enum. II. 884. Lindley in Bot. Reg. t. 1619. DC. Prodr. V. 245. — ♃ — *Habitat in Americae borealis campis et sylvis.*

2344. **Aster mutabilis** Aiton Hort. kew. III. 205. DC. Prodr. V. 245. — ♃ — *Habitat in Americae borealis agris neglectis et sylvis.*

2345. **Aster versicolor** Willdenow Spec. III. 2045. DC. Prodr. V. 246. — ♃ — *Habitat in Americae borealis arvis.*

2346. **Aster laevis** Linn. Spec. 1230. Lindley in Bot. Reg. t. 1500. DC. Prodr. V. 246. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sylvis.*

2347. **Aster laevigatus** Willdenow Spec. III. 2046. Hooker Bot. Mag. t. 2995. DC. Prodr. V. 246. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sylvis uliginosis.*

2348. **Aster amplexicaulis** Mühlenb. in Willdenow Spec. III. 2046. DC. Prodr. V. 246. — ♃ — *Habitat in sabulosis sylvarum marginibus Americae borealis.*

2349. **Aster rubricaulis** Lam. Dict. I. 305. DC. Prodr. V. 246. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2350. **Aster cyaneus** Hoffm. phytogr. Bl. I. 71. t. B. f. 1. Lindley in Bot. Reg. t. 1495. DC. Prodr. V. 246. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

β. Aster glaucus Nees Synops. 23.

2302. **Tripolium** Nees.

2351. **Tripolium vulgare** Nees Ast. 153. DC. Prodr. V. 253. *Aster Tripolium* Linn. Spec. 1226. Flor. dan. t. 615. E. B. t. 87. — ⊙ — *Habitat in paludosis salsis Europae totius.*

β *Pannonicum* Nees Ast. 153. *Aster pannonicus* Jacq. Hort. Vindob. I. 3. t. 8.

2303. **Galatella** Cass.

2352. **Galatella linifolia** Nees Ast. 170. DC. Prodr. V. 255. *Aster linifolius* Linn. Spec. 1228. — ♃ — *Habitat in umbrosis siccis Americae borealis.*

2353. **Galatella punctata** DC. Prodr. V. 255. — ♃ — *Habitat in Europa passim.*

β. *Angustifolia* DC. l. c. *Aster acris* Linn. Spec. 122. *Aster hyssopifolius* Cavanill. Ic. t. 232. — γ. *Insculpta* DC. l. c. *Aster punctatus* Waldstein et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 109. *Aster dracunculoides* Besser Enum. 33.

2354. **Galatella cana** Nees Ast. 163. DC. Prodr. V. 255. *Aster canus* Waldstein et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 30. — ♃ — *Habitat in fruticetis Banatus Hungariae.*

2355. **Galatella dracunculoides** DC. Prodr. V. 256. — ♃ — *Habitat in campestribus apricis Sibiriae.*

β. *Radiata* DC. l. c. *Aster dracunculoides* Lam. Dict. I. 303. *Aster strictus* Wenderoth in Act. Soc. Marburg. II. 64.

2356. **Galatella leptophylla** Nees Ast. 167. DC. Prodr. V 256. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2357. **Galatella fastigiata** Nees Ast. 169. DC. Prodr. V. 256. *Aster fastigiatus* Ledebour Ic. t. 161. — ♃ — *Habitat in collibus Sibiriae altaicae.*

2305. **Calimeris** Nutt.

2358. **Calimeris altaica** Nees Ast. 228. DC. Prodr. V. 258. *Aster altaicus* Willdenow Enum. II. 881. *Aster pumilus* Fischer Catalog. Hort. Gorenk. 62. — ♃ — *Habitat in montibus Sibiriae altaicae.*

2316. **Biotia** DC.

2359. **Biotia latifolia** DC. Prodr. V. 264. *Aster latifolius* Desfont. Catalog. Hort. Paris p. 176. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2360. **Biotia macrophylla** DC. Prodr. V. 265. *Aster macrophyllus* Linn. Spec. 1232. — ♃ — *Habitat in Americae borealis rupestribus.*

2361. **Biotia corymbosa** DC. Prodr. V. 265. *Aster corymbosus* Aiton Hort. kew. III. 207. Lindley in Bot. Reg. t. 1532. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Americae borealis.*

2317. **Eurybia** Cass.

2362 **Eurybia argophylla** Cassini in Dict. sc. nat. XXXVII. 487. DC. Prodr. V. 267. *Aster argophyllus* Labillard. Nov. Holl. II. 52. t. 201. Sims Bot. Mag. t. 1563. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali et meridionali, ubi observante All. Cunningham arbor vigintipedali, trunci diametro octopollicari. Folia trita moschum redolent.*

2319. **Diplostephium** Cass.

2363. **Diplostephium umbellatum** DC. Prodr. V. 272. *Aster umbellatus* Aiton Hort. kew. III. 199. Hoffmann phytogr. Blätt. 74. t. b. f. 2. — ♃ — *Habitat in paludosis Americae borealis.*

2364. **Diplostephium amygdalinum** Cassini in Dict. sc. nat. XXXVII. 486. DC. Prodr. V. 272. *Aster amygdalinus* Lam. Dict. I. 305. Lindley in Bot. Reg. t. 1517. — ♃ — *Habitat in umbrosis rupestribus Americae borealis.*

2365. **Diplostephium obovatum** DC. Prodr. V. 273. *Aster obovatus* Elliott Sketch. II. 368. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2320. **Callistephus** Cass.

2366. **Callistephus chinensis** Nees Ast. 221. DC. Prodr. V. 274. *Callistephus hortensis* Cassini

in Dict. sc. nat. XXXVII. 491. *Callistephus hortensis* Cassini in Bullet. soc. philomat. 1817. p. 32. *Diplopappus chinensis* Lessing Synops. 165. *Aster chinensis* Linn. Spec. 1232. — ⊙ — *Habitat in China et Japonia, nunc in hortis totius orbis colitur.*

2332. Erigeron Linn.

a. Euerigeron DC.

2367. **Erigeron glaucus** Ker in Bot. Reg. t. 10. DC. Prodr. V. 284. *Stenactis glauca* Nees Ast. 275. *Aster bonariensis* Sprengel Syst. III. 528. — ♃ — *Habitat in Bonaria.*

2368. **Erigeron speciosus** DC. Prodr. V. 284. *Stenactis speciosa* Lindley in Bot Reg. t. 1577. Hooker in Bot. Mag. t. 3606. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2369. **Erigeron glabellus** Nuttall Gen. Am. II. 148. Hooker Bot. Mag. t. 2923. DC. Prodr. V. 284. — ♃ — *Habitat in planitiebus fluvio Missouri conterminis.*

2370. **Erigeron philadelphicus** Linn. Spec. 1211. DC. Prodr. VI. 285 — ♃ — *Habitat in Americae borealis pascuis et agris, a Canada ad Carolinam.*

2371 **Erigeron bellidifolius** Mühlenb. in Willd. Spec. III. 1958. Sims Bot. Mag. t. 2402. DC. Prodr. V. 285. — ♃ — *Habitat in siccis umbrosis Americae borealis a Canada ad Carolinam.*

2372. **Erigeron pulchellus** DC. Prodr. V. 287. *Aster pulchellus* Willdenow Spec. III. 2019. *Aster alwartensis* Loddig. ex Bot. Mag. t. 2321. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Sibiria.*

2373. **Erigeron canadensis** Linn. Spec. 1211. Flor. dan. t. 292. DC. Prodr. V. 289. — ♃ — *Habitat in agris et arvis totius fere orbis, in America boreali indigenus.*

b. Trimorphaea Cass.

2374. **Erigeron acris** Linn. Spec. 1211. E. B. t. 1158. Schkuhr Handb. t. 241. DC. Prodr. V.

290. — ♃ — *Habitat in apricis siccis Europae totius et Caucasi.*

2375. **Erigeron elongatus** Ledebour Flor. alt. IV. 91. Ic. t. 31. DC. Prodr. V. 291. — ♃ — *Habitat in siccis lapidosis Sibiriae altaicae et baicalensis.*

2376. **Erigeron armerifolius** Turczanin. ex DC. Prodr. V. 291. — ♃ — *Habitat in uliginosis subsalsis Dahuriae.*

2377. **Erigeron alpinus** Lam. Fl fr. n. 140. E. б. t. 464. DC. Prodr. V. 291. *Stenactis alpina* Cassini Dict. sc. nat. L. 485. — ♃ — *Habitat in pascuis montanis et alpinis Europae et Sibiriae.*

β. *Rupestris. Erigeron rupestris* Hoppe Plant. sicc.

2378. **Erigeron Villarsii** Bellard. Append. ad Flor. Pedem. 38. t. 7. DC. Prodr. V. 291. *Erigeron atticum* Villars Delph. III. 237. — ♃ — *Habitat in collibus Delphinatus, Pedemontii, Vallesiae.*

2339. Stenactis Nees.

2379. **Stenactis annua** Nees Ast. 273. DC. Prodr. V. 298. *Aster annuus* Linn. Spec. 1229. Flor. dan. t. 486. — ⊙ — *Habitat in America boreali, ex hortis aufuga nunc in Europa vulgaris.*

2341. Charieis Cass.

2380. **Charieis Neesii** Cassini Dict. sc. nat. XXIV. 372. *Kaulfussia amelloides* Nees in Hor phys. berol. 53. t. 11. — ⊙ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2343. Boltonia Herit.

2381. **Boltonia glastifolia** Heritier Sert. Angl. 27. Hooker in Bot. Mag. t. 2381. DC. Prodr. V. 301. *Madea glauca* Soland. msc. — ♃ — *Habitat in America boreali, locis humidis.*

2382. **Boltonia asteroides** Heritier Sert. Angl. 27. DC. Prodr. V. 302. *Matricaria asteroides* Linn. f. Mant. 116. — ♃ — *Habitat in paludosis Americae borealis.*

2347. **Bellium** Linn.

2383. **Bellium bellidioides** Linn. Mant. 285. Lam. t. 684. Viviani Fragm. t. 10. f. 1. DC. Prodr. V. 303. — ⊙ — *Habitat in rupestribus humidis Corsicae, Sardiniae, insularum Balearicarum, nec non Chalci et Rhodi.*

2348. **Bellis** Linn.

2384. **Bellis perennis** Linn. Spec. 1248. Flor. dan. t. 502. E. B. t. 424. DC. Prodr. V. 304. — ♃ — *Habitat in pratis et pascuis Europae et Tauriae.*

2353. **Myriactis** Less.

2385. **Myriactis Gmelini** DC. Prodr. V. 309. *Botryadenia Gmelini* Fischer et C. A. Meyer. — ♃ — *Habitat in Persiae provincia Gilan.*

2354. **Garuleum** Cass.

2386. **Garuleum pinnatifidum** DC. Prodr. V. 309. *Garuleum viscosum* Cassini in Dict. sc. nat. XVIII. 325. *Osteospermum pinnatifidum* Thunb. Flor. cap. 717. Heritier Stirp. t. 6. *Osteospermum caeruleum* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 275. Jacq. Collect. 1. 78. Ic. rar. t. 179. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2364. **Grindelia** Willd.

2387. **Grindelia squarrosa** Dunal in Mem. Mus. V. 50. DC. Prodr. V. 315. *Donia squarrosa* Pursh Flor. Bor. Amer. II. 559. Bot. Mag. t. 1706. *Aurelia amplexicaulis* Cassini in Dict. sc. nat. XXXVII. 468. — ♃ — *Habitat in pratis apricis secus confluentes fluminis Missouri.*

2388. **Grindelia inuloides** Willdenow in Berlin. Magaz. 1807. p 261. Dunal in Mem. Mus. V. 50. t. 1. DC. Prodr. V. 315. *Grindelia spathulata* Link Enum. II. 336. *Aster spathulatus* Hort. Madrit 1805. *Inula serrata* Persoon Encheir. II. 451. *Demetria spa-*

thulata Lagasca Elench. Hort. Madrit. 1814. p. 30. — ♂ — *Habitat in Mexico et Texa.*

2365. Heterotheca Cass.

2389. **Heterotheca inuloides** Cassini in Dict. sc. nat. LI. 460. DC. Prodr. V. 317. *Doronicum mexicanum* Lagasca ex Link et Otto Abbild. t. 22. *Diplocoma villosum* Don in Sweet Fl. Gard. I. t. 246. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2376. Solidago Linn.

a. Virgaurea Tournef.

§ 1. Unilaterales. Racemi secundi, subscorpioidei.

* **Triplinerviae.** Folia triplinervia.

2390. **Solidago canadensis** Linn. Spec. 1233. DC. Prodr. V. 330. — ♃ — *Habitat in sepibus et agris Americae borealis a Canada ad Pensylvaniam, nec non in montibus Carolinae.*

2391. **Solidago procera**, Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 211. DC Prodr. V. 330. — ♃ — *Habitat in sepibus et paludosis Americae borealis a Canada ad Virginiam.*

2392. **Solidago longifolia** Schrader msc. ex DC. Prodr. V. 330. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2393. **Solidago nutans** Desfont. Cat. Hort. Paris. ed. 3. p. 402. DC. Prodr. V. 330. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2394. **Solidago reflexa** Aiton Hort. kew. edit. 1. III. 211. DC Prodr. V. 331. — ♃ — *Habitat in pinetis et agris desertis Americae borealis, a Nova Caesarea ad Carolinam.*

2395. **Solidago fragrans** Willd. Enum. Suppl. 59. Link Hort. berolin. II. 531. DC. Prodr. V. 331. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2396. **Solidago lateriflora** Linn. Spec. 1234. DC. Prodr. V. 331. — ♃ — *Habitat in campis et sylvis siccis Americae borealis a Canada ad Carolinam.*

2397. **Solidago glabra** Desfont. Cat. Hort. Paris. ed. 3. p. 402. DC. Prodr. V. 331. — ♃ — *Habitat in sylvis et sepibus Americae borealis.*

β. *Solidago serotina* Aiton Hort. kew. III. 211.

2398. **Solidago gigantea** Aiton Hort. kew. ed. 1. III 211. DC. Prodr. V. 331. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Americae borealis.*

** **Venosae.** Folia penninervia v. venosa.

2399. **Solidago altissima** Linn. Spec. 1233. DC. Prodr. V. 333. *S. rigidula* Bosc. Hort. Paris. — ♃ — *Habitat in sepibus et agris Americae borealis.*

Var. β. *Virginiana* Mill. Dict.

2400. **Solidago rugosa** Miller Dict. n. 25. Willd. Spec. III. 2058. DC. Prodr. V. 333. *S. altissima* e. Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 213. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2401. **Solidago villosa** Pursh Flor. Bor. Amer II. 538. DC. Prodr. V. 333. — ♃ — *Habitat in Americae borealis sylvis et agris.*

2402. **Solidago scabra** Mühlenb. in Willd. Spec. III. 2059. DC. Prodr. V. 333. — ♃ — *Habitat in versuris Americae borealis, a Pensylvania ad Virginiam.*

2403. **Solidago nemoralis** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 213. DC. Prodr. V. 333. — ♃ — *Habitat locis arenosis et in agris siccis Americae borealis, a Canada ad Carolinam*

2404. **Solidago arguta** Aiton Hort. kew. edit. 1. III. 313. DC. Prodr. V. 333. — ? *S. argentea* Hornem. Suppl. 99 — ♃ — *Habitat in sylvis et pratis Americae borealis a Canada ad Virginiam.*

2405. **Solidago juncea** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 213. DC. Prodr. V. 334. — ♃ — *Habitat in agris et sylvis arenosis Americae borealis.*

2406. **Solidago elliptica** Aiton Hort. kew.

edit. 1. III. 313. DC. Prodr. V. 334. *S. latissimifolia* Mill. Dict. n. 1. —♃— *Habitat in umbrosis rupestribus Americae borealis.*

Var. β. *S. plantaginea* Desfont. Cat. Hort. Paris. edit. III. 402.

2407 **Solidago recurvata** Willd. Enum. 889. DC. Prodr. V. 334. —♃— *Habitat in sylvis umbrosis Americae borealis.*

2408. **Solidago odora** Aiton Hort. kew. edit. 2. III. 214. Bigelow Med. Bot. I. 188. t. 20. DC. Prodr. V. 334. non Willd. *S. retrorsa* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 117. —♃— *Habitat in collibus siccis Americae borealis, a Canada ad Carolinam.*

Goldenrod dicitur, et pro potu theato inservit. Folia fragrantia destillatione oleum volatile aromaticum largiuntur.

2409 **Solidago sempervirens** Linn. Spec. 1232. DC. Prodr. V. 335. *S. tardiflora* Mönch. —♃— *Habitat in humidis juxta rivos Americae borealis.*

§. 2. Erectae. Racemi stricti, nec secundi.

* **Serratae.** Folia serrata.

2410. **Solidago petiolaris** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 216. DC. Prodr. V. 335. —♃— *Habitat in siccis arenosis Americae borealis.*

2411. **Solidago flexicaulis** Linn. Spec. 1234. DC. Prodr. V. 335. —♃— *Habitat in sylvis et agris Americae borealis.*

2412. **Solidago latifolia** Linn. Spec 1234. DC. Prodr. V. 335. —♃— *Habitat in Canada.*

2413. **Solidago flabelliformis** Wendl. ex DC. Prodr. V. 336. —♃— *Habitat in America boreali.*

2414. **Solidago ambigua** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 217. Willd. Spec. III. 2064. Enum. 891. DC. Prodr. V. 336. —♃— *Habitat in America boreali.*

2415. **Solidago multiflora** Desfont. Cat. Hort. Paris. 1804. p. 103. Ed. 3. p. 402. DC. Prodr. V. 336. —♃— *Habitat in America boreali.*

2416. **Solidago livida** Willd. Enum. 891.

DC. Prodr. V. 336. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2417. **Solidago hirta** Willd. Enum. 891. DC. Prodr. V. 337. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2418. **Solidago rigida** Linn. Spec. 1235. DC. Prodr. V. 337. — ♃ — *Habitat in montibus Americae borealis.*

2419. **Solidago carinata** Schrader msc. DC. Prodr. V. 337. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2420. **Solidago virgata** Michaux Flor. Bor. II. 117. DC. Prodr. V. 338. — ♃ — *Habitat in humidis umbrosis Carolinae inferioris et Georgiae.*

2421. **Solidago Virga-aurea** Linn. Spec. 1235. DC. Prodr. V. 338. — ♃ — *Habitat in collibus Europae mediae et australis.*

α. *Vulgaris* DC. *S. vulgaris* Lam. Fl. fr. II. 145. (E. B. t. 301. Flor. dan. t. 663.)

γ *Alpestris* DC. *S. alpestris* Waldst. et Kitaibel ex Willd. Sp. III. 2065.

δ. *Cambrica* DC. *S cambrica* Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 218.

η. *Littoralis* DC. *S. littoralis* Savi Bot. etrusc. IV. 87. — *Habitat in littoribus maris etrusci.*

κ. *Arenaria* DC. *S. arenaria* Hornem. Suppl. I. 99. — *Habitat in Hungaria.*

** **Integrifolia.** Folia integerrima.

2422. **Solidago fuscata** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed 3. p. 402. DC. Prodr. V. 340. — ♃ — *Habitat verisimiliter in America boreali.*

2423. **Solidago viminea** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 215. — ♃ — *Habitat ad ripas fluviorum Americae borealis.*

2424. **Solidago laevigata** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 215. DC. Prodr. V. 340. — ♃ — *Habitat in paludosis salsis Americae borealis.*

b. Euthamia Nutt.

2425. **Solidago graminifolia** Elliott Carolin. II. 391. DC. Prodr. V. 341. *Solidago lanceolata*

Willd. Spec. III. 2060. *S. lanceolata α major* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 116. *Euthamia graminifolia* Nutt. Gen. Bor. Amer. II. 162. *Chrysocoma graminifolia* Linn. Spec. 1178. — ♃ — *Habitat in agris et pascuis Americae borealis.*

2381. **Haplopappus** Cass.

2426. **Haplopappus ciliatus** DC. Prodr. V. 346. — ☉ — *Habitat in Americae borealis territorio Arkansas.*

2384. **Linosyris** Lobel.

2427. **Linosyris vulgaris** Cassini ex Lessing Synops. 195. DC. Prodr. V. 352. *Chrysocoma Linosyris* Linn. Spec. 1178. Schkuhr Handb. t. 238. *Crinitaria Linosyris* Lessing Synops. 195. — ♃ — *Habitat in apricis rupestribus Europae et Tauriae.*

2428. **Linosyris punctata** Cassini in Dict. sc. nat. XXXVII. 476. DC. Prodr. V. 353. *Chrysocoma biflora* Linn. Spec. 1178. *Chrysocoma dracunculoides* Lam. Dict. II. 192. *Crinita punctata* Mönch Method. 578. *Crinitaria biflora* Lessing Synops. 195. — ♃ — *Habitat in campis subsalsis Sibiriae.*

2385. **Chrysocoma** Cass.

2429. **Chrysocoma Coma-aurea** Linn. Spec. 1178. DC. Prodr. V. 358. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2391. **Chroilema** Bernh.

2430. **Chroilema subcanescens** Bernhardi Ind. Sem. Hort. Erf. 1839. — ♃ — *Habitat in Chili.*

Subtribus II. Baccharideae.

2396. **Dichrocephala** DC.

2431. **Dichrocephala latifolia** DC. Prodr. V. 372. *Cotula bicolor* Roth Catalect. n. 116. *Cotula*

latifolia Persoon Encheir. II. 464. — ⊙ — *Habitat in Asia tropica et Madagascaria.*

2405. **Conyza** Less.

§. 1. Dimorphanthes Cass.

2432. **Conyza chilensis** Sprengel Nov. Prov. 1818. p. 14. Lessing in Linnaea VI. 136. DC. Prodr. V. 378. *Conyza procera* Desfont. Catalog. Hort. Paris. 1829. p. 164. *Dimorphanthes procera* Cassini in Dict. sc. nat. XXV. 93. — ♃ — *Habitat in Brasilia, Chili et ad portum Mulgrave.*

2433. **Conyza Gouani** Willdenow Spec. III. 1928. DC. Prodr. V. 380. *Erigeron Gouani* Linn. Mant. 469. Jacq. Hort. Vindob. t. 79. *Dimorphanthes Gouani* Cassini in Dict. sc. nat. XIII. 255. - ♃ — *Habitat in insulis Canariensibus Palma et Teneriffa.*

2434. **Conyza ambigua** DC. Fl. fr. Suppl. 468. Prodr. V. 381. *Erigeron linifolium* Willdenow Spec. III. 1955. — ⊙ — *Habitat in Italia et Gallia meridionali.*

§. 2. Fimbrillaria Cass.

2435. **Conyza ivaefolia** Lessing in Linnaea VI. 388. DC. Prodr. V. 388. *Baccharis ivaefolia* Linn. Spec. 1204. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2410. **Baccharis** Linn.

2436. **Baccharis halimifolia** Linn. Spec. 1204. Duham. Arbr. ed. 1. I. t. 35. ed. 2. I. t. 60. DC. Prodr. V. 412. — ♄ — *Habitat in maritimis Americae borealis.*

Subtribus III. Tarchonantheae.

2412. **Tarchonanthus** Linn.

2437. **Tarchonanthus camphoratus** Linn. Spec. 1179. Lam. Illustr. t. 671. f. 1. DC. Prodr. V. 431. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2414. **Pluchea** Cass.

2438. **Pluchea subdecurrens** Cassini in Dict. sc. nat. XLII. 4. DC. Prodr. V. 450. *Conyza asteroides* Desfont. Catalog. Hort. Paris. 1815. p. 114. non Linn. *Conyza adnata* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. IV. 74. *Baccharis adnata* Willdenow Enum. 870. — ♄ — *Habitat in salsis Mexici.*

2439. **Pluchea odorata** Cassini in Dict. sc. nat. XLII. 3. DC. Prodr. V. 452. *Conyza odorata* Linn. Spec. 1208. *Conyza carolinensis* Jacq. Collect. II. 271. Ic. rar. t. 585. — ♄ — *Habitat in Carolina, Florida et Mexico.*

Subtribus IV. Inuleae.

2426. **Inula** Gärtn.

1. Corvisartia Merat.

2440. **Inula Helenium** Linn. Spec. 1236. Flor. dan. t. 728. Gärtner Carp. II. 449. t. 170. DC. Prodr. V. 463. *Corvisartia Helenium* Merat Flor. Paris. ed. 2. II. 261. Cassini Dict. X. 572. — ♃ — *Habitat in Europa media.*

Radix valida, anomatico - amara, Esula Campana officinarum.

2. Bubonium DC.

2441. **Inula Conyza** DC. Prodr. V. 464. *Conyza squarrosa* Linn. Spec. 1205. Flor. dan. t. 622. E. B. t. 1195. — ♃ — *Habitat in collibus et pratis siccis, imprimis solo calcareo Europae fere totius, nec non in Tauria et Persia.*

2442. **Inula suaveolens** Jacq. Hort. Vindob. III. 29. t. 51. DC. Prodr. V. 464. — ♃ — *Habitat in Italia et Gallia mediterranea.*

2443. **Inula candida** Cassini Dict. sc. nat. XXIII. 554. DC. Prodr. V. 464. — ♃ — *Habitat in rupestribus Dalmatiae et Graeciae.*

β *Limonifolia* DC. l. c. *Conyza limonifolia* Sibthorp Flor. graec. t. 865. *Conyza candida* Willdenow Spec. 1208.

2444. **Inula thapsoides** DC. Prodr. V. 464. — ♃ — *Habitat in herbidis Caucasi.*

α. *Sprengelii* DC. l. c. *Inula thapsoides* Sprengel Pugill. I. 58.

β. *Poiretii* DC. l. c. *Inula thapsoides* Reichenb. Iconogr. t. 347. *Inula verbascifolia* Poiret Suppl. III. 154.

γ. *Biebersteinii* DC. l. c. *Conyza thapsoides* Bieberst. Suppl. n. 1716.

2445. **Inula Oculus-Christi** Linn. Spec. 1237. Jacq. Flor. austr. t. 129. DC. Prodr. V. 465. — ♃ — *Habitat in apricis graminosis Austriae, Hungariae, Dalmatiae et Caucasi.*

2446. **Inula hirta** Linn. Spec. 1239. Jacq. Flor. austr. t 358. DC. Prodr. V. 466. — ♃ — *Habitat in pratis montosis asperis Europae mediae et australis, nec non Sibiriae.*

2447. **Inula Vaillantii** Villars Delph. III. 216. DC. Prodr. V. 466. *Aster Vaillantii* Allioni Flor. Pedem. n. 719. — ♃ — *Habitat in dumetis et pratis montosis Helvetiae, Sabaudiae, Delphinatus et Pedemontii.*
Herba fere Melissam redolens.

2448. **Inula semiamplexicaulis** Reuter Mem. Soc. phys. Genev. VII. 169. c. ic. DC. Prodr. V. 466. — ♃ — *Habitat in Pedemontio, fortassis I. Vaillantii* Vill. et *I. salicinae Linn. hybrida proles.*

2449. **Inula salicina** Linn. Spec. 1238. Flor. dan. t. 786. DC. Prodr. V. 466. — ♃ — *Habitat in pratis asperis dumetis et sylvis Europae mediae et australis.*

β. *Latifolia. Inula aspera* Poiret Suppl. III. 154.

γ. ? *Lancifolia. Inula lancifolia* Wenderoth in Flora 1829. Ergänzbl. I. 26.

δ. *Caucasica.*

2450. **Inula ensifolia** Linn. Spec. 1240. Jacq. Flor. austr. t. 162. DC. Prodr. V. 466. — ♃ — *Habitat in collibus asperis Europae orientalis et australis, nec non in Caucaso.*

2451. **Inula squarrosa** Linn. Spec. 1240.

DC. Prodr. V. 467. — ♃ — *Habitat in sylvis lapidosis Europae australioris.*

2452. **Inula spiraeifolia** Linn. Spec. 1238. DC. Prodr. V. 467. *Inula Bubonium* Murray Syst. 767. Jacq. Flor. austr. App. t. 19. — ♃ — *Habitat in Pedemontio, Carniolia, Austria littorali, Podolia, regione taurico-caucasica et Persia.*

β. *Hybrida* Baumg. Flor. Transylv. III. 132. — *Podolia et Transylvania.*

2453. **Inula germanica** Linn. Spec. 1239. Jacq. Flor. austr. t. 134. DC. Prodr. V. 467. —♃— *Habitat in herbidis apricis Germaniae mediae et Caucasi.*

2454. **Inula media** Bieberst. Flor. taur. cauc. Suppl. 576. DC. Prodr. V. 467. — ♃ — *Habitat in Polonia australiore.*

2455. **Inula caspica** Bunge in Ledebour Ind. Sem. Hort. Dorpat. 1822. p. 10. DC. Prodr. V. 467. — ♃ — *Habitat in salsis ad mare Caspicum prope Astrachan.*

2456. **Inula Britanica** Linn. Spec. 1237. Schkuhr t. 247. Flor. dan. t. 413. DC. Prodr. V. 468. — ♃ — *Habitat in pratis secus vias et fossas Europae mediae et australis, Orientis et Sibiriae.*

E Britannia exul. nec » Britannica « sed » Britanica « (Βρεταννικη Diosc. IV. 2.) dicenda.

2457. **Inula montana** Linn. Spec. 1241. DC. Prodr. V. 468. *Aster montanus* Allioni Flor. Pedemont. n. 706. — ♃ — *Habitat in montanis sterilibus Europae australioris.*

2458. **Inula grandiflora** Willdenow Spec. III. 2098. DC. Prodr. V. 468. — ♃ — *Habitat in alpestribus Caucasi iberici et in Persia.*

3. Limbarda Adans.

2459. **Inula crithmoides** Linn. Spec. 1240. E. B. t. 68. DC. Prodr. V. 470. *Inula crithmifolia* Willdenow Spec. III. 2101. *Senecio crithmifolius* Scopoli Flor. carn. n. 1066. *Limbarda tricuspis* Cassini in Dict.

sc. nat. XXVI. 438. — ♄ — *Habitat in rupibus maritimis littoris mediterranei et atlantici.*

2460. **Inula viscosa** Aiton Hort. kew. III. 223. DC. Prodr. V. 470. *Erigeron viscosum* Linn. Spec. 1209. Jacq. Hort. Vindob. t. 165. *Solidago viscosa* Lam. Fl. fr. II. 144. — ♃ — *Habitat in apricis regionis mediterraneae et Teneriffae.*

2433. Jasonia DC.

2461. **Jasonia sicula** DC. Prodr. V. 477. *Conyza sicula* Willdenow Spec. III. 1931. *Erigeron siculum* Linn. Spec. 1210. *Jasonia discoidea* Cassini in Dict. sc. nat. XXIV. 201. — ⊙ — *Habitat in paludosis maritimis Siciliae, Galliae et Hispaniae.*

2462. **Jasonia tuberosa** DC. Prodr. V. 476. *Erigeron tuberosum* Linn. Spec. 1212. *Inula tuberosa* Lam. Dict. III. 260. — ♃ — *Habitat in apricis regionis mediterraneae.*

2434. Pulicaria Gärtn.

2463. **Pulicaria vulgaris** Gärtner Carp. II. 461. t. 173. DC. Prodr. V. 479. *Inula Pulicaria* Linn. Spec. 1238. Flor. dan. t. 613 Engl. Bot. t. 1196. — ⊙ — *Habitat in uliginosis Europae totius, nec non Sibiriae.*

2464. **Pulicaria dysenterica** Gärtner Carp. II. 462. DC. Prodr. V. 479. *Inula dysenterica* Linn. Spec. 1237. Flor. dan. t. 410. E. B. t. 1115. — ♃ — *Habitat in pratis uliginosis et fossis Europae totius.*

2465. **Pulicaria odora** Reichenb. Flor. excurs. n. 1532. DC. Prodr. V. 479. *Inula odora* Linn. Spec. 1236. — ♃ — *Habitat in apricis Europae australioris.*

Subtribus V. Buphthalmeae.

2439. Buphthalmum Neck.

2466. **Buphthalmum salicifolium** Linn.

Spec. 1275. Jacq. Flor. austr. t. 370. DC. Prodr. V. 483. — ♃ — *Habitat in Europa omni.*

2440. Telekia Baumg.

2467. **Telekia cordifolia** DC. Prodr. V. 485. *Telekia speciosa* Baumg. Flor. Transylv. III. 150. *Molpadium suaveolens* Cassini Dict. sc. nat. XXXII. 401. *Buphthalmum cordifolium* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. II. 117. t. 113. *Buphthalmum speciosum* Schreber Decad. 11. t. 6. — ♃ — *Habitat in pratis sylvaticis Hungariae, Transylvaniae, Tauriae et Persiae.*

2468. **Telekia speciosissima** DC. Prodr. V. 485. *Buphthalmum speciosissimum* Arduin. Specim. I. 26. t. 1. Reichenb. Iconogr. t. 349. — ♃ — *Habitat in vallibus Italiae superioris.*

2441. Asteriscus Mönch.

2469. **Asteriscus maritimus** Mönch Method. 592. DC. Prodr. V. 486. *Buphthalmum maritimum* Linn. Spec. 1274. *Nauplius maritimus* Cassini Dict. sc. nat. XXXIV. 274. — ♃ — *Habitat in rupibus maritimis orae mediterraneae.*

2470. **Asteriscus sericeus** DC. Prodr. V. 486. *Buphthalmum sericeum* Linn. f. Suppl. 379. Bot. Mag. t. 1836. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

2442. Pallenis Cass.

2471. **Pallenis spinosa** Cassini in Dict. sc. nat. XXXVII. 275. DC. Prodr. V. 487. *Buphthalmum spinosum* Linn. Spec. 1274. Schkuhr Handb. t. 258. — ⊙ — *Habitat in asperis subhumidis et apricis regionis mediterraneae.*

Subtribus VI. Eclipteae.

2443. Borrichia Adans.

2472. **Borrichia frutescens** DC. Prodr. V. 489. *Buphthalmum frutescens* Linn. Spec. 1273. *Diome-*

dea bidentata Cassini in Dict. sc. nat. XIII. 283. — ♂ — *Habitat in maritimis Americae borealis.*

2446. Eclipta Linn.

2473. **Eclipta erecta** Linn. Mant. 286. DC. Prodr. V. 490. *Verbesina alba* Linn. Spec. 1272. —☉— *Habitat inter tropicos totius orbis.*

2474. **Eclipta longifolia** Schrader msc. ex DC. Prodr. V. 490. — ☉ — *Habitat in insulis Antillanis.*

2475. **Eclipta patula** Schrader msc. 1832. *Eclipta procumbens* β. *patula* DC. Prodr. V. 491. —☉— *Patria ignota.*

2476. **Eclipta hirsuta** Bartling msc. 1840. — ☉ — *Patria ignota.*

2447. Blainvillea Cass.

2477. **Blainvillea rhomboidea** Cassini in Dict. sc. nat. XXIX. 493. DC. Prodr. V. 492. *Verbesina dichotoma* Murray Comment. Götting. 1779. p. 15. t. 4. — ☉ — *Habitat in Brasilia.*

2478. **Blainvillea latifolia** DC. Prodr. V. 492. *Eclipta latifolia* Linn. f. Suppl. 378. — ☉ — *Habitat in Asia tropica.*

2448. Salmea DC.

2479. **Salmea Eupatoria** DC. Catalog. Hort. Monsp. 140. Prodr. V. 493. *Hopkirkia Eupatoria* Sprengel Syst. III. 443. *Eupatorium Houstonis* et *Eupatorium Gouani* Hortul. non Linn. — ♄ — *Habitat in insulis Caribaeis.*

2449. Dahlia Cav.

2480. **Dahlia variabilis** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 3. p. 182. DC. Prodr. V. 494. *Georgina variabilis* Willdenow Hort. Berol. t. 93—95. — ♃ — *Habitat in Mexico, circa annum 1790 in hortos*

introducta, innumeris varietatibus, multivario speciosi capituli nitore certantibus, culta semperque colenda.

2481. **Dahlia coccinea** Cavanill. Ic. III. 33. t. 266. Thouin in Annal. Mus. III. 422. t. 3. f. 2. Curtis in Bot. Mag. t. 767. DC. Prodr. V. 494. *Dahlia crocata* Lagasca Elench. 31. *Georgina coccinea* Willdenow Hort. Berol. II. t. 96. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2482. **Dahlia Merkii** Lehmann Index Sem. Hort. Hamb. 1839. p. 7. *Dahlia minor* Visiani Index Sem. Hort. Patav. *Dahlia glabrata* Lindley in Bot. Reg. 1840. t. 29. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2483. **Dahlia scapigera** Otto et Dietrich msc. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2451. **Siegesbeckia** Linn.

Pentameranthes DC.

2484. **Siegesbeckia orientalis** Linn. Spec. 1269. DC. Prodr. V. 495. — ⊙ — *Habitat in India orientali.*

Tribus IV. Senecionideae.

Subtribus I. Melampodinae.

2454. **Euxenia** Cham.

2485 **Euxenia grata** Chamisso in Hor. phys. berolin. 75. t. 16. Cassini in Dict. sc. nat. L. 472. DC. Prodr. V. 501. *Ogiera triplinervia* Sprengel Syst. III. 674. non Cass. *Baccharis chilensis* Weinmann Syllog. pl. II. 21. *Podanthus ovatifolius* Lagasca Nov. gen. p. 24. n. 322. — ♃ — *Habitat in Chili, ubi Palo-negro dicitur.*

2457. **Elvira** Cass.

2486. **Elvira biflora** DC. Prodr. V. 503. *Milleria biflora* Linn. Spec. 1301. Gärtner Carp. II. 423. t. 168. Lam. t. 710. f. 1. *Delilia Berterii* Sprengel

Bullet. philomat. 1823. Syst. III. 674. —⊙— *Habitat in America tropica.*

2470. Baltimora Linn.

2487. **Baltimora recta** Linn. Mant. 288. excl. syn. Schkuhr Handb. t. 261. b. *Fougerouxia recta* DC. Prodr. V. 510. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2474. Silphium Linn.

a. Tereticaules.

2488. **Silphium laciniatum** Linn. Spec. 1301. Jacq. f. Eclog. t. 90. DC. Prodr. V. 512. —♃— *Habitat in America boreali juxta fluviorum ripas.*

2489. **Silphium terebinthinaceum** Linn. Suppl. 383. Jacq. Hort. Vindob. t. 43. Gärtner II. 445. t. 171. DC. Prodr. V. 512. —♃— *Habitat in montibus Carolinae et Louisianae.*

2490. **Silphium trifoliatum** Linn. Spec. 1302. DC. Prodr. V. 513. *Silphium ternatum* Desfont. Cat. Hort. Paris. edit. 3. p. 403. non Retz. —♃— *Habitat in montosis Virginiae, Carolinae et Georgiae.*

2491. **Silphium ternatum** Retz in Willd. Spec. III. 2333. DC. Prodr. V. 513. *Silphium ternifolium* Michaux Flor. Bor. Am. II. 148. *Silphium trifoliatum* Desfont. Cat. Hort. Paris. edit. 3. p. 182. Hooker Bot Mag. t. 3355. non Linn. —♃— *Habitat in montanis Carolinae et Georgiae.*

β. *Atropurpureum. Silphium atropurpureum* Retz in Willd. Spec. III. 2334.

b. Tetragona.

2492. **Silphium perfoliatum** Linn. Spec. 1301. Hooker Bot. Mag. t. 3354. DC. Prodr. V. 513. —♃— *Habitat in montanis Americae borealis, a Pensylvania ad Carolinam.*

β. *Conjunctum. Silphium conjunctum* Willd. Enum. 633.

γ. *Erythrocaulon. Silphium erythrocaulon* Bernhardi ex Sprengel Syst. III. 630.

δ. *Hornemanni.* *Silphium Hornemanni* Schrader Index Sem. Hort. Götting. 1819. DC. Prodr. V. 514.

2493. **Silphium connatum** Linn. Mant. 574. DC. Prodr. V. 514. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2475. **Polymnia** Linn.

α. **Uvedalia** DC.

2494. **Polymnia maculata** Cavanill. Ic. III. 14. t. 227. DC. Prodr. V. 515. *Polymnia Uvedalia* Hort. Paris. 1818. non Linn. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

β. **Alymnia** New.

2495. **Polymnia canadensis** Linn. Spec. 1303. Amoen. academ. V. 15. t. 1. f. 5. Lam. Illustr. t. 711. f. 1. DC. Prodr. V. 515. — ♃ — *Habitat in montanis Americae borealis.*

2478. **Melampodium** Linn.

1. Zarabellia Cass.

2496. **Melampodium longifolium** Cavanill. Hort. Madrit. Willd. Enum. 934. DC. Prodr. V. 520. — ☉ — *Habitat in Mexico.*

2. Alcina Cav.

2497. **Melampodium perfoliatum** Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. IV. 274. DC. Prodr. V. 520. *Alcina perfoliata* Cavanill. Ic. I. 10. t. 15. *Wedelia perfoliata* Willd. Spec. III. 2335. *Polymnia perfoliata* Poiret Dict. V. 506. *Camutia perfoliata* Bonat. — ☉ — *Habitat in Mexico.*

2480. **Xanthium** Tournef.

α. **Euxanthium** DC.

2498. **Xanthium macrocarpum** DC. Fl. fr. Suppl. 356. Prodr. V. 523. *Xanthium orientale* Linn. f. Decad. 33. t. 17. Gärtn. II. t. 164. Cavanill. Ic.

III. t. 221. *Xanthium echinatum* Murray Comm. Gött. 1784. *Xanthium italicum* Moretti Decad. V. 8. Reichenb. Iconogr. t. 323. —⊙— *Habitat in regione mediterranea, America boreali et Bonaria.*

2499. **Xanthium strumarium** Linn. Spec. 1400. Flor. dan. t. 270. E. B. t. 2544. Schkuhr Handb. t. 291. DC. Prodr. V. 523. —⊙— *Habitat in ruderatis et versuris Europae totius et Sibiriae.*

b. Acanthoxanthium DC.

2500. **Xanthium spinosum** Linn. Spec. 1400. DC. Prodr. V. 523. —⊙— *Habitat in agris et secus vias Europae australioris.*

2482. **Ambrosia** Tournef.

2501. **Ambrosia trifida** Linn. Spec. 1401; DC. Prodr. V. 527. —⊙— *Habitat in America boreali ad fluviorum ripas.*

2485. **Iva** Linn.

2502. **Iva frutescens** Linn. Amoen. Academ. III. 25. Gärtner Carp. II. t. 164. Lam. Illustr. t. 166. f. 2. DC. Prodr. V. 530. — ℏ — *Habitat in uliginosis maritimis Americae borealis, vulgo »Marsh-Elder« dicta.*

2486. **Cyclachaena** Fresen.

2503. **Cyclachaena xanthifolia** Fresen. Index Sem. Hort. Francof. 1836. p. 4. *Iva xanthifolia* Nuttall Gen. Amer. II. 185. DC. Prodr. V. 529. —⊙— *Habitat in ripis aridis fluvii Missouri.*

2489. **Parthenium** Linn.

2504. **Parthenium integrifolium** Linn. Spec. 1402. Willdenow Hort. Berolin. t. 4. DC. Prodr. V. 532. —♃— *Habitat in montosis Virginiae, Carolinae et Georgiae.*

Subtribus II. Heliantheae.

2493. **Zinnia** Linn.

2505. **Zinnia multiflora** Linn. Spec. 1269. Linn. f. Decad. 23. t. 12. DC. Prodr. V. 535. —⊙— *Habitat in Mexico, Louisiana et Brasilia boreali.*

2506. **Zinnia verticillata** Andrews Bot. Reposit. III. t. 189. DC. Prodr. V. 535. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2507. **Zinnia elegans** Jacq Collect. III. 152. Ic. rar. t. 589. Sims Bot. Mag. t. 527. DC. Prodr. V. 536. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2496. **Wedelia** Jacq.

2508. **Wedelia hispida** Humb. Bonpl. et Kunth Nov. Gen. et Sp. IV. 215. t. 71. Ker Bot. Reg. t. 543. DC. Prodr. V. 539. —♃— *Habitat in Mexici valle Tenochitl.*

2504. **Pascalia** Orteg.

2509. **Pascalia glauca** Ortega Dec. IV. 39. t. 4. DC. Prodr. V. 549. —♃— *Habitat in Chili.*

2506. **Heliopsis** Pers.

α. **Euheliopsis** DC.

2510. **Heliopsis laevis** Pers. Encheir. II. 473. Dunal in Mem. Mus. V. 55. Hooker Bot. Mag. t. 3372. DC. Prodr. V. 550. *Helianthus laevis* Linn. f. Suppl. 1278 *Buphthalmum helianthoides* Linn. Hort. Upsal. 264. Heritier Stirp. 93. t. 45. *Silphium solidaginoides* Linn. Spec. 1302. *Rudbeckia oppositifolia* Linn. Spec. 1280. —♃— *Habitat in America boreali in fluminum ripis rupestribus, umbrosis.*

2511. **Heliopsis scabra** Dunal in Mem. Mus. V. 56. t. 4. Hooker Flor. Bor. Amer. I. 310. DC. Prodr. V. 550. *Heliopsis canescens* Don in Bot. Reg. t.

592. excl. synon. — ♃ — *Habitat in America boreali, ad fluvios Missouri et Red-River.*

5. Kallias Cass.

2512. **Heliopsis buphthalmoides** Dunal in Mem. Mus. V. 57. DC Prodr. V. 550. *Anthemis ovalifolia* Ortega Decad. VI. 73 Desfont. Catalog. ed. 2. 125. *Anthemis buphthalmoides* Jacq. Hort. Schönbr. II. 13. t. 151. *Kallias ovata* Cassini Dict. sc. nat. XXIV. 327. — ♃ — *Habitat in Peruvia.*

2507. Guizotia Cass.

2513 **Guizotia oleifera** DC. Mem. Soc. h. n. Genev. VII. t. 2. Prodr. V. 551. *Polymnia abyssinica* Linn. f. Suppl. 383. *Verbesina sativa* Roxb. Cat. Hort. Calc. 62. Bot. Mag. t. 1017. *Veslingia scabra* Visiani Ind. Sem Hort. Patav. 1840. — ⨀ — *Colitur in Abyssinia, ubi* Nook *dicitur, et in India orientali (ubi* Ramtill *audit) ob semina oleifera.*

Nobis Var. a. *Sativa* DC. e seminibus a Theodoro Kotschy ex Africa missis nata.

2511. Zaluzania Pers.

2514. **Zaluzania triloba** Persoon Encheir. II. 473. DC. Prodr. V. 553 *Anthemis triloba* Ortega Dec. VI. 72. *Anthemis sinuata* Llav. et Lexarz Nov. veget. I. 30. *Aemella trilobata* Sprengel Syst. III. 591. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2513. Echinacea Mönch.

2515. **Echinacea purpurea** Mönch Meth. 591. DC. Prodr. V. 554. *Rudbeckia purpurea* Linn. Spec. 1280. Curtis Bot. Mag. t. 2. Schkuhr Handb. t. 259. — ♃ — *Habitat in Americae borealis montibus.*

2516. **Echinacea serotina** DC. Prodr. V. 554. *Rudbeckia serotina* Sweet Fl. Gard. t. 4. *Rudbeckia hispida* Hoffmans-Verzeichn. II. 1826. p. 201. *Rudbeckia speciosa* Link Enum. II. 353. non Schrad. — ♃ — *Habitat in Texas.*

2514. **Rudbeckia** Linn.

2517. **Rudbeckia laciniata** Linn. Spec. 1279. DC. Prodr. V. 555. —♃— *Habitat juxta fossas et ad margines lacuum Americae borealis.*

2518. **Rudbeckia digitata** Miller Dict. n. 6. Schrader N. Journ. II. 61. DC. Prodr. V. 555. —♃— *Habitat in montanis Virginiae et Carolinae.*

2519. **Rudbeckia fulgida** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 251. Sims Bot. Mag. t. 1996. DC. Prodr. V. 556. *Rudbeckia chrysomela* Michaux Flor. Bor. Amer. II. 143. *Rudbeckia aspera* Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 3. p. 183. —♃— *Habitat in pratis et sylvis montanis Americae borealis, a Pensylvania ad Carolinam.*

2520. **Rudbeckia hirta** Linn. Spec. 1280. Sweet Fl. Gard. I. t. 82. DC. Prodr. V. 556. —♃— *Habitat in montanis Virginiae et Floridae.*

2521. **Rudbeckia speciosa** Wenderoth in Flora 1829. I. 30. DC. Prodr. V. 556. —♃— *Patria ignota.*

2515. **Dracopis** Cass.

2522. **Dracopis amplexicaulis** Cassini in Dict. sc. nat. XXXV. 273. DC. Prodr. V. 558. *Rudbeckia amplexicaulis* Vahl in Dansk. Selsk. Skrift. II. 29. t. 4. Schkuhr t. 259. *Rudbeckia amplexifolia* Jacq. Ic. rar. t. 592. *Rudbeckia perfoliata* Cavanill. Ic. III. 27. t. 252. —⊙— *Habitat in Louisiana inferiori, ad ripas fluvii Missisipi et in Mexico.*

2516. **Obeliscaria** Cass.

Lepachys Raf.

2523. **Obeliscaria pinnata** Cassini Dict. sc. nat. XLVI. 402. DC. Prodr. V. 558. *Rudbeckia pinnata* Venten. Hort. Cels. t. 71. Smith Exot. Bot. I. t. 38. Sims Bot. Mag. t. 2310. *Rudbeckia digitata* Willd. Spec. III. 2247. *Rudbeckia odorata* et *R. cinerea* Hort. *Lepachys pinnatifida* Rafinesque Journ. Phys. 1829. p. 100. —♃— *Habitat in Carolina occidentali et Georgia.*

2518. Anomostephium DC.

2524. **Anomostephium buphthalmoides** DC. Prodr. V. 560. — ♃ — *Habitat in Guadalupa.*

2522. Montagnea DC.

2525. **Montagnea tomentosa** DC. Prodr. V. 564. *Montanoa tomentosa* Llav. et Lexarz. Nov. Veg. II. 11. *Eriocoma fragrans* Sweet Fl. Gard. II. t. 44. *Eriocoma heterophylla* Schrader Ind. Sem. Hort. Götting. 1833. p. 3. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

2526. Chrysostemma Less.

2526. **Chrysostemma Tripteris** Lessing Synops. 227. DC. Prodr. V. 568. *Coreopsis Tripteris* Linn. Spec. 1282. — ♃ — *Habitat in montibus celsioribus Carolinae et Virginiae.*

2527. Calliopsis Reichenb.

2527. **Calliopsis bicolor** Reichenb. Magaz. t. 70. *Calliopsis tinctoria* DC. Prodr. V. 568. *Coreopsis tinctoria* Nuttall in Journ. Academ. Philadelph. 1821. Octob. p. 114. Radius in Schrift. Leipz. Gesellsch. 1822. p. 159. t. 3. Bot. Mag. t. 2512. Bot. Reg. t. 846. Link et Otto Ic. t. 33. *Diplosastra tinctoria* Tausch Hort. canal. fasc. 1. — ⊙ — *Habitat in pratis ditionis Arkansas, a fluvio rubro (Red-River) inundatis.*

2528. **Calliopsis Atkinsoniana** Hooker Flor. Bor. Amer. I. 311. DC. Prodr. V. 568. *Coreopsis Atkinsoniana* Douglas in Lindley Bot. Reg. t. 1376. — ♃ — *Habitat ad ripas fluminis Columbiae.*

2529. Coreopsis Linn.

2529. **Coreopsis lanceolata** Linn. Spec. 1283. DC. Prodr. V. 570. — ♃ — *Habitat in Carolina, Virginia, ad lacum superiorem et Huronum.*

2530. **Coreopsis auriculata** Linn. Spec. 1281. Schkuhr Handb. t. 260. DC. Prodr. V. 571. — ♃ — *Habitat in montibus Virginiae et Carolinae.*

2531. **Coreopsis diversifolia** Hooker Bot. Mag. t. 3474. DC. Prodr. V, 571. non Jacq. *Calliopsis Drummondi* Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 315. — ♃ — *Habitat in Carolina meridionali et Texas.*

2532. **Coreopsis verticillata** Willd. Spec. III. 2251. Schkuhr Handb. t. 260. β. Bot. Mag. t. 156. — ♃ — *Habitat in montibus celsioribus Americae borealis.*

2530. Actinomeris Nutt.

2533. **Actinomeris alternifolia** DC. Prodr. V. 575. *Actinomeris squarrosa* Nutt. Gen. Bor. Amer. II. 131. *Coreopsis alternifolia* Linn Spec. 1283. Jacq. Hort. Vindob. t. 110. — ♃ — *Habitat in Virginia, Carolina, Georgia et Arkansas.*

2534. **Actinomeris oppositifolia** Fresenius Index Sem. Hort. Frankof. 1836. DC. Prodr. VII. 290. — ♃ — *Habitat in pratis udis ditionis Illinois Americae borealis.*

2537. Tithonia Desf.

2535. **Tithonia excelsa** DC Prodr. V. 585. *Helianthus giganteus* Cavanill. Ic. III. 10. t. 219. non Linn. *Helianthus excelsus* Willd. Spec. III. 2243. *Helianthus trinervis* Hort. Madrit. et Monsp. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2538. Helianthus Linn.

* **Annui.**

2536. **Helianthus annuus** Linn. Spec. 1276. DC. Prodr. V. 585. — ☉ — *Habitat in Peruvia et Mexico.*

β. *Indicus. Helianthus indicus* Linn. Mant. 117.

γ. *Albus.*

2537. **Helianthus ovatus** Lehmann Index Sem. Hort. Hamb. 1828. p. 16. Linnaea 1830. p. 376. DC. Prodr. V. 586. — ☉ — *Habitat in Mexico.*

2538. **Helianthus lenticularis** Douglas Bot.

Reg. t. 1265. DC. Prodr. V. 586. — ☉ — *Habitat in America boreali-occidentali et in provincia Arkansas.*

** Perennes, disco atropurpureo.

2539. **Helianthus atrorubens** Linn. Spec. 1279. Ker Bot. Reg. t. 508. DC. Prodr. V. 586. *Helianthus missuricus* Sprengel Pugill. 21. *Helianthus diffusus* Sims Bot. Mag. t. 2020. — ♃ — *Habitat in glareosis et siccis Americae borealis, a Pensylvania ad Carolinam.*

*** Perennes, disco luteo.

2540. **Helianthus doronicoides** Lam. Dict. II. 84. DC. Prodr. V. 587. *Helianthus pubescens* Vahl Symb. II. 92. Hooker Bot. Mag. t. 2778. non Willd. *Helianthus mollis* Willdenow Spec. III. 2240. non Lam. *Helianthus Hookeri* Don in Loudon Hort. brit. 358. — ♃ — *Habitat in siccis fertilibus Americae borealis, a Pensylvania ad Carolinam.*

2541. **Helianthus divaricatus** Linn. Spec. 1279. DC. Prodr. V. 587. — ♃ — *Habitat in America boreali a Canada ad Carolinam.*

2542. **Helianthus decapetalus** Linn. Spec. 1277. DC. Prodr. V. 588. — ♃ — *Habitat in siccis lapidosis sylvaticis Americae borealis, a Canada ad Virginiam.*

β *Frondosus.*

2543. **Helianthus giganteus** Linn. Spec. 1278. DC. Prodr. V. 589. non Cav. *Helianthus virgatus* Lam. Dict. III. 85. *Helianthus altissimus* Jacq. Hort. Vindob. II. t. 162. non Linn. — ♃ — *Habitat in America boreali, a Canada ad Carolinam.*

2544. **Helianthus altissimus** Linn. Spec. 1278. DC. Prodr. V. 590. non Jacq. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

2541. **Bidens** Linn.

a. Platycarpaea DC.

2545. **Bidens tripartita** Linn. Spec. 1165.

E. B. t. 1113. DC. Prodr. V. 594. —⊙— *Habitat in fossis et inundatis Europae totius, Caucasi et Sibiriae.*

2546. **Bidens frondosa** Linn. Spec. 1166. DC. Prodr. V. 594. —⊙— *Habitat in humidis Americae borealis, a Canada ad Pensylvaniam et Carolinam.*

2547. **Bidens cernua** Willd. Spec. III. 1716. DC. Prodr. V. 594. —⊙— *Habitat in fossis et inundatis Europae totius, in Americam borealem transfuga.*

α. Discoidea. Bidens cernua Linn. Spec. 1155. E. B. t. 1114.

β. Radiata. Coreopsis Bidens Linn. Spec. 1281.

β. Psilocarpaea DC.

2548. **Bidens pilosa** Linn. Spec. 1166. DC. Prodr. V. 597. *Kerneria tetragona* Mönch Meth. 595. *Ceratocephalus pilosus* Richard Cat. Hort. Medic. 91. —⊙— *Habitat in agris Americae borealis.*

2549. **Bidens chinensis** Willd. Spec. III. 1719. —⊙— *Habitat inter tropicos totius orbis.*

2550. **Bidens parviflora** Willd. Enum. 840. DC. Prodr. V. 602. *Bidens macrosperma* Fischer Catalog. Hort. Gorenk. *Bidens multifida* Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 3. p. 186. *Bidens pauciflora* Poiret Suppl. 1. 630. —⊙— *Habitat in Asia media orientali.*

2551. **Bidens grandiflora** Desfont. Catalog. Hort. Taur. 1812. p. 19. DC. Prodr. V. 602. *Bidens serrulata* Desfont. Catalog. Hort. Paris. 1829. p. 186. *Kerneria serrulata* Cassini Dict. sc. nat. LI. 474. *Coreopsis diversifolia* Jacq. f. Eclog. I. 80. t. 54. *Bidens diversifolia* Hort. *Cosmea lutea* Sims Bot. Mag. t. 1689. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2552. **Bidens bipinnata** Linn. Spec. 1166. DC. Prodr. V. 603. —⊙— *Habitat in agris siccis Americae borealis.*

2542. Cosmos Cav.

2553. **Cosmos bipinnatus** Cavanill. Ic. I. 9. t. 14. DC. Prodr. V. 606. *Georgia bipinnata* Sprengel

Syst. III. 611. *Coreopsis formosa* Bonato in Dissert. Pisaur. 21. t. 2. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2550. **Verbesina** Less. DC.

a. **Verbesinaria** DC.

* **Caule aptero.**

2554. **Verbesina serrata** Cavanill. Ic. III. 7. t. 214. DC. Prodr. V. 613. —♃— *Habitat in Mexico et in insula Cuba.*

** **Caule alato.**

2555. **Verbesina gigantea** Jacq. Collect. I. 53. Ic. rar. I. t. 175. DC. Prodr. V. 615. —♄— *Habitat in insulis Caribaeis.*

2556. **Verbesina Phaetusa** Cassini in Dict. sc. nat. LI. 476. LIX. 149. DC. Prodr. V. 615. *Phaetusa americana* Gärtner Carp. II. 465. t. 169. *Phaetusa borealis* Sprengel Syst. III. 591. *Sieyesbeckia occidentalis* Linn. Spec. 1269. —♃— *Habitat in America boreali.*

b. **Hamulium** Cass.

2557. **Verbesina alata** Linn. Spec. 1270. Swartz Observ. 313. Sims Bot. Mag. t. 1716. *Hamulium alatum* Cassini in Dict. sc. nat. XX. 261. —♃— *Habitat in insulis Antillanis et in Mexico.*

2553. **Spilanthes** Jacq.

2558. **Spilanthes oleracea** Jacq. Hort. Vindob. II. t. 135. DC. Prodr. V. 624. *Bidens fervida* Lam. Dict. I. 415. Vulgo *Cresson de Para* Hortul. —⊙— *Habitat in America meridionali.*

β. *Fusca* DC. l. c. *Spilanthes fusca* Hort. Paris. *Bidens fusca* Lam. Dict. I. 416.

2555. **Ximenesia** Cav.

2559. **Ximenesia encoelioides** Cav. Ic. II. 60. t. 178. DC. Prodr. V. 627. *Pallasia serratifolia*

Smith in Rees Cyclop. XXVI. n. 3. —⊙— *Habitat inter tropicos totius orbis.*

2558. **Harpephora** Endl.

2560. **Harpephora Schottii** Endl. —⊙— *Habitat in Africa tropica orientali, e seminibus a Theodoro Kotschy missis in horto Schönbrunensi nata.*

2559. **Synedrella** Gärtn.

2561. **Synedrella nodiflora** Gärtner Carp. II. 456. t. 171. DC. Prodr. V. 629. *Verbesina nodiflora* Linn. Amoen. academ. IV. 290. —⊙— *Habitat in Americae tropicae littore atlantico, in Africam transfuga.*

Subtribus III. Flaverieae.

2571. **Flaveria** Juss.

2562. **Flaveria angustifolia** Persoon Encheir. II. 489. DC. Prodr. V. 635. *Milleria angustifolia* Cavanill. Ic. III. 12. t. 223. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2572. **Broteroa** Spreng. DC.

2563. **Broteroa trinervata** PersoonEncheir. II. 498. DC. Prodr. V. 636. *Brotera Contrayerva* Sprengel in Schrader Journ. 1800. II. 186. t. 5. excl. synon. *Nauemburgia trinervata* Willd. Spec. II. 2393. — ♃ — *Habitat in Mexico, ubi vulgo »Azumiatas« dicitur.*

2575. **Adenophyllum** Pers.

2564. **Adenophyllum coccineum** Persoon Encheir. II. 458. DC. Prodr. V. 638. *Willdenowa glandulosa* Cavanill. Ic. 1. 61. t. 89. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2577. **Dysodia** DC.

2565. **Dysodia pubescens** Lagasca Elench. Hort. Madrit. 29. DC. Prodr. V. 640. *Aster pinnatus*

Cav. Ic. t. 212. *Boebera pubescens* Spreng. Syst. III. 544. —⊙— *Habitat in Mexico.*

Subtribus IV. Tagetineae.

2580. **Tagetes** Tourn.

a. **Pectidiformes.**

2566. **Tagetes lucida** Cavanill. Ic. III. 33. t. 264. Willd. Spec. III. 2126. DC. Prodr. V. 643. —⊙— *Herba annua, in montanis Mexici indigena.*

b. **Macrocephalae.**

2567. **Tagetes patula** Linn. Spec. 1249. Sims Bot. Mag. t. 150. DC. Prodr. V. 643. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2568. **Tagetes erecta** Linn. Spec. 1249. Lam. t. 684. DC. Prodr. V. 643. *Cempoaxochitl* Hernand. Mex. 154. —⊙— *Habitat in Mexico.*

c. **Leptocephalae.**

2569. **Tagetes glandulifera** Schrank Hort. Monac. II. t. 54. DC. Prodr. VII. 644. *Tagetes minuta* Linn. Spec. 1250. *Tagetes bonariensis* Persoon Encheir. II. 459. *Tagetes glandulosa* Link Enum. II. 339. *Tagetes montana* Hort. Lugd. 1821. —⊙— *Habitat in America australi extratropica.*

2580. **Syncephalantha** Bartl.

2570. **Syncephalantha decipiens** Bartling Ind. Sem. Hort. Götting. 1836. p. 6. DC. Prodr. VII. 262. —⊙— *Habitat in Mexico.*

2582. **Porophyllum** Vaill.

2571. **Porophyllum ellipticum** Cassini in Dict. sc. nat. XLIII. 46. DC. Prodr. V. 648. *Cacalia Porophyllum* Linn. Spec. 1169. Cavanill. Ic. t. 222. *Kleinia Porophyllum* Willdenow Spec. III. 1738. —⊙— *Habitat in Peruvia et Brasilia.*

2572. **Porophyllum decumbens** DC. Prodr. V. 650. *Kleinia suffruticosa* Loddig. Bot. Cab. t. 1561. non Willd. *Kleinia linearis* Hort. Paris. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

2573. **Porophyllum coloratum** DC. Prodr. V. 650. *Kleinia colorata* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. IV. 158. Mart. Amoen. Monac. t. 15. —⊙— *Habitat in Mexico.*

Subtribus V. Helenieae.

2583. Gaillardia Foug.

2574. **Gaillardia lanceolata** Michaux Flor. Bor. Amer. II. 142. DC. Prodr. V. 652. *Gaillardia bicolor* Elliott Carol. II. 449. Sims Bot. Mag. t. 1602. — ♃ — *Habitat in aridis Americae borealis.*

2575. **Gaillardia aristata** Pursh Flor. Bor. Amer. II. 573. Lindley in Bot. Reg. t. 1186. Hooker in Bot. Mag. t. 2940. DC. Prodr. V. 652. — ♃ — *Habitat in Americae borealis montibus scopulosis.*

2589. Florestina Cass.

2576. **Florestina pedata** Cassini Opusc. 1. 197. t. 8. DC. Prodr. V. 655. *Stevia pedata* Cavanill. Ic. IV. 33. *Ageratum pedatum* Ortega Decad. 38. *Hymenopappus pedatus* Lagasca Nov. Gen. 28. *Achyropappus pedatus* Lessing Synops. 239. —⊙— *Habitat in Mexico, in montanis circa urbem.*

2599. Cephalophora Cav.

2577. **Cephalophora aromatica** Schrader Index Sem. Hort. Götting. 1830. Lessing Synops. 240. DC. Prodr. V. 662. *Graemia aromatica* Hooker Exot. Bot. t. 189. —⊙— *Habitat in pascuis collium prope Valparaiso.*

Herba Chamomillam redolens, Chilenis vulgo »Mançanilla del Campo« dicta.

2603. **Helenium** Linn.

a. **Helenia.**

2578. **Helenium autumnale** Linn. Spec. 1120. Schkuhr Handb. t. 250. Hook. Bot. Mag. t. 2994. — ♃ — *Habitat in America boreali secus rivulos, a Canada ad Carolinam frequens.*

b. **Tetrodus** Cass.

2579. **Helenium quadridentatum** Labillard. in Act. Soc. h. n. Paris. 1. 22. t. 4. Bot. Reg. t. 598. DC. Prodr. V. 666. *Rudbeckia alata* Jacq. Ic. rar. t. 593. — ⊙ — *Habitat in Carolina, Louisiana et Mexico.*

2580. **Helenium quadripartitum** Link Enum. II. 338. DC. Prodr. V. 667. — ⊙ — *Patria ignota.*

2581. **Helenium pumilum** Willdenow Enum. Suppl. 60. DC. Prodr. V. 667. — ♃ — *Patria ignota.*

2607. **Baeria** Fisch. et C. A. Mey.

2582. **Baeria chrysostoma** Fisch. et C. A. Meyer Index secund. Sem. Hort. Petrop. 1835. p. 29. DC. Prodr. VII. 254. — ⊙ — *Habitat in sinu Bodega Novae Californiae.*

2591. **Bahia** Lag.

2583. **Bahia lanata** DC. Prodr. V. 657. *Trichophyllum lanatum* Nuttall Gen. bor. Am. II. 168. *Actinella lanata* Pursh Flor. Am. bor. II. 560. *Eriophyllum caespitosum* Douglas in Lindley Bot. Reg. t. 1167. *Helenium lanatum* Sprengel Syst. III. 574. — ♃ — *Habitat in America boreali-occidentali.*

2608. **Callichroa** Fisch. et C. A. Mey.

2584. **Callichroa platyglossa** Fischer et C. A. Meyer Index Sem. Hort. Petrop. 1837. III. 31. Sweet Fl. Gard. II. t. 373. DC. Prodr. VII. 294. — ⊙ — *Habitat in California.*

2609. **Lasthenia** Linn.

2585. **Lasthenia glabrata** Lindley Bot. Reg. t. 1780. DC. Prodr. V. 665. —⊙— *Habitat in California.*

2610. **Rancagua** Pöpp. et Endl.

2586. **Rancagua Fevillei** Pöppig et Endl. Nov. gen. et sp. I. 15. t. 24. *Lasthenia obtusifolia* Cassini Opusc. III. 89. DC. Prodr. V. 664. *Tagetes Fevillei* Bertero ex Colla Mem. Academ. Turin. XXXVIII. 34. t. 30. —⊙— *Habitat in Chili.*

2619. **Galinsoga** Ruiz et Pav.

2587. **Galinsoga parviflora** Cavanill. Ic. III. 41. t. 281. DC. Prodr. V. 677. —⊙— *Habitat in ruderatis et uliginosis Chili, Peruviae et Mexici.*

Herba vulneraria et antiscorbutica, Peruanis vulgo Paica-Jullo et Pacoyu-yufino dicta.

2622. **Tridax** Linn.

2588. **Tridax procumbens** Linn. Spec. ed. 1. p. 900. DC. Prodr. V. 679. *Balbisia elongata* Willdenow Spec. III. 2214. —⊙— *Habitat in America tropica.*

2626. **Sphenogyne** R. Br.

2589. **Sphenogyne microcephala** DC. Prodr. V. 682. —⊙— *Habitat in Capite bonae spei.*

2628. **Madia** Molin.

2590. **Madia sativa** Dlol. Chili 113. DC. Mem. soc. phys. Genev. VII. 277. Prodr. V. 691. *Madia viscosa* Cavanill. Ic. III. 50. t. 298. *Madia mellosa* Jacq. Hort. Schönbr. III. 29. t. 302. —⊙— *Habitat in Chili spontanea, et passim ob semina oleosa sub nominibus »Madi« et »Melosa« culta.*

2629. Madaria DC.

2591. **Madaria elegans** DC. Prodr. VII. 692. *Madia elegans* Don ex Lindley in Bot. Reg. t. 1458. —⊙— *Habitat in California.*

2631. Tollatia Endl.

2592. **Tollatia chrysanthemoides** Endl. msc. *Oxyura chrysanthemoides* DC. Prodr. V. 693. Lindley Bot. Reg. t. 1850. —⊙— *Habitat in Nova California.*

Subtribus VI. Anthemideae.

2639. Anthemis DC.

α. Chamaemelum Cass.

2593. **Anthemis arvensis** Linn. Spec. 1261. E. B. t. 602. Flor. dan. t. 1179. Hayne Arzneigew. I. t. 5. DC. Prodr. VI. 6. *Chamaemelum arvense* Allioni Flor. pedem. n. 674. —⊙— *Habitat in agris et arvis Europae et Orientis.*

2594. **Anthemis nobilis** Linn. Spec. 1260. E. B. t. 980. Nees jun. Plant. offic. 10. t. 7. DC. Prodr. VI. 6. —♃— *Habitat in agris et pascuis siccis Europae, imprimis australioris.*

β. *Flore pleno.*

β. Euanthemis DC.

2595. **Anthemis secundiramea** Bivona Cent. II. 10. t. 2. DC. Prodr. VI. 10. —⊙— *Habitat in maritimis Siciliae prope Cataniam.*

2596. **Anthemis rigescens** Willdenow Hort. berol. I. t. 62. DC. Prodr. VI. 11. —♃— *Habitat in subalpinis Caucasi et in Persia boreali.*

2597. **Anthemis tinctoria** Linn. Spec. 1263. Flor. dan t. 1472. E. B. t. 741. DC. Prodr. VI. 11. —⊙— *Habitat in agris et arvis Europae et Orientis.*

2598. **Anthemis austriaca** Jacq. Flor. austr. t. 444. DC. Prodr. VI. 11. —⊙— *Habitat in arvis et agris Austriae et Styriae.*

2640. Maruta Cass.

2599. **Maruta Cotula** DC. Prodr. VI. 13. *Anthemis Cotula* Linn. Spec. 1261. Flor. dan. t. 1179. Schkuhr Handb. t. 254. Hayne Arzneigew. I. 6. —⊙— *Habitat in arvis et ruderatis hemisphaerae borealis passim.*

β. *Lithuanica* DC. l. c. *Anthemis lithuanica* Besser msc.

2643. Anacyclus Pers.

α. **Pyrethraria** DC.

2600. **Anacyclus Pyrethrum** DC. Fl. fr. Suppl. 480. in not. Prodr. VI. 15. *Anthemis Pyrethrum* Linn. Spec. 1262. Desfont. Flor. atlant. II. 287. Lam. Illustr. t. 683. f. 4. —♃— *Habitat in montibus Barbariae, Arabia, Syria.*

Radix Pyrethri s. Radix Salivariae officinarum, fusiformis, carnosa, gustu fervens, recens manibus tractata frigoris acutissimi, deinde caloris sensationem excitat.

β. **Diorthodon** DC.

2601. **Anacyclus clavatus** Persoon Encheir. II. 465. DC. Prodr. VI. 16. *Anacyclus divaricatus* Balbis msc. *Anthemis clavata* Desfont. Flor. atlant. II. 287. *Anthemis incrassata* Link Enum. II. 345. —⊙— *Habitat in arvis Barbariae et Siciliae.*

2602. **Anacyclus valentinus** Linn. Spec. 1258. DC. Prodr. VI. 16. —⊙— *Habitat in agris et arvis Hispaniae et Galliae australis.*

2646. Cladanthus Cass.

2603. **Cladanthus proliferus** DC. Prodr. VI. 18. *Cladanthus arabicus* Cassini in Dict. sc. nat. IX. 342. c. ic. *Anthemis arabica* Linn. Spec. 1263. Smith Spicileg. 9. t. 16. *Anthemis prolifera* Persoon Encheir.

II. 467. *Buphthalmum* Linn. Hort. Cliffort. 413. t. 24. *Asteriscus* Shaw Spec. n. 58. t. 36. f. 58. —☉— *Habitat in arvis et cultis Mauritaniae, ubi » Craffas « dicitur, floribus in solo natali odoratissimis, in speciminibus cultis fere inodoris.*

2648. **Ptarmica** Tournef.

a. **Anthemoideae.**

2604. **Ptarmica Thomasiana** DC. Prodr. VI. 21. *Achillea Thomasiana* Haller f. in DC. Catalog. Hort. Monsp. 75. —♃— *Crescit in Helvetiae valle Rhodanica, in monte Bovonnaz.*

2605. **Ptarmica Clavennae** DC. Prodr. VI. 21. *Achillea Clavennae* Linn. Spec. 1266. Jacq. Flor. austr. t. 76. —♃— *Habitat in pascuis alpinis Austriae, Carinthiae, in Italiae superioris monte generoso et prope Clavennam (Chiavenna).*

b. **Pectinatae.**

2606. **Ptarmica alpina** DC. Prodr. VI. 22. *Achillea alpina* Linn. Spec. 1266. —♃— *Habitat in alpibus Helvetiae et in Sibiria.*

2607. **Ptarmica impatiens** DC. Prodr. VI. 22. *Achillea impatiens* Linn. Spec. 1266. —♃— *Habitat in Sibiria.*

c. **Euptarmica.**

2608. **Ptarmica mongolica** DC. Prodr. VI. 22. *Achillea mongolica* Fischer msc. Sprengel Nov. Prov. 1818. p. 1. —♃— *Habitat in lapidosis subalpinis Dahuriae.*

2609. **Ptarmica vulgaris** Blackwell Herb. t. 256. DC. Prodr. VI. 23. *Achillea Ptarmica* Linn. Spec. 1266. Flor. dan. t. 643. E. B. t. 757. —♃— *Habitat in pratis et pascuis Europae et Sibiriae.*

β. *Multiplex* DC. l. c. *Achillea multiplex* Ren. Fl. orn. 78. — *In hortis vulgo Bouton d'argent.*

γ. *Cartilaginea* DC. l. c. *Achillea cartilaginea* Ledebour msc. — *Habitat in Lithuania.*

2610. **Ptarmica grandiflora** DC. Prodr. VI. 23. *Achillea grandiflora* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 333. — ♃ — *Habitat in alpibus Caucasicis.*

2611. **Ptarmica biserrata** DC. Prodr. VI. 23. *Achillea biserrata* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 334. — ♃ — *Habitat in Iberia.*

2612. **Ptarmica speciosa** DC. Prodr. VI. 23. *Achillea speciosa* Henkel Adumbr. 1. — ♃ — *Habitat in humidiusculis Sibiriae altaicae.*

2613. **Ptarmica lingulata** DC. Prodr. VI. 24. *Achillea lingulata* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 2. t. 2. — ♃ — *Habitat in montibus Hungariae orientalis et Transylvaniae.*

2649. Achillea.

* **Millefoliatae.**

2614. **Achillea Millefolium** Linn. Spec. 1267. E. B. t. 758. Flor. dan. t. 737. DC. Prodr. VI. 24. — ♃ — *In pratis et pascuis Europae totius et Asiae borealis frequens.*

β. *Roseum.* — γ. *Scabrum.* *A. scabra* Host Flor. austr. II. 512.

2615. **Achillea lanata** Spreng. ex Willd. Enum. 915. DC. Prodr. VI. 24. — ♃ — *Habitat in Podolia et Caucaso.*

2616. **Achillea setacea** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 82. t. 80. DC. Prodr. VI. 25. — ♃ — *Habitat in collibus Europae mediae et australis.*

2617. **Achillea crithmifolia** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 68. t. 66. DC. Prodr. VI. 25. — ♃ — *Habitat in arenosis et montosis Hungariae.*

2618. **Achillea magna** Linn. Spec. 1267. DC. Prodr. VI. 25. *Achillea compacta* Lam. Dict. I. 27. non Willd. — ♃ — *Habitat in glareosis Europae mediae et australis.*

2619. **Achillea dentifera** DC. Fl. fr. Suppl. 485. Prodr. VI. 25. *Achillea distans* Waldst. et Kitaibel ex Willd. Sp. III. 2207. Pollini Flor. Veron. II.

713. — ♃ — *Habitat in herbidis montanis Europae australioris.*

β. *Ambigua* Pollin l. c. *A. ambigua* Pollini Viagg. 117. — γ. *Haenkeana. A. Haenkeana* Tausch in Flora 1821. p. 667.

2620. **Achillea tanacetifolia** Allion. Flor. Pedemont. n. 666. DC. Prodr. VI. 25. — ♃ — *Habitat in sylvis et pratis Europae australioris.*

β. *Cristata. Artemisia cristata* Hort. Taurin.

2621. **Achillea asplenifolia** Vent. Hort. Cels. t. 95. DC. Prodr. VI. 26. — ♃ — *Patria ignota.*

2622. **Achillea sylvatica** Tenore Syllog. 442. DC. Prodr. VI. 26. — ♃ — *Habitat in nemoribus montanis Calabriae.*

2623. **Achillea nobilis** Linn. Spec. 1268. Schkuhr t. 255. DC. Prodr. VI. 26. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Europae australioris.*

2624. **Achillea microphylla** Willd. Spec. III. 2210. DC. Prodr. VI. 26. *Achillea pectinata* Lam. Dict. I. 28. non Willd. — ♃ — *Habitat in collibus Hispaniae.*

** **Filipendulinae.**

2625. **Achillea Ageratum** Linn. Spec. 1264. DC. Prodr. VI. 27. — ♃ — *Habitat in apricis humidiusculis Galliae australis et Italiae.*

Herba vulneraria, vulgo Gallis » Herbe au charpentier. «

2626. **Achillea decolorans** Schrader ex Willd. Enum. DC. Prodr. VI. 27. *Achillea serrata* Sowerb. E. B. t. 2531. non Retz. — ♃ — *Habitat in Angliae comitatu Derbiensi.*

2627. **Achillea pectinata** Willd. Spec. III. 2197. DC. Prodr. VI. 28. *Achillea ochroleuca* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 34. non Ehrh. *Achillea flore ochroleuco* Winterl Index Hort. Pesth. t. 19. — ♃ — *Habitat in Hungaria, in Tauria et Caucaso.*

2628. **Achillea filipendulina** Lam. Dict. I. 27. DC. Prodr. VI. 28. — ♃ — *Habitat in Oriente.*

β. *Eupatoria. Achillea Eupatorium* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 337. — *Habitat in Caucaso.*

γ. *Filicifolia.* *Achillea filicifolia* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 338. *Tanacetum angulatum* Willd. Achill. t. 2. f. 3. — *Habitat in Iberia.*

2629. **Achillea compacta** Willd. Spec. III. 2206. Jacq. f. Eclog. I. 131. t. 88. Rochel Banat. t. 32. f. 67. DC. Prodr. VI. 28. non Lam. *Achillea glomerata* Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 585. *A. coarctata* Poiret Suppl. I. 94. *A. velutina* Desfont. Cat. Hort. Paris. ed. 3. p. 180. — ♃ — *Habitat in Banatu et Bessarabia.*

2630. **Achillea leptophylla** Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 335. DC. Prodr. VI. 29. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

2631. **Achillea ochroleuca** Ehrh. Beitr. VII. 166. DC. Prodr. VI. 30. *Achillea punctata* Tenore Flor. neap. II. 253. t. 83. — ♃ — *Habitat in pascuis montanis Italiae.*

2632. **Achillea tomentosa** Linn. Spec. 1264. DC. Prodr. VI. 30. — ♃ — *Habitat in siccis sterilibus Europae australis.*

2633. **Achillea anthemoides** Willdenow Spec. III. 2200. DC. Prodr. VI. 30. — ♃ — *Patria ignota.*

*** **Santolinoideae.**

2634. **Achillea albicaulis** C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. n. 631. DC. Prodr. VI. 31. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

2635. **Achillea tenuifolia** Lam. Dict. I. 26. Jacq. f. Eclog. I. 11. t. 4. DC. Prodr. VI. 31. *Achillea albida* Willd. Enum. Suppl. 61. Link Hort. berol. II. 347. non Willd. *Achillea virgata* Hort. — ♃ — *Habitat in Oriente.*

2636. **Achillea santolinoides** Lagasca Nov. gen. et sp. 30. DC. Prodr. VI. 31. — ♃ — *Habitat in ruderalis Hispaniae.*

2637. **Achillea teretifolia** Willdenow Spec. III. 2198. DC. Prodr. VI. 31. *Achillea santolina* C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. p. 76. non Linn. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Persia.*

2638. **Achillea vermiculata** Trinius in Sprengel N. E. I. 199. DC. Prodr. VI. 32. *Achillea amoena* C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. n. 629. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Persia.*

2651. **Santolina** Tournef.

α. **Chamaecyparissus** DC.

2639. **Santolina Chamaecyparissus** Linn. Spec. 1179. DC. Prodr. VI. 35. — ♄ — *Habitat in apricis Europae australis.*

β. *Squarrosa. Santolina squarrosa* Willdenow Spec. III. 1798.

2640. **Santolina viridis** Willdenow Spec. III. 1798. DC. Prodr. VI. 35. — ♄ — *Habitat in Europa austro-occidentali.*

2641. **Santolina pinnata** Viviani Fragm. Flor. ital. I. 1. t. 1. DC. Prodr. VI. 36. *Santolina leucantha* Bertoloni Amoen. ital. 43. — ♄ — *Habitat in rupibus montium Apuanorum, imprimis circa Cararam.*

δ. **Babounya** DC.

2642. **Santolina fragrantissima** Forskael Descript. 147. Delile Flor. Aegypt. 119. t. 42. f. 3. DC. Prodr. VI. 36. — ♄ — *Habitat in Aegypti deserto Soneys, in Sinni, et inter Bagdad et Aleppum.*

Flores sicci odoratissimi, apud pharmacopolas kahirenses loco Anthemidis nobilis, nomine »Bobouny« s. »Zeysoun« venales prostant. Sinai montis accolis plantam »Gasoum« dici, cl. Bové auctor est.

2653. **Lasiospermum** Lagasc.

α. **Eulasiospermum** DC.

2643. **Lasiospermum pedunculare** Lagasca Nov. gen. et sp. 31. DC. Prodr. VI. 38. *Santolina erecta* Lam. Ill. t. 671. f. 4. *Santolina eriosperma* Persoon Encheir. II. 407. Schrank Hort. Monac. t. 67. *Santolina alpina* Bertoloni Amoen. 43. non Linn. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Lanipila** Burch.

2644. **Lasiospermum radiatum** Treviranus in N. A. N. C. XIII. 205. DC. Prodr. VI. 38. *Lidbeckia bipinnata* Thunberg Flor. Cap. 694. *Lancisia bipinnata* Persoon Encheir. II. 465. *Matricaria bipinnata* Sprengel Syst. III. 582. — ⊙ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2655. **Lidbeckia** Berg.

2645. **Lidbeckia pectinata** Bergius Flor. Cap. 307. t. 5. f. 9. DC. Prodr. VI. 39. *Lancisia* Lam. Illustr. t. 701. f. 2. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2656. **Gamolepis** Less.

2646. **Gamolepis annua** Lessing Synops. 251. *Gamolepis Tageles* DC. Prodr. VI. 40. *Psilothonna Tagetes* E. Meyer msc. *Othonna Tagetes* Linn. Spec. 1309. — ⊙ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2661. **Leucopsidium** DC.

2647. **Leucopsidium arkansanum** DC. Prodr. VI. 43. — ♃ — *Habitat in Americae borealis ditione Arkansas.*

2667. **Leucanthemum** Tournef.

a. **Phalacroglossum** DC.

2648. **Leucanthemum sibiricum** DC. Prodr. VI. 46. *Chrysanthemum arcticum* Ledebour Flor. alt. IV. 115. non Linn. *Chrysanthemum sibiricum* Turczanin. msc. — ♃ — *Habitat in arenosis lapidosis Sibiriae dahuricae.*

2649. **Leucanthemum sinuatum** DC. Prodr. VI. 46. *Chrysanthemum sinuatum* Ledebour Flor. alt. IV. 116. Ic. t. 494. *Chrysanthemum absinthifolium* Fischer msc. — ♄ — *Habitat in rupestribus Sibiriae altaicae.*

2650. **Leucanthemum vulgare** Lam. Flor. fr. II. 137. DC. Prodr. VI. 46. *Chrysanthemum Leucanthemum* Linn. Spec. 1251. Flor. dan. t. 994. —♃— *Habitat in pratis et pascuis Europae totius.*

β. *Sylvestre. Chrysanthemum sylvestre* Willdenow Enum. Suppl. 60.

b. **Phalacrodiscus** Less.

2651. **Leucanthemum heterophyllum** DC. Prodr. VI. 47. *Chrysanthemum heterophyllum* Willdenow Spec. III. 2142. —♃— *Habitat in montanis umbrosis Pedemontii et Helvetiae.*

2652. **Leucanthemum atratum** DC. Prodr. VI. 48. *Chrysanthemum atratum* Linn. Spec. 1252. Jacq. Fragm. t. 44. f. 8. —♃— *Habitat in pascuis alpinis Austriae et Helvetiae.*

2653. **Leucanthemum montanum** DC. Prodr. VI. 48. *Chrysanthemum montanum* Linn. Spec. 1252. Jacq. Obs. IV. t. 91. *Phalacrodiscus montanus* Lessing Synops. 254. —♃— *Habitat in saxosis apricis Europae australioris.*

2654. **Leucanthemum graminifolium** Lam. Fl. fr. II. 137. DC. Prodr. VI. 48. *Chrysanthemum graminifolium* Linn. Spec. 1252. Jacq. Observ. t. 92. *Phalacrodiscus graminifolius* Lessing Synops. 254. —♃— *Habitat in apricis montanis Europae australioris.*

2655. **Leucanthemum cebennense** DC. Prodr. VI. 48. *Chrysanthemum monspeliense* Linn. Spec. 1252. Jacq. Observ. IV. 10. t. 93. non Schkuhr. *Phalacrodiscus ceratophylloides* Lessing Synops. 254. —♃— *Habitat in umbrosis montium Cebennorum.*

2669. Matricaria DC.

a. **Sphaeroclinium** DC.

2656. **Matricaria nigellaefolia** DC. Prodr. VI. 50. —⨀— *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Chamomilla** DC.

2657. **Matricaria Chamomilla** Linn. Spec. 1256. Schkuhr Handb. t. 253. β. Nees jun. Plant.

offic. 10. t. 4. DC. Prodr. VI. 51. —⊙— *Habitat in arvis et ruderatis Europae totius.*

2658. **Matricaria inodora** Linn. Flor. suec. II. 765. DC. Prodr. VI. 52. *Chrysanthemum inodorum* Linn. Spec. 1253. Flor. dan. t. 696. Schkuhr Handb. t. 253. Hayne Arzneigew. I. t. 4. *Pyrethrum inodorum* Smith E. B. t. 676. —⊙— *Habitat in arvis et ruderatis Europae et Orientis.*

2659. **Matricaria pusilla** Willdenow Enum. 907. DC. Prodr. VI. 52. —⊙— *Patria ignota.*

2670. Pyrethrum Gärtn.

1. Leucoglossa DC.

2660. **Pyrethrum alpinum** Willd. Spec. III. 2153. Sturm Deutsch. Fl. f. 19. t. 14. DC. Prodr. VI. 54. *Chrysanthemum alpinum* Linn. Spec. 1253. —♃— *Habitat in rupestribus alpium Europae passim.*

2661. **Pyrethrum carneum** Bieberst. Suppl. n. 1762. DC. Prodr. VI. 55. *Pyrethrum roseum* Lindley in Bot. Reg. t. 1084. non Bieb. *Chrysanthemum coccineum* Sims in Bot. Mag. t. 1080. non Willd. —♃— *Habitat in alpestribus Caucasi iberici.*

2662. **Pyrethrum cinerariaefolium** Treviranus Index Sem. Hort. Vratisl. 1820. N. A. N. C. XIII. 204. DC. Prodr. VI. 55. *Chrysanthemum rigidum* Visiani Delect. Sem. Hort. Patav. 1825. *Chrysanthemum Turreanum* Visiani Specim. Plant. Dalmat. p. 19. t. 8. —♃— *Habitat in Dalmatia.*

2663. **Pyrethrum roseum** Bieberst. Suppl. 1761. DC. Prodr. VI. 56. *Chrysanthemum roseum* Adam in Web. et Mohr Beitr. 1. 70. *Chrysanthemum coccineum* Willd. Spec. III. 2144. non Sims. —♃— *Habitat in pratis montanis Caucasi et Persiae.*

2664. **Pyrethrum uliginosum** Waldst. et Kitaibel in Willd. III. 2152. Hooker Bot. Mag. t. 2706. DC. Prodr. VI. 57. *Chrysanthemum uliginosum* Persoon Encheir. II. 460. —♃— *Habitat in uligino-*

sis comitatus Szaboltsiensis Hungariae, Tibisci inundationibus obnoxiis.

2665. **Pyrethrum corymbosum** Willd. Spec. III. 2155. DC. Prodr. VI. 57. *Chrysanthemum corymbiferum* Linn. Spec. 1251. *Chrysanthemum corymbosum* Jacq. Flor austr. t. 379. — ♃ — *Habitat in montosis sylvaticis Europae totius, Caucasi et Sibiriae.*

2666. **Pyrethrum Achilleae** DC. Prodr. VI. 57. *Chrysanthemum Achilleae* Linn. Syst. 642. Willd. Spec. III. 2145. *Pyrethrum tenuifolium* Tenore Catalog. 1819. p. 68. Flor. Neap. t. 80. non Willd. *Pyrethrum corymbosum* β. Bertoloni Amoen. ital. 193. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Italiae.*

2667. **Pyrethrum parthenifolium** Willd. Spec. III. 2156. DC. Prodr. VI. 58. *Chrysanthemum praealtum* Vent. Jard. Cels. t. 43. — ♃ — *Habitat in sylvis umbrosis Iberiae et Persiae.*

2668. **Pyrethrum Parthenium** Smith Flor. Brit. II. 900. Hayne Arzneigew. VI. t. 20. DC. Prodr. VI. 58. *Matricaria Parthenium* Linn. Spec. 1250. Flor. dan. t. 674. — ♃ — *Habitat in Europae ruderatis, passim cultum.*

β. *Semiplenum.* — γ. *Plenum.*

2. Gymnocline Cass.

2669. **Pyrethrum macrophyllum** Willd. Spec. III. 2154. DC. Prodr. VI. 58. *Achillea macrophylla* Piller et Mitterbach. Iter Posegan. t. 11. non Linn. *Chrysanthemum macrophyllum* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 94. *Achillea sambucifolia* Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 3. p. 120. *Achillea sambucina* Thouin msc *Gymnocline leucocephala* Cassini Dict. sc. nat. XX. 120. *Gymnocline macrophylla* Bluff et Fingerh. Flor. germ. II. 389. — ♃ — *Habitat in montanis sylvaticis Banatus, Slavoniae et Carinthiae.*

2670 **Pyrethrum achilleaefolium** Bieberst. Flor. taur. cauc. II. 327. DC. Prodr. VI. 58. — ♃ — *Habitat in campestribus apricis arenosis Caucasi et in Sibiria altaica.*

2671. **Pyrethrum myriophyllum** C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. 74. DC. Prodr. VI. 59. — ♃ — *Habitat in collibus lapidosis Caucasi.*

2672. **Pyrethrum chiliophyllum** Fischer et C. A. Meyer msc. ex DC. Prodr. VI. 59. — ♃ — *Habitat in campis siccis provinciae Karabagh.*

2673. **Pyrethrum discoideum** Ledebour Flor. alt. IV. 119. Ic. t. 153. DC. Prodr. VI. 59. — ⊙ — *Habitat in apricis siccis deserti Songoro-Kirghisici.*

3. Xanthoglossa DC.

2674. **Pyrethrum millefoliatum** Willd. Spec. III. 2160. DC. Prodr. VI. 60. *Chrysanthemum millefoliatum* Linn. Syst. 643. *Anthemis millefolia* Linn. Spec. 1263. Miller Ic. t. 9. — ♃ — *Habitat in lapidosis calcareis Tauriae et Bessarabiae.*

2675 **Pyrethrum bipinnatum** Willd. Spec. III. 2160. DC. Prodr. VI. 60. *Chrysanthemum bipinnatum* Linn. Spec. 1255. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

4. Dendranthema.

2676. **Pyrethrum indicum** Cassini Dict. XLIV. 149. DC. Prodr. VI 62. *Chrysanthemum indicum* Linn. Spec. 1253. Sabine Horticult. Transact. IV. 326. t. 12. 13. — ♄ — *Habitat in China et India orientali.*

2677. **Pyrethrum sinense** DC. Prodr. VI. 62. *Chrysanthemum sinense* Sabine in Hortic. Transact. IV. 330. t. 14. — ♄ — *Habitat in Japonia.*

Ambae species saepe inter se confusae, cultura capitulis facile plenis, tristissimi coloris lusu variis, a Sinis multa cultura exercentur. Sensus pulchri expertes sunt Adonistae nostri, qui ex tam diti naturae horto herbam adspectu morosam, nec quidem foliorum forma vel habitu, aut alia quacumque qualitate gratam eligunt, et nobis, Sinarum encomiis haud semper persuadendis, obtrudere volunt culturam stirpis, inter colendas ultimae.

5. Balsamita DC.

2678. **Pyrethrum Balsamita** Willdenow Spec. III. 2153. DC. Prodr. VI. 63. *Chrysanthemum*

Balsamita Linn. Spec. 1252. Jacq. Observ. IV. 8. t. 89. — ♃ — *Habitat in Oriente.*

2679. **Pyrethrum Tanacetum** DC. Prodr. VI. 63. *Tanacetum Balsamita* Linn. Spec. 1184. *Balsamita major* Desfont. Act. soc. h. n. Paris. I. 3. *Balsamita vulgaris* Willdenow Spec. III. 1802. *Balsamita suaveolens* Persoon Encheir. II. 408. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

2671. Chrysanthemum DC.

a. **Glebionis** Cass.

2680. **Chrysanthemum segetum** Linn. Spec. 1254. E. B. t. 540. — ⊙ — *Habitat in agris Europae mediae.*

2681. **Chrysanthemum coronarium** Linn. Spec. 1254. Lam. t. 678. f. 6. DC. Prodr. VI. 64. *Matricaria coronaria* Desr. in Lam. Dict. III. 737. — ⊙ — *Habitat in regione mediterranea.*

b. **Centrachaena** Schott.

2682. **Chrysanthemum viscosum** Desfont. Cat. Hort. Paris. 1821. et 1827. DC. Prodr. VI. 64. *Pinardia anisocephala* Cassini in Dict. sc. nat. XLI. 39. *Centrospermum Chrysanthemum* Sprengel Nov. Prov. 9. *Heteranthemis viscoso-hirta* Schott in Isis 1818. p. 821. *Heteranthemis hirta* Hort. Berolin. *Centrachena viscida* Schott msc. — ⊙ — *Habitat in arenosis prope Algesiras, ubi a. 1817. detexit cl. Schott.*

c. **Ismelia** Cass.

2683. **Chrysanthemum carinatum** Schousb. Marocc. 198. t. 6. DC. Prodr. VI 65. *Chrysanthemum tricolor* Andrews Bot. Reposit. t. 109. *Ismelia versicolor* Cassini Dict. sc. nat. XLI. 40. — ⊙ — *Habitat in arenosis Barbariae.*

d. **Magarsa** DC.

2684. **Chrysanthemum foeniculaceum** DC. Prodr. VI. 66. *Pyrethrum foeniculaceum* Choisy in

Buch Canar. Insl. 149. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

β. *Pinnatifidum* DC. l. c. *Pyrethrum foeniculaceum* Willdenow Enum. 903.

γ. *Bipinnatifidum* DC. l. c. *Pyrethrum anethifolium* Willdenow Enum. 904. *Pyrethrum foeniculaceum* Bot. Reg. t. 272.

2685. **Chrysanthemum grandiflorum** Willdenow Enum. 904. DC. Prodr. VI. 66. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

α *Adauctum* DC. l. c. *Pyrethrum adauctum* Link in Buch Can. Insl. 149. *Pyrethrum Broussonetii* β. Choisy in Buch Canar. Insl. 149. *Chrysanthemum tanacetifolium* Hort. Paris. 1821.

β. *Intermedium* DC. l. c. *Pyrethrum grandiflorum* Willd. l. c. *Chrysanthemum intermedium* Hort. monsp. 1809. *Chrysanthemum intermedium* Broussonet Hort. monsp. 1804.

γ. *Subnudum* DC. l. c. *Pyrethrum speciosum* Willdenow Enum.

2672. **Dimorphotheca** Vaill.

a. **Meteorina** Cass.

2686. **Dimorphotheca pluvialis** Mönch Method. 585. DC. Prodr. VI. 70. *Meteorina gracilipes* Cassini Dict. sc. nat. XXX. 320. *Calendula pluvialis* Linn. Spec. 1304. Schkuhr t. 264. — ☉ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Capitulum hora septima matutina apertum serenam diem portendit, quarta pomeridiana clausum.

2687. **Dimorphotheca hybrida** DC. Prodr. VI. 70. *Dimorphotheca incrassata* Mönch Method. 585. *Meteorina crassipes* Cassini Dict. sc. nat. XXX. 322. *Calendula hybrida* Linn. Spec. 1304. Schkuhr t. 264. — ☉ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Arnoldia** Cass.

2688. **Dimorphotheca chrysanthemifolia** DC. Prodr. VI. 73. *Calendula chrysanthemifolia* Venten. Malmais. t. 56. Bot. Reg. t. 40. Bot. Mag. t. 2218. *Arnoldia aurea* Cassini in Dict. sc. nat. XXX. 330. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2683. **Cotula** Gärtn.

2689. **Cotula coronopifolia** Linn. Spec. 1257. Flor. dan. t. 341. DC. Prodr. VI. 78. —⊙— *Habitat in littoribus extratropicis utriusque hemisphaerae.*

2687. **Lonas** Adans.

2690. **Lonas inodora** Gärtner Carp. II. 396. t. 165. DC Prodr. VI. 84. *Athanasia annua* Linn. Spec. 1182. *Achillea inodora* Linn. Spec. 1265. —⊙— *Habitat in Mauritania et Sicilia.*

2688. **Gonospermum** Less.

2691. **Gonospermum elegans** DC. Prodr. VI. 84. *Tanacetum canariense* DC. Catalog. Hort. Monsp. 149. *Achillea arborea* Hornemann Hort. Hafn. Suppl. 102. *Hymenolepis elegans* Cassini in Dict. sc. nat. XXXIII. 61. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

2691. **Athanasia** Cass.

2692. **Athanasia virgata** Jacq. Hort. Schönbr. II. p. 11. t. 148. DC. Prodr. VI. 89. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2692. **Saintmorysia** Cass.

2693. **Saintmorysia dentata.** *Morysia dentata* DC. Prodr. VI. 91. *Morysia diversifolia* Cassini Dict. XXXIII. 59. *Athanasia dentata* Linn. Spec. 1181. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2694. **Artemisia** Linn.

a. **Dracunculus** Bess.

2694. **Artemisia variabilis** Tenore Prodr. 5. 128. DC. Prodr. VI. 95. — ♃ — *Habitat in apricis regni Neapolitani et Hispaniae.*

2695. **Artemisia campestris** Linn. Spec. 1185. Flor. dan. t. 1175. E. B. t. 338. DC. Prodr.

VI. 96. — ♄ — *Habitat in versuris et ruderatis Europae et Sibiriae.*

2696. **Artemisia inodora** Bieberst. Flor. Taur. cauc. n. 1695. DC. Prodr. VI. 96. — ♄ — *Habitat in Tauria et Sibiria.*

2697. **Artemisia Dracunculus** Linn. Spec. 1189. DC. Prodr. VI. 97. — ♄ — *Habitat in Asia media.*

α. *Sativa* Bess. *Dracunculus hortensis* Blackw. Herb. t. 116. Bertram. Estragon.

β. *Inodora* Bess. *Artemisia inodora* Willdenow Enum. II. 864. *Artemisia Redowskii* Ledebour in Mem. Academ. Petersb. V. 574.

2698. **Artemisia desertorum** Spreng. Syst. III. 490. DC. Prodr. VI. 97. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2699. **Artemisia scoparia** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 66. t. 65. DC. Prodr. VI. 99. —⊙.— *Habitat in Europa orientali et in Asia fere tota.*

δ. Seriphidium Bess.

2700. **Artemisia caerulescens** Linn. Spec. 1189. DC. Prodr. VI. 100. — ♄ — *Habitat in Europa mediterranea.*

2701. **Artemisia monogyna** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 177. t. 75. DC. Prodr. VI. 102. *Artemisia salina* Schult. Oesterr. Fl. II. 484. excl. synon. — ♃ — *Habitat in salsis Hungariae.*

2702. **Artemisia salina** Willd. Sp. II. 1834. DC. Prodr. VI. 103. *Artemisia Seriphium* Wallroth Sched. crit. 468. *Artemisia maritima* Leyser Flor. Hall. n. 827. Sprengel Flor. Hall. t. 12. — ♃ — *Habitat in salsis Europae mediae.*

2703. **Artemisia maritima** Linn. Sp. 1186. Flor. dan. t. 1655. E. B. t. 1706. Woodward Med. bot. t. 122. DC. Prodr. VI. 103. — ♃ — *Habitat in maritimis Galliae borealis, Angliae, Sueciae, Daniae etc.* In officinis Galliae et Angliae saepe pro Santonica admissa.

c. **Abrotanum** Bess.

2704. **Artemisia afra** Jacq. Hort. Schönbr. IV. 34. t. 467. DC. Prodr. V. 106. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2705. **Artemisia Gmelini** Stechm. Artemis. 30. DC. Prodr. VI 106. — ♄ — *Habitat in Sibiria.*

2706. **Artemisia procera** Willdenow Spec. III. 1818. DC. Prodr. V. 108. — ♄ — *Habitat in Europa australi et Sibiria.*

δ *Visianiana* Besser Abrot. n. 13. *Artemisia naronitana* Visiani Dalmat.

2707. **Artemisia Abrotanum** Linn. Spec. 1185. DC. Prodr. VI. 108. — ♄ — *Habitat in collibus apricis Europae australis et Asiae minoris.*

2708. **Artemisia chamaemelifolia** Vill. Delph. III. 250. t. 35. DC. Prodr. V. 108. — ♄ — *Habitat in rupestribus apricis Delphinatus et Pedemontii.*

2709. **Artemisia herbacea** Ehrh. in Willd. Spec. III. 1828. DC. Prodr. VI. 109. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2710. **Artemisia pontica** Linn. Spec. 1187. Jacq. Flor. austr. t. 99. DC. Prodr. VI. 109. —♃— *Habitat in collibus apricis Europae mediae et australis, nec non in regione mediterraneo-occidentali et pontica.*

β. *Balsamita. Artemisia Balsamita* Willd. Enum. Suppl. 57.

2711. **Artemisia laciniata** Willd. Spec. III. 1843. DC. Prodr. VI. 110. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

γ *Mertensiana. Artemisia Mertensiana* Wallroth Sched. crit. 466. t. 4.

2712. **Artemisia macrobotrys** Ledebour Flor. alt. IV. 74. Ic. t. 467. DC. Prodr. VI. 111. *Artemisia laciniata* β. Willd. Spec. III. 1843. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2713. **Artemisia armeniaca** Lam. Dict. 2. 263. DC. Prodr. VI. 111. -- ♃ — *Habitat in Armenia et Sibiria.*

2714. **Artemisia austriaca** Jacq. Flor. austr.

t. 100. DC. Prodr. VI. 112. — ♃ — *In asperis Europae orientalis et Asiae mediae.*

γ. *Repens. Artemisia repens* Pallas in Willd. Spec. III. 1840.

2715. **Artemisia vulgaris** Linn. Spec. 1188. DC. Prodr. VI. 112. — ♃ — *Habitat in temperatis hemisphaerae borealis.*

δ. *Coarctata* Bess. — *Habitat in Sibiria.*

ε. *Mongolica* Bess. — *Habitat in Mongolia.*

ρ. *Kamtschatica* Bess. — *Habitat in Kamtschatka.*

2716. **Artemisia fasciculata** Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 293. DC. Prodr. VI. 116. — ♃ — *Habitat in regione taurico-caucasica.*

2717. **Artemisia tanacetifolia** Allioni Flor. Pedemont. n. 608. t. 10. f. 3. et t. 70. f. 2. DC. Prodr. VI. 117. — ♃ — *Habitat in Delphinatu et Pedemontio.*

2718. **Artemisia annua** Linn. Spec. 1187. DC. Prodr. VI. 119. — ⊙ — *Habitat in Sibiria orientali.*

2719. **Artemisia biennis** Willd. Spec. III. 1842. DC. Prodr. VI. 120. *Artemisia hispanica* Jacq. Ic. rar. t. 172. — ⊙ — *Habitat in America boreali.*

2720. **Artemisia pectinata** Pallas It. III. App. n. 130. t. Ah. f. 2. DC. Prodr. VI. 120. — ⊙ — *Habitat in Dauria.*

d. Absinthium DC.

2721. **Artemisia arborescens** Linn. Spec. 1188. DC. Prodr. V. 121. — ♄ — *Habitat in apricis saxosis regionis mediterraneae.*

2722. **Artemisia camphorata** Villars Delph. III. 242. DC. Prodr. VI. 121. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

α. *Columnae. Artemisia Columnae α virescens* Tenore Syll. 422. *A. Biassolettiana* Visiani Index Sem. Hort. Patav. 1836.

β. *Canescens. Artemisia Columnae β. canescens* Tenore Sylloġ. 422.

δ. *Humilis. Artemisia humilis* Jacq. Collect. IV. 295.

ε. *Saxatilis. Artemisia saxatilis* Waldst. et Kitaibel in Willd. Spec. III. 1830. *A. rupestris* Piller et Mitterp.

2723. **Artemisia sericea** Stechm. Artemis. 16. DC. Prodr. VI. 122. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2724. **Artemisia Mutellina** Villars Delph. III. 244. DC. Prodr. VI. 124. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae mediae et australis.*

2725. **Artemisia rupestris** Linn. It. gothl. 285. c. ic. DC. Prodr. VI. 125. — ♃ — *Habitat in rupibus calcareis Europae mediae et borealis.*

2726. **Artemisia Absinthium** Linn. Spec. 1188. E. B. t. 1230. DC. Prodr. VI. 125. — ♃ — *Habitat in ruderatis et montanis apricis Europae et Americae borealis.*

2727. **Artemisia anethifolia** Stechm. Artem. 29. DC. Prodr. VI. 126. — ⊙ — *Habitat in Sibiria.*

2696. Tanacetum Linn.

a. Eutanacetum DC.

2728. **Tanacetum vulgare** Linn. Spec. 1148. Gärtner t. 165. DC. Prodr. VI. 128. — ♃ — *Habitat in aggeribus et juxta vias Europae totius, nec non Tauriae.*

β. *Crispum* DC. l. c. — γ. *Praecox* Hortul.

2729. **Tanacetum boreale** Fischer msc. ex DC. Prodr. VI. 128. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Podoliae australis et Sibiriae Baikalensis.*

2730. **Tanacetum sibiricum** Linn. Spec. 1183. DC. Prodr. VI. 129. — ♃ — *Habitat in rupibus schistosis Sibiriae transbaicalensis et Dahuriae.*

b. Matricarioides Less.

2731. **Tanacetum pauciflorum** Richardson in R. Brown verm. Schrift. I. 505. DC. Prodr. VI. 131. *Artemisia matricarioides* Lessing in Linnaea VI. 210. *Cotula matricarioides* Bongard Veg. Sitch. 29. — ⊙ — *Habitat in Sibiria, Kamtschatka et America subarctica.*

c. **Brocchia** Vis.

2732. **Tanacetum globiferum** DC. Not. Plant. rar. hort. Genev. VI. n. 3. Prodr. VI. 132. Delessert Ic. select. IV. t. 48. *Tanacetum obtusum* Thunberg Flor. cap. 641. *Cotula globifera* Thunberg Flor. cap. 696. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2697. **Plagius** Herit.

2733. **Plagius ageratifolius** Heritier msc. ex DC. Prodr. VI. 135. *Balsamita ageratifolia* Desfont. in Act. soc. h. n. Paris. I. 2. *Chrysanthemum flosculosum* Linn. Spec. 1255. — ♃ — *Habitat in Sardinia, Corsica, Creta.*

2734. **Plagius virgatus** DC. Prodr. VI. 135. *Chrysanthemum discoideum* Allioni Flor. Pedem. n. 687. t. 11. f. 1. *Cotula grandis* Jacq. Observ. IV. 4. t. 81. *Chrysocoma denticulata* Jacq. Hort. Schönbr. t. 363. *Balsamita virgata* Desfont. in Act. soc. h. n. Paris. I. 2. — ⊙ — *Habitat in collibus Galliae mediterraneae et Liguriae occidentalis.*

2710. **Eriocephalus** Linn.

2735. **Eriocephalus africanus** Linn. Spec. 1310. Lessing Synops. 269. *Eriocephalus septifer* Cassini in Dict. sc. nat. L. 494. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Subtribus VII. Gnaphalieae.

2723. **Ammobium** R. Br.

2736. **Ammobium alatum** R. Brown in Bot. Mag. t. 2459. DC. Prodr. VI. 153. — ⊙ — *Habitat in arenosis Novae Hollandiae orientalis.*

2726. **Cassinia** R. Brown.

2737. **Cassinia leptophylla** R. Brown in Linn. Transact. XII. 126. DC. Prodr. VI. 155. *Calea*

leptophylla Forster Prodr. n. 287. — ♄ — *Habitat in Nova Zeelandia.*

2726. **Hapalochlamys** Cass.

2738. **Hapalochlamys Kerrii** DC. Prodr. VI. 157. *Cassinia spectabilis* Ker in Bot. Reg. t. 678. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

2727. **Humea** Smith.

2739. **Humea elegans** Smith Exot. Bot. 1. t. 1. DC. Prodr. VI. 158. *Calomeria amaranthoides* Vent. Malm. t. 73. — ⊙ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

2736. **Podolepis** Labill.

2740. **Podolepis gracilis** Graham in Edinb. new philosoph. Journ. 1828. Octob. p. 11. Sweet Fl. Gard. II. t. 285. Hooker Bot. Mag. t. 2904. DC. Prodr. VI. 163. *Stylolepis gracilis* Lehmann Index Sem. Hort. Hamb. 1828. p. 17. — ⊙ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

2741. **Helichrysum** DC.

2741. **Helichrysum bracteatum** Willd. Enum. 869. DC. Prodr. VI. 188. *Helichrysum chrysanthum* Persoon Encheir. II. 414. *Xeranthemum bracteatum* Venten. Malm. t. 2. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia orientali et meridionali.*

2742. **Helichrysum fulgidum** Willdenow Spec. III. 1904. DC. Prodr. VI. 187. *Xeranthemum fulgidum* Linn. f. Suppl. 365. Jacq. Ic. rar. t. 173. Curtis Bot. Mag. t. 414. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2743. **Helichrysum maritimum** Lessing Synops. 304. DC. Prodr. VI. 204. *Gnaphalium maritimum* Linné Mant. 263. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2742. **Helipterum** DC.

2744. **Helipterum humile** DC. Prodr. VI. 214.] *Helichrysum humile* Lessing Synops. 322. *Aphelexis humilis* Don in Mem. Werner Soc. V. 546. *Xeranthemum sesamoides* Curtis Bot. Mag. t. 425. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2752. **Filago** Tournef.

2745. **Filago arvensis** Linn. Spec. 1312. DC. Prodr. VI. 248. *Gnaphalium arvense* Willdenow Spec. III. 1897. — ⊙ — *Habitat in arvis arenosis Europae et Orientis.*

2775. **Carpesium** Linn.

2746. **Carpesium cernuum** Linn. Spec. 1203. Jacq Flor. austr. t. 204. Schkuhr Handb. t. 244. DC. Prodr. VI. 281. — ♃ — *Habitat in paludosis Europae australioris.*

2776. **Amblyocarpon** Fisch. et Mey.

2747. **Amblyocarpon inuloides** Fischer et Meyer Index Sem. Hort. Petrop. 1837. p. 30. DC. Prodr. VII. 286. — ♃ — *Habitat in nemoribus prope Lenkoran.*

2782. **Eclopes** Gärtn.

2748. **Eclopes trinervis** Lessing Synops. 381. DC. Prodr. VI. 289. *Eclopes pungens* Cassini in Dict. sc. nat. XLV. 31. *Relhania trinervis* et *Relhania quinquenervis* Thunb. Flor. cap. 641. *Relhania lateriflora* Link Enum. II. 340. non Herit. *Relhania pungens* Ker in Bot. Reg. t. 587. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2783. **Rhynchopsidium** DC.

2749. **Rhynchopsidium sessiliflorum** DC. Plant. Jard. Genev. not. 7. t. 4. Prodr. VI. 290. *Relhania sessiliflora* Thunberg Flor. Cap. 639. *Athanasia*

sessiliflora Linn. f. Suppl. 362. —⊙— *Habitat in Capite bonae spei.*

Subtribus VIII. Senecioneae.

2790. **Erechtites** Raf.

2750. **Erechtites ambigua** DC. Prodr. VI. 295. *Senecio cacalioides* Link Enum. II. 325. —⊙— *Habitat in Brasilia.*

2792. **Gynura** Cass.

2751. **Gynura haematophylla** DC. Prodr. VI. 299. *Senecio cruentus* Roth in Römer Collect. I. 3. 44. *Senecio haematophyllus* Willdenow Enum. II. 875. *Senecio discolor* Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 1. p. 104. *Senecio bicolor* Balbis Cat. Hort. Taurin. 1804. p. 42. *Senecio africanus* Hortor. — ♄ — *Patria ignota.*

2793. **Emilia** Cass.

2752. **Emilia sagittata** DC. Prodr. VI. 302. *Emilia flammea* Cassini in Dict. sc. nat. XIV. 406. *Cacalia sagittata* Vahl Symb. III. 91. excl. synon. *Cacalia coccinea* Curtis Bot. Mag. t. 564. *Cacalia sonchifolia* Hortul. —⊙— *Habitat in India orientali.*

2798. **Senecillis** Gärtn.

2753. **Senecillis glauca** Gärtner Carp. II. 453. t. 173. DC. Prodr. VI. 313 —♃— *Habitat in campis Sibiriae et Podoliae orientalis.*

2799. **Ligularia** Cass.

2754. **Ligularia gigantea** Siebold et Zucc. Flor. japon. I. 79. t. 36. *Tussilago japonica* Hort. non Linn. —♃— *Colitur passim in hortis Japoniae australis, a Sieboldio in Europam advecta.*

Sponte nascentem in insulae Nippon ditione Dewa (40° L. B.) occurrere, ibique altitudinem 8—15 pedum attingere, affirmant botanici japonici.

2755. **Ligularia sibirica** Cassini in Dict. sc. nat. XXVI. 401. DC. Prodr. VI. 315. *Cineraria sibirica* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. t. 16. *Hoppea sibirica* Reichenb. Flor. excurs. 240. — ♃ — *Habitat in paludosis Sibiriae, Caucasi, Hungariae, Bohemiae, Galliae, Pyrenaeorum.*

δ. *Speciosa* DC. l. c. *Cineraria speciosa* Schrader ex Link Enum. II. 334. Bot. Reg. t. 812. *Hoppea speciosa* Reichenb. Ic. exot. t. 10. *Cineraria Fischeri* Ledebour msc.

2756. **Ligularia thyrsoidea** DC. Prodr. VI. 315. *Cineraria thyrsoidea* Ledebour Flor. alt. IV. 107. Ic. t. 157. — ♃ — *Habitat in Sibiriae altaicae locis vere inundatis.*

2757. **Ligularia macrophylla** DC. Prodr. VI. 316. *Cineraria macrophylla* Ledebour Flor. alt. IV. 108. Ic. t. 367. — ♃ — *Habitat in Sibiriae altaicae pratensibus deserti Songoro-Khirgisici ad montem Tschingistan.*

2800. **Arnica** Linn.

2758. **Arnica montana** Linn. Spec. 1245. Schkuhr Handb. t. 248. Flor. dan. t. 63. DC. Prodr. VI. 317. — ♃ — *Habitat in pratis sylvestribus frigidioribus, in alpes adscendens.*

2802. **Doronicum** Linn.

2759. **Doronicum caucasicum** Bieberst. Supplem. n. 1755. Hooker Bot. Mag. t. 3143. DC. Prodr. VI. 320. *Doronicum orientale* Willdenow Enum. 898. *Doronicum eriorhizon* Gussone msc. — ♃ — *Habitat in umbrosis sylvaticis Caucasi, Romaniae, Regni neapolitani et Siciliae.*

2760. **Doronicum Columnae** Tenore Flor. neap. II. 229. t. 79. DC. Prodr. VI. 320. *Doronicum orientale* Reichenb. Flor. excurs. II. 235. *Doronicum cordifolium* Sternberg. *Arnica cordata* Wulfen in Römer Coll. III 408. — ♃ — *Habitat in nemoribus montanis Tyrolis, Italiae et Romaniae.*

2761. **Doronicum Pardalianches** Linn.

Spec. 1247. E. B. t. 2654. Schkuhr t. 249. Hayne Arzneigew. VI. t. 21. *Doronicum cordatum* Lam. Fl. fr. II. 128. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae.*

β. *Rotundifolium* DC. l. c. *Doronicum Pardalianches* Jacq. Flor. austr. t. 350. *D. Mathioli* Tausch ex Reichenb. Flor. excurs. II. 234.

2762. **Doronicum macrophyllum** Fischer ex Hornem. Suppl. 900. DC. Prodr. VI. 321. — ♃ — *Habitat in sylvis humidis montium Karabagh.*

2763. **Doronicum austriacum** Jacq. Flor. austr. t. 130. DC Prodr. VI. 321. — ♃ — *Habitat in subalpinis sylvaticis Europae mediae.*

2764. **Doronicum scorpioides** Willd Spec. III. 2114. Hayne Arzneigew. VI. t. 22. DC. Prodr. VI. 321. *Doronicum Pardalianches* β. Linn. Spec. 1247. E. B. t. 630. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae mediae et australis.*

2765. **Doronicum plantagineum** Willd. Spec. 1247. DC. Prodr. VI. 321. — ♃ — *Habitat in nemoribus arenosis Europae mediae.*

2766. **Doronicum dentatum** Link Enum. II. 337. DC. Prodr. VI. 322. *Doronicum plantagineum* Willd. Suppl. 59. — ♃ — *Patria ignota.*

2806. Cacalia Linn.

1. Eucacalia DC.

2767. **Cacalia hastata** Linn. Spec. 1170. DC. Prodr. VI. 327. — ♃ — *Habitat in herbidis Sibiriae.*

2768. **Cacalia suaveolens** Linn. Spec. 1170. DC. Prodr. VI. 327. — ♃ — *Habitat in America boreali juxta rivulos.*

2. Conophora DC.

2769. **Cacalia atriplicifolia** Linn. Spec. 1170. DC. Prodr. VI. 329. — ♃ — *Habitat in inundatis Pensylvaniae.*

2770. **Cacalia gigantea** Jacq. f. msc. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3. Aulacophora DC.

2771. **Cacalia flexuosa** Wallich Catalog. n. 3160. DC. Prodr. VI. 330. *Eupatorium flexuosum* Lam. Dict. II. 411. *Senecio flexuosus* Lessing Synops. 392. — ♃ — *Habitat in insula Mauritii.*

2809. Kleinia Linn.

* **Foliis carnosis, crassis, glabris.**

2772. **Kleinia carnosa.** *Cacalia carnosa* Aiton Hort. kew. III. 156. —? *Kleinia breviscapa* DC. Prodr. VI. 337. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2773. **Kleinia ficoides** Haworth Succul. 313. DC. Prodr. VI. 337. *Cacalia ficoides* Linn. Spec. 1168. DC. Pl. grass. t. 90. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2774. **Kleinia repens** Haworth Succul. 313. DC. Prodr. VI. 337. *Cacalia repens* Linn. Mant. 110. DC. Pl. grass. t. 42. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2775. **Kleinia ? pugioniformis** DC. Prodr. VI. 338. *Cacalia pugioniformis* Salm Hort. Dyk. *Cacalia longifolia* Haworth Revis. 193. — ♄ — *Patria ignota.*

Nemini hucdum floruit, et ideo genus plantae summopere dubium.

** **Foliis carnosis, crassis, tomento denso canis.**

2776. **Kleinia Haworthii** DC. Prodr. VI. 338. *Kleinia tomentosa* Haworth 314. *Cacalia tomentosa* Haworth Miscell. 189. non Linn. et Jacq. *Cacalia canescens* Willd. Enum. Suppl. 427. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei. In Europa nondum floruit.*

*** **Foliis planis integerrimis.**

2777. **Kleinia Anteuphorbium** DC. Prodr. VI. 338. *Cacalia Anteuphorbium* Linn. Spec. 1168. *Ante-Euphorbium* Dodon. Pempt. 378. Morison Oxon. s. 7. t. 37. f. 10. Dillen. Elth. 63. t. 55. f. 2. 3. — ♄ —

Habitat in Capite bonae spei. Nemo praeter Dillenium florentem vidit, generis ideo dubii.

2778. **Kleinia neriifolia** Haworth Succ. 312. DC. Prodr. VI. 338. *Cacalia Kleinia* Linn. Spec. 1168. Gärtner II. t. 166. f. 2. DC. Pl. grass. t. 12. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

2811. Senecio Less.

I. Caucasici.

§. 1. Obejacae DC.

2779. **Senecio vulgaris** Linn. Spec. 1216. Flor. dan. t. 513. DC. Prodr. VI. 341. — ⊙ — *Habitat in cultis regionum extratropicarum totius orbis.*

2780. **Senecio viscosus** Linn. Spec. 1217. Flor. dan. t. 1230. DC. Prodr. VI. 342. — ⊙ — *Habitat in campis arenosis et sylvis caeduis Europae totius.*

§. 2. Ecalyculati DC.

2781. **Senecio lyratifolius** Reichenb. Iconogr. f. 258 DC. Prodr. VI. 347. *Cineraria alpina* Willdenow Spec. II. 2084. — ♃ — *Habitat in convallibus alpinis Helvetiae et Germaniae.*

§. 3. Jacobaeae DC.

2782. **Senecio artemisiaefolius** Persoon Encheir. II. 435. Reichenb. Iconogr. t. 485. DC. Prodr. VI. 348. *Senecio abrotanifolius* Gouan Hort. monsp. 440. — ♃ — *Habitat in Pyrenaeis.*

2783. **Senecio aquaticus** Hudson Flor. angl. 366. E. B. t. 1131. Flor. dan. t. 784. DC. Prodr. VI. 349. — ♃ — *Habitat in inundatis, imprimis maritimis Europae fere totius.*

β. *Barbareaefolius* Krocker ex Reichenb. Flor. excurs. II. 244.

2784. **Senecio Jacobaea** Linn. Spec. 1219. E. B. t. 1130. DC. Prodr. VI. 350. — ♃ — *Habitat in pratis et dumetis Europae totius et Sibiriae.*

2785. **Senecio rupestris** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. II. 136. t. 128. — ♃ — *Habitat in Hungaria.*

2786. **Senecio erucaefolius** Hudson Flor. angl. 366. DC. Prodr. VI. 351. *Senecio lycopifolius* Desfont. Catalog. Hort. Paris. 124. — ♃ — *Habitat in Europae totius asperis montanis.*

β. *Senecio tenuifolius* Jacq. Flor. austr. t. 278.

2787. **Senecio praealtus** Bertoloni Opusc. sc. di Bologn. III. 183. t. 7. DC. Prodr. VI. 351. *Senecio arenarius* Bieberstein in Besser Catalog. Hort. Crem. 1816. p. 129. *Senecio chrysanthemifolius* Moretti Bibliot. italian. XII. 374. — ♃ — *Habitat in Italia et Tauria.*

§. 4. Saracenici.

2788. **Senecio umbrosus** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. III. 232. t. 210. DC. Prodr. VI. 352. — ♃ — *Habitat in Hungariae sylvis acerosis.*

2789. **Senecio macrophyllus** Bieberst. Flor. Taur. Cauc. Suppl. n. 1727. DC. Prodr. VII. 352. — ♃ — *Habitat in herbidis Caucasi.*

2790. **Senecio Doria** Linn. Spec. 1221. Jacq. Flor. austr. t. 185. DC. Prodr. VI. 352. — ♃ — *Habitat juxta rivulos Europae australioris et Orientis.*

2791 **Senecio Cacaliaster** Lam. Fl. fr. II. 132. DC. Prodr. VI. 353. *Cacalia saracenica* Linn. Spec. 1169. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Arverniae.*

2792. **Senecio saracenicus** Jacq. Flor. austr. II. t. 186. DC. Prodr. VI. 353. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae totius et Sibiriae altaicae.*

2793. **Senecio coriaceus** Aiton Hort. kew. III. 195. DC. Prodr. VI. 354. — ♃ — *Habitat in Oriente.*

§. 5. Incani DC.

2794. **Senecio Cineraria** DC. Prodr. VI. 355. *Cineraria maritima* Linn. Spec. ed. 1. p. 925. *Senecio maritimus* Reichenb. Flor. excurs. 244. non

Linn. — ♃ — *Habitat in rupestribus secus mare mediterraneum.*

2795. **Senecio gibbosus** DC. Prodr. VI. 355. *Cineraria gibbosa* Gussone Cat. Horti Boccadif. 1821. p. 71. — ♃ — *Habitat in Calabria et Sicilia.*

2796. **Senecio ambiguus** DC. Prodr. VI. 356. *Cineraria ambigua* Bivona Manip. III. 5. *Cineraria bicolor* Willdenow Spec. III. 2085. — ♄ — *Habitat in regione inferiore montis Aetna.*

§. 6. Crociserides DC.

2797. **Senecio arachnoideus** Sieber Plant. rar. 1812. DC. Prodr. VI. 357. *Senecio lanatus* Scopoli Flor. carn. ed. 2. n. 1069. non Linn. *Senecio Scopolii* Hoppe et Hornsch. Reise 1817. *Arnica lanigera* Tenore Prodr. 49. *Arnica floccosa* Bertoloni Lucubr. VII. 36. *Cineraria arachnoidea* Reichenb. Flor. excurs. III. 242. — ♃ — *Habitat in pratis et sylvis Carnioliae, Istriae, Etruriae et Neapolis.*

§. 7. Tephroserides DC.

2798. **Senecio rivularis** DC. Prodr. VI. 359. *Cineraria rivularis* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 239. — ♃ — *Habitat in Hungaria et Bohemia.*

2799. **Senecio campestris** DC. Prodr. VI. 361. *Cineraria campestris* Retz Observ. I. 30. — ♃ — *Habitat in pratis Europae et Asiae borealis.*

2800. **Senecio flammeus** DC. Prodr. VI. 362. *Cineraria flammea* Turrzaninow msc. — ♃ — *Habitat in pratis Dahuriae.*

2801. **Senecio Kirghisicus** DC. Prodr. VI. 362. *Cineraria glabrata* Ledebour Ic. t. 94. — ♃ — *Habitat in pratis deserti Khirgisorum.*

II. Capenses.

2802. **Senecio cinerascens** Aiton Hort. kew. III. 191. Jacq. Hort. Schönbr. t. 150. DC. Prodr. VI 389. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2803. **Senecio rigidus** Linn. Spec. 1224. DC. Prodr. VI. 392. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2804. **Senecio reclinatus** Linn. f. Suppl. 369. Heritier Stirp. nov. t. 5. DC. Prodr. VI. 398. *Senecio graminifolius* Jacq. Ic. rar. t. 180. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2805. **Senecio purpureus** Linn. Spec. 1215. DC. Prodr. VI. 405. *Cacalia villosa* Jacq. Collect. II. 347. Ic. rar. III. t. 580. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2806. **Senecio venustus** Aiton Hort. kew. III. 192. Lindley in Hortic. Transact. VI. 99. Bot. Reg. t. 901. *Senecio grandiflorus* Berg. Fl. Cap. 280. DC. Prodr. VI. 408. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2807. **Senecio glastifolius** Linn. f. Suppl. 372. DC. Prodr. VI. 408. *Senecio lilacinus* Schrader Blumenb. 39. t. 4. f. 1. Lindley in Bot. Reg. t. 1342. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

III. Canarienses.

2808. **Senecio Tussilaginis** Lindley in Bot. Reg. t. 1550. DC. Prodr. VI. 410. *Cineraria Tussilaginis* Heritier Sert. 26. — ⊙ — *Habitat in Teneriffa.*

IV. Mexicani.

2809. **Senecio praecox** DC. Prodr. VI. 431. *Cineraria praecox* Cavanill. Ic. III. 23. t. 244. DC. Plant. rar. Jard. Genev. t. 7. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

2810. **Senecio Petasitis** DC. Prodr. VI. 431. *Cineraria Petasitis* Sims Bot. Mag. t. 1536. *Cineraria platanifolia* Schrank Hort. Monac. t. 95. Colla Hort. ripul. App. 2. t. 12. — ♄ — *Habitat in Mexico.*

Tribus V. Cynareae.

Subtribus I. Calenduleae.

2822. Calendula Neck.

2811. **Calendula officinalis** Linn. Spec. 1304. Gärtner Carp. t. 168. Hooker Bot. Mag. t. 3204. DC. Prodr. VI. 451. *Caltha officinalis* Mönch Method. 585. — ⊙ — *Habitat in arvis Europae australis.*

2812. **Calendula incana** Willdenow Spec. III. 2341. DC. Prodr. VI. 452. *Calendula tomentosa* Desfont. Flor. atlant. II. 305. t. 245. — ⊙ — *Habitat in maritimis Lusitaniae et regni Maroccani.*

2813. **Calendula maritima** Gussone Index sem. horti Boccadif. 1825. DC. Prodr. VI. 452. — ⊙ — *Habitat in Siciliae insula Trapani.*

2814. **Calendula arvensis** Linn. Spec. 1303. Gärtner II. t. 168. Schkuhr t. 265. DC. Prodr. VI. 452. *Caltha arvensis* Mönch Method. 585. — ⊙ — *Habitat in arvis Europae mediae et australis.*

2815 **Calendula sicula** Cyrillo ex Balbis Catalog. Hort. Taur. 1800. DC. Prodr. VI. 452. — ⊙ — *Habitat in Sicilia et Aegypto.*

? β. *Calendula sancta* Linn. Spec. 1304.

2816. **Calendula gracilis** DC. Prodr. VI. 453. — ⊙ — *Habitat in Persiae provincia Karabagh.*

2817. **Calendula stellata** Cavanill. Ic. I. 3. t. 5. Schkuhr t. 265. DC. Prodr. VI. 454. — ⊙ — *Habitat in arvis Barbariae.*

2818. **Calendula Asterias** Fischer et C. A. Meyer Index Sem. Hort. Petrop. 1835. II. 31. — ⊙ — *Patria ignota.*

2825. Osteospermum Linn.

2819. **Osteospermum spinescens** Thunb. Flor. Cap. 713. DC. Prodr. VI. 459. non Linn. *Osteospermum spinosum* Jacq. Hort. Schönbr. III. 66. t. 377. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2820. **Osteospermum moniliferum** Linn. Spec. 1308. Lam. Illustr. t. 714. DC. Prodr. VI. 460. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2828. **Othonna** Cass.

2821. **Othonna cylindrica** DC. Prodr. VI. 477. *Cacalia cylindrica* Lam. Dict. I. 529. DC. Plant. gr. t. 48. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2828. **Hertia** Less.

2822. **Hertia crassifolia** Lessing in Linnaea VI. 94. Synops. 88. DC. Prodr. VI. 483. *Othonna crassifolia* Linn. Mant. 118. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Subtribus II. Arctotideae.

2830. **Arctotis** Gärtn.

2823. **Arctotis squarrosa** Jacquin Hort. Schönbr. II. t. 177. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2824. **Arctotis auriculata** Jacquin Hort. Schönbr. II. t. 169. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2825. **Arctotis arborescens** Jacquin Hort. Schönbr. II. t. 171. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2826. **Arctotis elatior** Jacq. Hort. Schönbr. II. 23. t. 172. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2827. **Arctotis revoluta** Jacq. Hort. Schönbr. II. 24. t. 173. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2828. **Arctotis rosea** Jacq. Hort. Schönbr. II. t. 162. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2835. **Arctotheca** Wendl.

2829. **Arctotheca repens** Wendland Hort. Herrenh. 8. t. 6. DC. Prodr. VI. 495. *Arctotis inter-*

rupta Thunb. Flor. Cap. 708. *Arctotis repens* Jacq. Hort. Schönbr. III. 31. t. 306. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2836. Cryptostemma R. Br.

2830. **Cryptostemma calendulaceum** R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 141. DC. Prodr. VI. 495. — ⊙ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2843. Didelta Herit.

2831. **Didelta spinosum** Aiton Hort. kew. III. 256. Wendland Observ. 33. t. 4. f. 32. *Choristea spinosa* Thunb. Prodr. 163. *Polymnia spinosa* Linn. f. Suppl. 384. *Favonium spinosum* Gärtner Carp. II. 431. t. 174. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2844. Berkheya Ehrh.

2832. **Berkheya fruticosa** Ehrhart Beitr. III. 137. DC. Prodr. VI. 506. *Berkheya incana* Willdenow Spec. III. 2269. *Gorteria asteroides* Linn. f. Suppl. 381. Jacq. Ic. rar. t. 591. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2845. Gazania Gärtn.

2833. **Gazania Pavonia** R. Brown in Aiton Hort. kew. V. 140. DC. Prodr. VI. 510. *Gorteria Pavonia* Andrews Bot. Reposit. t. 523. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

2834. **Gazania rigens** R. Brown in Aiton Hort. kew. V. 140. *Gorteria rigens* Linn. Spec. 1214. Bot. Mag. t. 90. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Subtribus III. Echinopsideae.

2847. Echinops Linn.

2835. **Echinops exaltatus** Schrader Hort. Götting. II. 15. t. 9. Trautvetter Dissert. 12. DC.

Prodr. VI. 523. *Echinops strictus* Fischer in Bot. Mag. t. 2457. *Echinops Ritro* Schkuhr Handb. t. 268. non Linn. — ⊙ — *Patria ignota.*

2836. **Echinops dahuricus** Fischer Catalog. Hort. Gorenk. 37. DC. Prodr. VI. 523. *Echinops Gmelini* Ledebour Flor. alt. IV. 45. in not. Trautvetter Dissert. 14. f. 3. non Turczan. — ♃ — *Habitat in regione baicalensi, Dahuria et Mongolia chinensi.*

2837. **Echinops Ritro** Linn. Spec. 1314. Trautvetter Dissert. 23. f. 9. DC. Prodr. VI. 524. — ⊙ — *Habitat in Europa australiore.*

β. *Tenuifolius. Echinops tenuifolius* Fisch. msc. Schkuhr Handb. III. 181. *Echinops Ritro ruthenicus* Fischer Catalog. Hort. Gorenk. 1812. p. 37. — γ. *Polycephalus.* — δ. *Wolgaricus.* — ε. *Hybridus.*

2838. **Echinops banaticus** Rochel ex Schrader Blumenb. 48. DC. Prodr. VI. 524. *Echinops ruthenicus* Reichenb. Iconogr. t. 450. Rochel Plant. banat. t. 37. f. 78. — ♃ — *Habitat in Banatu et Tauria.*

2839. **Echinops sphaerocephalus** Linn. Spec. 1314. DC. Prodr. VI. 524. — ♃ — *Habitat in asperis apricis Europae australioris et Sibiriae.*

β. *Paniculatus. Echinops paniculatus* Jacq. fil. Eclog. t. 9.

2840. **Echinops persicus** Steven et Fischer Catalog. 1812. p. 37. DC. Prodr. VI. 525. *Echinops pungens* Trautvetter Dissert. 18. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

2841. **Echinops Tournefortii** Ledebour in Trautvetter Dissert. 21. DC. Prodr. VI. 525. *Echinops strigosus* Bieberst. Casp. add. 221. — ♃ — *Habitat in regione transcaucasica.*

2842. **Echinops horridus** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 1. p. 94. Schrader Dissert. Blumenb. 51. t. 2. f. 2. DC. Prodr. VI. 526. *Echinops orientalis* Trautvetter Dissert. 22. — ♃ — *Habitat in siccis apricis Persiae.*

2843. **Echinops niveus** Wallich Catalog. n.

2686. Royle Illustr. t. 66. f. 1. DC. Prodr. VI. 526. — ♃ — *Habitat in Sirinagur Indiae orientalis.*

2844. **Echinops strigosus** Linn. Spec. 1315. Desfont. Flor. atlant. II. 310. Trautvetter Dissert. 26. DC. Prodr. VI. 526. — ⊙ — *Habitat in arvis et segetibus Lusitaniae, Hispaniae et Barbariae.*

Subtribus IV. Xeranthemeae.

2850. Xeranthemum Tournef.

2845. **Xeranthemum annuum** Jacq. Flor. austr. t. 338. Gay in Mem. soc. h. n. Paris. III. 357. Reichenb. Iconogr. t. 641. *Xeranthemum radiatum* Reichenb. Fl. fr. II. 48. DC. Prodr. VI. 528. — ⊙ — *Habitat in siccis lapidosis Europae orientalis et australis.*

2846. **Xeranthemum inapertum** Gay in Mem. soc. h. n. Paris. III. 360. t. 7. f. 2. Reichenb. Iconogr. t. 640. *Xeranthemum erectum* Presl Delic. prag. p. 106. DC. Prodr. VI. 529. — ⊙ — *Habitat in saxosis regionis mediterraneae.*

2851. Chardinia Desfont.

2847. **Chardinia xeranthemoides** Desfont. in Mem. Mus. III. 454. t. 21. Gay in Mem. soc. h. n. Paris. III. 365. t. 8. DC. Prodr. VI. 530. *Xeranthemum orientale* Willd. Spec. III. 1902. — ⊙ — *Habitat in Oriente, locis siccis, herbidis, cultis.*

Subtribus V. Carlineae.

2853. Saussurea DC.

α. Benedictia DC.

2848. **Saussurea acuminata** Turczanin. ex Fischer et Meyer Ind. Sem. Hort. Petrop. 1835. p. 37. DC. Prodr. VI. 536. — ♃ — *Habitat in pratis sylvaticis humidis Dahuriae.*

b. **Theodorea** Cass.

2849. **Saussurea glomerata** Poiret Dict. V. 71. Ledebour Ic. t. 68. DC. Prodr. VI. 537. —♃— *Habitat in subsalsis Sibiriae frequens.*

2850. **Saussurea pulchella** Fischer in DC. Prodr. VI. 537. *Heterotrichum pulchellum* Fischer in Mem. Soc. Mosq. III. 71. *Theodora pulchella* Cassini in Dict. sc. nat. LIII. 465. *Serratula pulchella* Sims in Bot. Mag. t. 2589. *Saussurea dissecta* Ledebour Ic. t. 61. — ♃ — *Habitat in pratis montosis Dahuriae ultra lacum Baikal.*

2854. Haplotaxis DC.

2851. **Haplotaxis Bungei** DC. Prodr. VI. 539. *Cirsium lyratum* Bunge Plant. chin. n. 203. *Hemisteptia lyrata* Bunge in Fisch. et Mey. Index Sem. Hort. Petrop. 1835. II. p. 38. —⊙— *Habitat in pratis montanis Chinae borealis.*

2852. **Haplotaxis albescens** DC. Prodr. VI. 540. *Serratula albescens* Wallich Cat. n. 2918. —⊙— *Habitat in India.*

2858. Koechlea Endl.

2853. **Koechlea mitis** Endl. — ♃ — *Habitat in monte Tauro Asiae, e seminibus a Theodoro Kotschy olim lectis nata.*

2859. Carlina Tournef.

a. **Heracantha** Tabern.

2854. **Carlina acanthifolia** Allioni Flor. Pedemont. n. 571. t 51. DC. Prodr. VI. 545. *Carlina acaulis* Lam. Dict. I. 623. non Linn. *Carlina chardousse* Villars Delph. III. 30. *Carlina utzka* Hacquet Plant. carn. 7. t. 1. — ♃ — *Habitat in pascuis apricis montium Galliae australis, Italiae superioris et Carnioliae.*

2855. **Carlina acaulis** Linn. Spec. 1160. *Car-*

lina subacaulis DC. Prodr. VI. 545. — ♃ — *Habitat in pascuis montanis Europae totius.*

α. Acaulis vera. — *β. Caulescens* DC. l. c. Clusius Hist. 2. 155. f. 3. — *γ Simplex* DC. l. c. *Carlina acaulis* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 62.

2856. **Carlina vulgaris** Linn. Spec. 1161. E. B. t. 1144. DC. Prodr. VI. 546. — ⊙ — *Habitat in aridis montosis Europae totius.*

b. Mitina Adans.

2857. **Carlina corymbosa** Linn. Spec. 1160. Sibthorp Flor. graec. t. 837. DC. Prodr. VI. 547. — ⊙ — *Habitat in apricis lapidosis Europae australis.*

2858. **Carlina salicifolia** Lessing Synops. DC. Prodr. VI. 548. *Carlowizia salicifolia* DC. in Annal. Mus. XVI. 207. t. 15. Jacq. f. Eclog. I. 12. t. 15. *Carthamus salicifolius* Linn. f. Supplem. 350. *Onobroma salicifolium* Link Enum. hort. berolin. II. 304. *Athamus* Necker Elem. n. 154. — ♄ — *Crescit in rupibus Maderae et Portus-sancti.*

2862. Cousinia Cass.

2859. **Cousinia Hystrix** C. A. Meyer Index Sem. Hort Petrop. 1835. II. p. 34. DC. Prodr. VI. 554. *Carthamus pterocaulos* C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. 67. — ♃ — *Habitat in montibus herbidis provinciae Talüsch et Ghilan.*

2860. **Cousinia cynaroides** C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. 230. DC. Prodr. VI. 556. *Carthamus cynaroides* Bieberst. Flor. taur. cauc. II. 285. *Onobroma cynaroides* Sprengel Syst. III. 392. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Caucasi.*

2863. Ancathia DC.

2861. **Ancathia igniaria** DC. Prodr. VI. 557. Delessert Ic. IV. t. 73. *Cirsium igniarium* Sprengel Syst. III. 375. Ledebour Ic. t. 477. *Onopyxus igniarius* Hort. *Carduus igniarius* Pallas Herb. — ♃ — *Habitat in rupestribus et campestribus siccis ad Altai frequens.*

Subtribus VI. Centaureae.

2865. **Amberboa** Pers.

2862. **Amberboa muricata** DC. Prodr. VI. 559. *Cyanopsis radiatissima* Cassini in Dict. sc. nat. XLIV. 39. *Centaurea muricata* Linn. Spec. 1299. —⊙— *Habitat in Hispania.*

2863. **Amberboa odorata** DC. Prodr. VI. 559. *Chryseis odorata* Cassini in Dict. sc. nat. IX. 154. XLIV. 39. —⊙— *Habitat in Oriente.*

α. Ambraeea DC. *Centaurea Amberboi* Lam. Dict. I. 664. *Centaurea suaveolens* Willd. Spec. III. 2279. *Centaurea ambraoea* Schkuhr Handb. t. 261. *Centaurea moschata β.* Linn. Spec. 1286.

2866. **Zoega** Linn.

2864. **Zoega Leptaurea** Linn. Mant. 117. Heritier Stirp. 57. t. 29. Jacq. Ic. rar. t. 77. DC. Prodr. VI. 562. *Centaurea calendulacea* DC. Prodr. VI. 562. —⊙— *Habitat in arvis Syriae.*

2867. **Microlonchus** DC.

2865. **Microlonchus salmanticus** DC. Prodr. VI. 563. *Mantisalca elegans* Cassini Dict. sc. nat. XXIX. 31. *Centaurea salmantica* Linn. Spec. 1299. Jacq. Hort. Vindob. t. 64. Schkuhr Handb. t. 261. *Calcitrapa altissima* Lam. Fl. fr. II. 31. —⊙— *Habitat in arvis Europae australis et Mauritaniae.*

2870. **Crupina** Cass.

2866. **Crupina vulgaris** Cassini in Dict. sc. nat. XLIV. 39. L 239. DC. Prodr. VI. 565. *Centaurea Crupina* Linn. Spec. 1285. —⊙— *Habitat in asperis regionis mediterraneae.*

2871. **Centaurea** Less.

A. Haplolepideae.

1. Hyalaea DC.

2867. **Centaurea pulchella** Ledebour Ic. t. 93. DC. Prodr. VI. 565. — ⊙ — *Habitat in collibus siccis Persiae, et in desertis salsis Khirghisorum.*

2. Centaurium Cass.

2868. **Centaurea africana** Lam. Dict. I. 664. Desfont. Flor. atl. II. 294. DC. Prodr. VI. 566. — ♃ — *Habitat in collibus Algeriae.*

2869. **Centaurea ruthenica** Lam. Dict. I. 663. Baumgart. Flor. Transylv. II. 70. DC. Prodr. VI. 566. — ♃ — *Habitat in apricis graminosis Transylvaniae, Caucasi, Sibiriae.*

2870. **Centaurea alpina** Linn. Spec. 1286. DC. Prodr. VI. 566. *Centaurea baldensis* Persoon Encheir. II. 481. — ♃ — *Habitat in monte Baldo et in alpibus Penninis et Julianis.*

3. Microlophus DC.

2871. **Centaurea Behen** Linn. Spec. 1292. DC. Prodr. VI. 567. *Piptoceras Behen* Cassini Dict. sc. nat. LV. 487. — ♃ — *Habitat in siccis lapidosis Persiae et Cappadociae.*

4. Chartolepis Cass.

2872. **Centaurea glastifolia** Linn. Spec. 1294. Curtis Bot. Mag. t. 62. DC. Prodr. VI. 568. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Sibiria australi.*

2873. **Centaurea macrocephala** Puschkin in Willd. Spec. III. 2298. Sims Bot. Mag. t. 1248. DC. Prodr. VI. 568. — ⊙ — *Habitat in collibus Iberiae.*

5. Phalolepis Cass.

2874. **Centaurea nitens** Bieberst. in Will-

denow Spec. III. 2305. DC. Prodr. VI. 568. *Callicephalus nitens* C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. n. 544. — ⊙ — *Habitat in collibus aridis Caucasi et Iberiae.*

2875. **Centaurea alba** Linn. Spec. 1293. DC. Prodr. VI. 569. — ♃ — *Habitat in apricis Europae australis ab Hispania ad Tauriam.*

β. *Concolor* DC. l. c. *Centaurea splendens* Tenore Syllog. add. 3. p. 628. *Centaurea globosa* Hortul.

γ. *Deusta* DC. l. c. *Centaurea deusta* Tenore Flor. neap. t. 84.

2876. **Centaurea amara** Linn. Spec. 1292. DC. Prodr. VI. 569. — ♃ — *Habitat in pratis apricis Europae, imprimis australis.*

B. Jaceinae.

6. Jacea Cass.

2877. **Centaurea Jacea** Linn. Spec. 1293. Flor. dan. t. 519. DC. Prodr. VI. 570. — ♃ — *Habitat in pratis Europae, vulgaris.*

2878. **Centaurea transalpina** Schleicher Plant. exsicc. DC. Prodr. VI. 571. — ♃ — *Habitat in pratis Pedemontii et Etruriae.*

2879. **Centaurea nigrescens** Willd. Spec. III. 2288. DC. Prodr. VI. 571. — ♃ — *Habitat in pratis Europae orientalis et australioris.*

7. Platylophus Cass.

2880. **Centaurea nigra** Linn. Spec. 1288. E. B. t. 278. Flor. dan. t. 906. DC. Prodr. VI. 571. — ♃ — *Habitat in pratis et ruderatis Europae totius nec non Americae borealis.*

β. *Decipiens. Centaurea decipiens* Thuillier Flor. Paris. ed. 2. p. 445. Reichenb. Iconogr. t. 985.

8. Pterolophus Cass.

2881. **Centaurea spinulosa** Rochel Plant. Banat. 76. t. 36. f. 76. Sprengel Nov. Prov. 1818.

p. 8. Host Flor. austr. II. 521. DC. Prodr. VI. 572. —♃— *Habitat ad margines agrorum Banatus et Croatiae.*

9. Lepteranthus DC.

2882. **Centaurea flosculosa** Balbis ex Willd. Spec. III. 2285. Reichenb. Iconogr. t. 362. DC. Prodr. VI. 573. *Lepteranthus incoronatus* Cassini Dict. sc. nat. XXVI. 66. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Transylvaniae et Pedemontii.*

2883. **Centaurea austriaca** Willd. Spec. III. 2283. Reichenb. Iconogr. t. 376. DC. Prodr. VI. 573. *Centaurea phrygia* Jacq. Enum. Vind. 167. non Linn. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Austriae, Hungariae et Italiae.*

2884. **Centaurea phrygia** Linn. Spec. 1287. Flor. dan. t. 520. Reichenb. Iconogr. t. 375. DC. Prodr. VI. 573. *Lepteranthus hygrometricus* Cassini in Dict. sc. nat. XXVI. 65. — ♃ — *Habitat in pratis montanis et subalpinis Europae mediae.*

β. *Incoronata* DC. l. c. *Centaurea nervosa* Willdenow Enum. 926.

2885. **Centaurea uniflora** Linn. Mant. 118. Reichenb. Iconogr. t. 374. DC. Prodr. VI. 573. — ♃ — *Habitat in alpibus Helvetiae, Delphinatus et Pedemontii..*

10. Stizolophus Cass.

2886. **Centaurea Balsamita** Lam. Dict. I. 667. DC. Prodr. VI. 574. *Stizolophus balsamitaefolius* Cassini in Dict. sc. nat. LI. 50. — ♃ — *Habitat in lapidosis Armeniae et Cappadociae.*

2887. **Centaurea coronopifolia** Lam. Dict. I. 667. DC. Prodr. VI. 574. *Stizolophus coronopifolius* Cassini in Dict. sc. nat. LI. 51. —⊙— *Habitat in Iberia.*

11. Plectocephalus Don.

2888. **Centaurea americana** Nuttall in Journ. Academ. Philadelph. 1821. p. 117. Colla Hort.

ripul. I. 119. t. 6. DC. Prodr. VI. 575. *Centaurea Nuttallii* Sprengel Syst. Cur. post. 298. *Plectocephalus americanus* D. Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 51. —♃— *Habitat in Americae borealis ditione Arkansas, locis graminosis inundatis.*

12. Psephellus Cass.

2889. **Centaurea dealbata** Willd. Spec. III. 2295. DC. Prodr. VI. 576. *Psephellus calocephalus* Cassini Dict. sc. nat. XLIII. 488. — ♃ — *Habitat in pratis sylvaticis Caucasi et Persiae.*

13. Cheirolophus Cass.

2890. **Centaurea sempervirens** Linn. Spec. 1291. DC. Prodr. VI. 577. *Cheirolophus lanceolatus* Cassini Dict. sc. nat. LI. 56. — ♄ — *Habitat in montibus calcareis Lusitaniae, Galloprovinciae et regni Neapolitani.*

C. Cyaneae.

14. Melanoloma Cass.

2891. **Centaurea pullata** Linn. Spec. 1288. Miller Ic. t. 152. f. 2. Reichenb. Iconogr. t. 373. DC. Prodr. VI. 577. *Melanoloma pullata* Cassini in Dict. sc. nat. XXIX. 473. — ♃ — *Habitat in arvis apricis regionis mediterraneae.*

15. Cyanus DC.

2892. **Centaurea Cyanus** Linn. Spec. 1289. DC. Prodr. VI. 578. —⊙— *Habitat inter segetes Europae totius.*

β. *Versicolor.*

2893. **Centaurea depressa** Bieberst. Flor. Taur. cauc. n. 1803. DC. Prodr. VI. 578. —⊙— *Habitat in collibus siccis Iberiae et Persiae.*

2894. **Centaurea montana** Linn. Spec. 1286. DC. Prodr. VI. 578. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Europae totius et Orientis.*

α Cyanea. aa. *C. montana* Jacq. Flor. austr. t. 371. bb. *C. axillaris* Willd. Spec. III. 2290. cc. *C. stricta* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 178. dd. *C. carniolica* Host Flor. austr. II. 517.

β. Purpurascens. Centaurea Fischeri Willd. Suppl. 61.

γ. Albida. Centaurea ochroleuca Willd. Spec. III. 2289. *C. leucantha* Web. et Mohr Cat. 1. 74.

δ. Citrina. Centaurea cheiranthifolia Willd. phytogr. Bl. t. 7. f. 2. *C. ochroleuca* Sims Bot. Mag. t. 1176.

16. Lopholoma Cass.

2895. **Centaurea cineraria** Linn. Spec. 1290. excl. β. DC. Prodr. VI. 580. — ♃ — *Habitat in rupibus maritimis Italiae australis.*

2896. **Centaurea cinerea** Lam. Dict. I. 669. Reichenb. Iconogr. t. 965. DC. Prodr. VI. 580. *Centaurea cineraria* β. Linn. Spec. 1290. *Centaurea cineraria* Jacq. Hort. Vindob. I. 92. — ♃ — *Habitat in collibus aridis Italiae.*

2897. **Centaurea scabiosa** Linn. Spec. 1291. E. B. t. 56. Flor. dan. t. 1231. DC. Prodr. VI. 580. — ♃ — *Habitat in Europae mediae et australis pratis et ruderatis.*

β. Coriaceae. Centaurea coriaceae Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 195.

γ. Alba.

2898. **Centaurea stereophylla** Besser Enum. pod. 35. Reichenb. Iconogr. t. 444. DC. Prodr. VI. 580. — ♃ — *Habitat in Podolia australi et circa Odessam.*

17. Acrolophus Cass.

2899. **Centaurea karschtiana** Scopoli Carn. ed. 2. II. 140. t. 55. Reichenb. Iconogr. t. 811. DC. Prodr. VI. 582. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Carnioliae.*

2900. **Centaurea dissecta** Tenore Prodr. 61. DC. Prodr. VI. 582. — ♃ — *Habitat in montanis saxosis Neapolis et Siciliae.*

2901. **Centaurea argentea** Linn. Spec.

1290. DC. Prodr. VI. 582. — ♃ — *Habitat in Cretae montibus sphakioticis.*

2902. **Centaurea Reichenbachii** DC. Prodr. VI. 583. *Centaurea arenaria* Reichenb. Iconogr. t. 443. non Bieberst. — ♃ — *Patria ignota.*

2903. **Centaurea paniculata** Linn. Spec. 1289. DC. Prodr. VI. 583. — ⊙ — *Habitat in collibus Europae australioris frequens.*

β. *Alba.*

2904. **Centaurea ovina** Pallas in Willd. Spec. III. 2292. DC. Prodr. VI. 585. — ♃ — *Habitat in Iberia.*

2905. **Centaurea parviflora** Desfont. Flor. atl. II. 301. DC. Prodr. VI. 585. — ♃ — *Habitat in Barbaria et Persia.*

18. Acrocentron Cass.

2906. **Centaurea orientalis** Linn. Spec. 1291. DC. Prodr. VI. 587. — ♃ — *Habitat in Tauria et Sibiria.*

β. *Tatarica. Centaurea tatarica* Linn. f. Suppl. 383. Reichenb. Iconogr. t. 445.

2907. **Centaurea calocephala** Willdenow Enum. 928. Reichenb. Iconogr. t. 446. — ♃ — *Habitat in rupibus Europae orientalis.*

2908. **Centaurea atropurpurea** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. II. 121. t. 116. Willd. Spec. III. 2299. Reichenb. Iconogr. t. 447. — ♃ — *Crescit in Banatu.*

2909. **Centaurea rupestris** Linn. Spec. 1298. DC. Prodr. VI. 588. — ♃ — *Habitat in rupibus Europae australis.*

2910. **Centaurea collina** Linn. Spec. 1298. DC. Prodr. VI. 588. — ♃ — *Habitat in apricis Europae mediterraneae et Orientis.*

2911. **Centaurea latisquama** DC. Prodr. VI. 589. — ♃ — *Habitat in Europa austro-orientali.*

β *Salonitana. Centaurea salonitana* Visiani in Flora 1829. p. 23.

2912. **Centaurea reflexa** Lam. Dict. I. 675. DC. Prodr. VI. 589. — ♃ — *Habitat in graminosis siccis Caucasi orientalis et Armeniae.*

2913. **Centaurea pubescens** Willd. Spec. III. 2322. DC. Prodr. VI. 589. — ♃ — *Habitat in Barbaria.*

2914. **Centaurea ragusina** Linn. Spec. 1290. Bot. Mag. t. 494. DC. Prodr. VI. 589. — ♃ — *Habitat in Dalmatia.*

2915. **Centaurea sordida** Willd. Spec. III. 2323. DC. Prodr. VI. 591. — ♃ — *Patria ignota.*

19. Crocodylium Cass.

2916. **Centaurea Crocodylium** Linn. Spec. 1299. DC. Prodr VI. 591. *Crocodylium syriacum* Cassini in Dict. sc. nat. XII. 19. — ☉ — *Habitat in Syria et Creta.*

D. Calcitrapae.

20. Mesocentron DC.

2917. **Centaurea eriophora** Linn. Spec. 1296. DC. Prodr. VI. 592. — ☉ — *Habitat in Lusitania.*

2918. **Centaurea melitensis** Linn. Spec. 1297. DC. Prodr. VI. 593. *Triplocentron melitense* Cassini in Dict. sc. nat. LV. 369. — ☉ — *Habitat in regione mediterranea, California, America australi extratropica et Capite bonae spei.*

2919. **Centaurea sicula** Linn. Spec. 1298. DC. Prodr. VI. 593. — ☉ — *Habitat in Sicilia.*

2920. **Centaurea solstitialis** Linn. Spec. 1297. E. B. t. 243. DC. Prodr VI. 594. — ☉ — *Habitat in apricis sterilibus Europae orientalis et australis.*

22. Calcitrapa Cass.

2921. **Centaurea Calcitrapa** Linn. Spec. 1297. E. B. t. 125. DC. Prodr. VI. 597. *Calcitrapa stellata* Cassini Dict. sc. nat. VIII. 250. — ☉ — *Ha-*

bitat juxta vias et in versuris Europae australioris et Tauriae.

2922. **Centaurea calcitrapoides** Linn. Amoen. Academ. IV. 291. DC. Prodr. VI. 597. —⊙— *Habitat in apricis Aegypti, Tauriae et Caucasi.*

2923. **Centaurea iberica** Treviranus ex Sprengel Syst. III. 406. DC. Prodr. VI. 597. —⊙— *Habitat in campis et collibus Iberiae, Armeniae et Caucasi.*

E. Seridieae.

23. Philostizus Cass.

2924. **Centaurea ferox** Desfont. Flor. atlant. II. 297. t. 242. DC. Prodr. VI. 598. *Philostizus Fontanesianus* Cassini in Dict. sc. nat. XXXIX. 498. — ♃ — *Habitat in Barbaria.*

24. Seridia Cass.

2925. **Centaurea Seridis** Linn Spec. 1294. DC. Prodr. VI. 599. — ♃ — *Habitat in Hispania.*

2926. **Centaurea sonchifolia** Linn. Spec. 1294. DC. Prodr. VI. 599. *Centaurea auriculata* Balbis in Persoon Encheir. II. 91. — ♃ — *Habitat in littoribus Italiae.*

2927. **Centaurea sphaerocephala** Linn. Spec. 1295. Sims Bot. Mag. t. 2551. DC. Prodr. VI. 599. *Centaurea cespitosa* Vahl Symb. II. 93. — ♃ — *Habitat in arenosis maritimis Italiae et Hispaniae.*

β. *Romana. Centaurea romana* Linn. Spec. 1295. — γ. *Zanonii. Centaurea Zanonii* Sebast. et Mauri Flor. Rom. 298. in not.

2928. **Centaurea aspera** Linn. Spec. 1296. DC. Prodr. VI. 599. *Centaurea parviflora* Lam. Fl. fr. XLVIII. 32. *Seridia microcephala* Cassini in Dict. sc. nat. XLVIII. 499. — ♃ — *Habitat in Gallia australi.*

25. Pectinastrum.

2929. **Centaurea napifolia** Linn. Spec. 1295. DC. Prodr. VI. 600. *Pectinastrum napifolium* Cas-

sini in Dict. sc. nat. XLIV. 38. XLVIII. 500. —⊙— *Habitat in sterilibus regionis mediterraneae.*

26. Species dubiae.

2930. **Centaurea saxicola** Lagasca Nov. gen. et sp. 32. DC Prodr. VI. 604. —♃— *Habitat in rupibus calcareis Hispaniae australis.*

2931. **Centaurea neglecta** Willd. Enum. Suppl. 61. —♃— *Patria?*

2872. Cnicus Vaill.

2932. **Cnicus benedictus** Linn. Spec. ed. 1. p. 826. Gärtner Carp. II. t. 162. DC. Prodr. VI. 606. *Centaurea benedicta* Linn. Spec. ed. 2. p. 1296. *Carduus benedictus* Camerar. Epitom. 566. c. ic. *Carbeni* Adanson Fam. II. 116. —⊙— *Habitat in lapidosis et cultis Graeciae, Orientis et Tauriae.*

Subtribus VII. Carthameae.

2874. Kentrophyllum Neck.

2933. **Kentrophyllum lanatum** DC. et Duby Bot. Gallic. I. 293. DC. Prodr. VI. 610. *Carthamus lanatus* Linn. Spec. 1163. *Heracantha lanata* Link Enum. II. 304. *Atractylis lanata* Scopoli Flor. carn. n. 1016. *Hohenwartha gymnogyna* Vest in Flora 1820. p. 1. —⊙— *Habitat in sterilibus regionis mediterraneae.*

2934. **Kentrophyllum tauricum** Fischer et C. A. Meyer msc. DC. Prodr. VI. 610. *Carthamus creticus* Linn. Spec. 1163. excl. synon. *Carthamus tauricus* Bieberst. Flor. taur. cauc. n. 1679. *Centaurea cretica* Sprengel Syst. III. 408. —⊙— *Habitat in Tauria, vix in Creta indigena.*

2875. Carthamus Tournef.

2935. **Carthamus tinctorius** Linn. Spec. 1162. Lam. Illustr. t. 661. DC. Prodr. VI. 612. —⊙—

Habitat in India orientali, in Europa australiore cultus et eferatus.

2877. **Carduncellus** Adans.

2936. **Carduncellus pinnatus** DC. Prodr. VI. 614. *Onobroma pinnatum* Spreng. Syst. III. 393. *Carthamus pinnatus* Desfont. Flor. atlant. II. 258. t. 229. — ♃ — *Habitat in Barbaria et Sicilia.*

2937. **Carduncellus caeruleus** DC. Prodr. VI. 615. *Onobroma caeruleum* Spreng. Syst. III. 392. *Carthamus caeruleus* Linn. Spec. ed. 1. p. 830. — ♃ — *Habitat inter segetes, et in incultis regionis mediterraneae.*

α. Dentatus. Carthamus caeruleus Linn. Spec. ed. 2. p 1163. Bot. Mag. t. 2293.

β. Incisus. Carthamus tingitanus Linn. Spec. ed. 2. p. 1163. Cavanill. Ic. t. 128. — ? *Centaurea tingitana* Linn. Spec. ed. 2. p. 1300.

Subtribus VIII. Silybeae.

2878. **Silybum** Vaill.

2938. **Silybum marianum** Gärtner Carp. II. 378. t. 168. f. 2. DC. Prodr. VI. 616. *Carduus marianus* Linn. Spec. 1153. E. B. t. 976. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Europae australis, Asiae occidentalis et Indiae orientalis.*

2879. **Galactites** Mönch.

2939. **Galactites tomentosa** Mönch Method. DC. Prodr. VI. 616. *Centaurea Galactites* Linn. Spec. 1300. — ⊙ — *Habitat in apricis sterilibus regionis mediterraneae.*

Subtribus IX. Carduineae.

2881. **Onopordon** Linn.

2940. **Onopordon Acanthium** Linn. Spec.

1158. E. B. t. 977. Flor. dan. t. 909. DC. Prodr. VI. 618. — ☉ — *Habitat in ruderatis Europae totius.*

β. *Platyphyllum.*

2941 **Onopordon virens** DC. Fl. fr. Suppl. 456. Prodr. VI. 618. *Onopordon elatum* Smith et Sibthorp Prodr. II. 156. — ☉ — *Habitat in ruderatis Europae australis.*

β. *Onopordon tauricum* Willd. Spec. III. 1687.

2942. **Onopordon illyricum** Linn. Spec. 1158. Jacq. Hort. Vindob. t. 148. — ☉ — *Habitat in ruderatis Illyrici.*

2943. **Onopordon macracanthum** Schultes Obser. 179. — ☉ — *Habitat in Galicia.*

2944. **Onopordon heteracanthum** C. A. Meyer Verzeichn. cauc. Pflanz. 564. DC. Prodr. VI. 618. — ☉ — *Habitat in montibus Talüsch.*

2945. **Onopordon graecum** Gouan Illustr. 64. t. 25. DC. Prodr. VI. 619. — ☉ — *Habitat in Laconia et Cypro.*

2946. **Onopordon arabicum** Linn. Spec. 1159. Jacq. Hort. Vindob. t. 149. Hooker Bot. Mag. t. 3299. DC. Prodr. VI. 619. — ☉ — *Habitat in Arabia, Graecia et circa Monspelium.*

2947. **Onopordon acaule** Linn. Spec. 1159. Jacq. Miscell. II. 310. Ic. rar. t. 167. DC. Prodr. VI. 619. — ☉ — *Patria ignota.*

2882. Cynara Vaill.

2948. **Cynara Scolymus** Linn. Spec. 1159. DC. Prodr. VI. 620. — ♃ — *Patria ignota. Colitur in hortis ob receptacula carnosa, edulia, gallice » Artichaud « dicta.*

2949. **Cynara Cardunculus** Linn. Spec. 1159. Bot. Mag. t. 3241. DC. Prodr. VI. 620. — ☉ — *Habitat in Europa australi.*

Planta in Angliae et Galliae hortis, plurimis varietatibus sub nomine » Cardoon « et » Cardon « culta, ob petiolos et foliorum costas lucis privatione albas et edules.

2950. **Cynara horrida** Aiton Hort. kew. I.

148. DC. Prodr. VI. 620. —♃— *Habitat in Madera.*

2951. **Cynara spinosissima** Presl Delic. Prag. 109. .DC. Prodr. VI. 621. —♃— *Habitat in arvis Siciliae et Graeciae.*

2884. Carduus Gärtn.

2952. **Carduus platylepis** Sauter in Flora 1830. p. 410. DC. Prodr. VI. 622. —⊙— *Habitat in agris convallium alpinarum Tyrolis.*

2953. **Carduus acanthoides** Linn. Spec. 1150. Jacq. Flor. austr. t. 249. E. B. t. 973. DC. Prodr. VI. 623. —⊙— *Habitat in ruderatis Europae totius et Tauriae.*

2954. **Carduus seminudus** Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. n. 1650. DC. Prodr. VI. 623. —⊙— *Habitat in ruderatis Tauriae et Caucasi.*

2955. **Carduus candicans** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. t. 83. Baumgart. Flor. Transylv. III. 56. DC. Prodr. VI. 624. —⊙— *Habitat in rupestribus calcareis Hungariae et Transylvaniae.*

2956. **Carduus collinus** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. III. 257. t. 232. DC. Prodr. VI. 624. —⊙— *Habitat in collibus, imprimis vitiferis, Hungariae.*

2957. **Carduus tenuiflorus** Smith E. B. n. 412. DC. Prodr. VI. 626. —⊙— *Habitat in ruderatis Europae totius, imprimis australis, a Madera ad Persiam.*

α. Acanthifolius DC. *Carduus tenuiflorus* Curtis Flor. Lond. VI. t. 55. E. B. t. 412.

γ. Pycnocephalus DC. *Carduus pycnocephalus* Jacq. Hort. Vindob. t. 44. *Carduus microcephalus* Gaudin Flor. Helv. V. 168.

2958. **Carduus arabicus** Jacq. Collect. I. 56. Ic. rar. I t. 166. DC. Prodr. VI. 626. —⊙— *Habitat in humidiusculis Arabiae, Syriae et Siciliae.*

2959. **Carduus Personata** Jacq. Flor. austr. t. 348. DC. Prodr. VI. 629. *Arctium Personata* Linn.

Spec. 1144. — ⊙ — *Habitat in subalpinis Europae mediae et australis.*

2887. **Cirsium** Tournef.

a. Lophiolepis *Cass.*

2960. **Cirsium ciliatum** Bieberst. Suppl. 556. DC. Prodr. VI. 635. *Carduus ciliatus* Murray Comment. Götting. 1784. p. 35. t. 5. *Cnicus ciliatus* Willd. Spec. III. 1667. Schkuhr Handb. t. 229. *Cnicus discolor* Hortor. — ♃ — *Habitat in Tauria, Caucaso et Sibiria.*

b. Eriolepis Cass.

2961. **Cirsium lanceolatum** Scopoli Flor. carn. ed. 2. n. 1007. DC. Prodr. VI. 636. *Carduus lanceolatus* Linn. Spec. 1149. Flor. dan. t. 1173. E. B. t. 107. *Cnicus lanceolatus* Hoffm. Flor. germ. IV. 127. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Europae totius.*

2962. **Cirsium giganteum** Spreng. Syst. III. 375. DC. Prodr. VI. 637. *Carduus giganteus* Desfont. Flor. atlant. II. 25. t. 221. *Cnicus giganteus* Willdenow Spec. III. 1671. — ⊙ — *Habitat in Calabria, Sicilia, Algeria.*

2963. **Cirsium lappaceum** Bieberst. Suppl. 558. DC. Prodr. VI. 637. *Carduus lappaceus* Bieberst. Casp. 193. *Cnicus lappaceus* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 277. — ⊙ — *Habitat in herbidis montosis Caucasi.*

2964. **Cirsium horridum** Bieberst. Suppl. 557. DC. Prodr. VI. 638. — ⊙ — *Habitat in Russia meridionali.*

2965. **Cirsium serrulatum** Bieberst. Suppl. 557. DC. Prodr. VI. 638. *Cnicus serrulatus* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 277. — ⊙ — *Habitat in Russia meridionali.*

2966. **Cirsium laniflorum** Bieberst. Suppl. 557. DC. Prodr. VI. 638. *Cnicus laniflorus* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 277. — ⊙ — *Habitat in Tauriae meridionalis collibus lapidosis.*

c. **Orthocentrum** Cass.

2967. **Cirsium polyanthemum** DC. Prodr. VI. 641. *Carduus polyanthemus* Linn. Mant. 109. *Cnicus pungens* Sebastiani Plant. Rom. fasc. I. 9. t. 2. *Cirsium polyanthemum* et *Cirsium pungens* Sprengel Syst. III. 370. 371. —⊙— *Habitat in ruderatis paludosis Italiae.*

d. **Onotrophe** Cass.

2968. **Cirsium uliginosum** Bieberst. Suppl. n. 1656. DC. Prodr. VI. 644. *Cnicus uliginosus* Bieberst. Flor. Taur. cauc. n. 1656. —♃— *Habitat juxta rivulos Caucasi.*

2969. **Cirsium canum** Bieberst. Suppl. n. 1657. DC. Prodr. VI. 644. *Carduus canus* Linn. Mant. 105. Jacq. Flor. austr. t. 42. 43. *Cnicus canus* Willdenow Spec. III. 1664. —♃— *Habitat in pratis Austriae et Tauriae.*

2970. **Cirsium pannonicum** DC. Prodr. VI. 645. *Cnicus pannonicus* Host Flor. austr. II. 444. *Carduus serratuloides* Jacq. Flor. austr. t. 127. non Linn. —♃— *Habitat in pratis montanis Austriae, Carinthiae et Hungariae.*

2971. **Cirsium oleraceum** Allioni Flor. Pedemont. n. 544. *Cnicus oleraceus* Linn. Spec. 1156. *Carduus oleraceus* Villars Delph. III. 21. —♃— *Habitat in pratis paludosis nemorosis Europae mediae et borealis nec non Sibiriae.*

2972. **Cirsium spinosissimum** Scopoli Flor. carn. ed. 2. n. 1006. DC. Prodr. VI. 648. *Cnicus spinosissimus* Linn. Spec. 1157. —♃— *Habitat in pratis alpinis Europae.*

2973. **Cirsium tricephalodes** DC. Fl. fr. 3084. DC. Prodr. VI. 649. *Carduus tricephalodes* Lam. Dict. I. 704. *Cirsium rivulare* Allioni Flor. Pedemont. t. 35. —♃— *Habitat in pratis humidis alpium Europae.*

2974. **Cirsium montanum** Spreng. Syst. VII. 376. DC. Prodr. VI. 650. *Cnicus montanus* Waldst. et Kitaib. in Willd. Spec. III. 1676. *Carduus montanus*

Persoon Encheir. II. 388. — ♃ — *Habitat in montibus siccis Croatiae.*

2975. **Cirsium bulbosum** DC. Fl. fr. Suppl. n. 3187. Prodr. VI. 650. *Carduus bulbosus* Lam. Dict. I. 705. *Carduus tuberosus* Villars Delph. III. 16. *Cirsium tuberosum* Allioni Flor. Pedem. n. 551. — ♃ — *Habitat in pratis herbidis Galliae, Pedemontii, Angliae.*

2976. **Cirsium obvallatum** Bieberst. Suppl. 559. DC. Prodr. VI. 651. *Cnicus obvallatus* Bieberst. Flor. Taur. cauc. n. 1668. — ☉ — *Habitat in subalpinis herbidis Caucasi.*

2977. **Cirsium acaule** Allioni Flor. Pedemont. n. 558. DC. Prodr. VI. 652. *Carduus acaulis* Linn. Spec. 1156. E. B. t. 161. *Cnicus acaulis* Hoffm. Flor. germ. IV. 130. — ♃ — *Habitat in pratis montanis siccis Europae totius et Sibiriae.*

β. *Gmelini* C. A. Mey. *Cirsium Gmelini* Sprengel Hist. rei herb. (Gmelin Sibir. II. 44. n. 30. t. 25.)

2978. **Cirsium dealbatum** Bieberst. Suppl. 560. DC. Prodr. VI. 653. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

2979. **Cirsium heterophyllum** Allioni Flor. Pedemont. n. 554. t. 34. DC. Prodr. VI. 653. *Carduus heterophyllus* Linn. Spec. 1134. *Cnicus heterophyllus* Willdenow Spec. III. 1673. — ♃ — *Habitat in pratis montosis Europae et Sibiriae.*

2888. **Erythrolaena** Sweet.

2980. **Erythrolaena conspicua** Sweet Fl. Gard. II. t. 134. Hooker Bot. Mag. t. 2909. DC. Prodr. VI. 657. *Carduus polychroos* Lessing in Linnaea V. 130. — ☉ — *Habitat in Mexico.*

2889. **Chamaepeuce** Alpin.

a. **Lamyra** Cass.

2981. **Chamaepeuce stellata** DC. Prodr. VI. 658. *Carduus stellatus* Linn. Spec. 1153. *Cirsium stellatum* Allioni Flor. Pedemont. n. 560. *Cnicus stellatus* Willd. Spec. III. 1682. *Lamyra stipulacea* Cassini

in Dict. sc. nat. XXV. 222. —⊙— *Habitat in arvis Italiae.*

2982. **Chamaepeuce Casabonae** DC. Prodr. VI. 658. *Carduus Casabonae* Linn. Spec. 1153. *Cnicus Casabonae* Willd. Spec. III. 1682. *Lamyra triacantha* Cassini Dict. sc. nat. XXV. 220. *Polyacanthus Casabonae* J. Bauhin Hist. III. 92. f. 2. —⊙— *Habitat in sterilibus insulae Ilvae et circa Olbiam.*

b. **Platyramphium** Cass.

2983. **Chamaepeuce diacantha** DC. Prodr. VI. 659. *Carduus diacantha* Labillard. Syr. Dec. II. 7. t. 3. *Cirsium diacantha* DC. Catalog. Hort. Monsp. 96. —⊙— *Habitat in monte Libano.*

2890. **Notobasis** Cass.

2984. **Notobasis syriaca** Cassini in Dict. sc. nat. XXV. 225. XXXV. 170. DC. Prodr. VI. 660. *Carduus syriacus* Linn. Spec. 1153. *Cirsium syriacum* Gärtner Carp. II. 383. t. 163. *Cnicus syriacus* Willdenow Spec. III. 1683. Schkuhr Handb. t. 229. —⊙— *Habitat in arvis regionis mediterraneae.*

2892. **Lappa** Tournef.

2985. **Lappa tomentosa** Lam. Dict. I. 377. DC. Prodr. VI. 661. *Arctium tomentosum* Schkuhr Handb. t. 227. *Arctium Lappa* β. Linn. Spec. 1243. *Arctium Bardana* Willdenow Spec. III. 1632. —⊙— *Habitat in ruderatis Europae.*

2986. **Lappa major** Gärtner Carp. II. 379. t. 162. DC. Prodr. VI. 661. *Lappa glabra* β. Lam. Dict. I. 377. Ill. t. 665. *Arctium Lappa* α. Linn. Spec. 1143. *Arctium majus* Schkuhr Handb. t. 227. *Arctium Lappa* Willdenow Spec. III. 1631. —⊙— *Habitat in ruderatis Europae totius et in India orientali.*

2987. **Lappa minor** DC. Fl. fr. ed. 3. n. 3010. Prodr. VI. 661. *Lappa glabra* α. Lam. Dict. I. 377. *Arctium minus* Schkuhr Handb. t. 227. *Arctium Lappa*

Sowerby. E. B. t. 1228.. — ⊙ — *Habitat in Europae et Asiae ruderatis, dumetis et sepibus.*

Subtribus X. Serratuleae.

2893. **Acroptilion** Cass.

2988. **Acroptilion Picris** DC. Prodr. VI. 662. *Centaurea Picris* Pallas in Willd. Spec. III. 2302. *Serratula Picris* Bieberst. Suppl. 546. — ♃ — *Habitat in ruderatis et cultis Tauriae, in Caucaso et montibus Uralensibus.*

2894. **Rhaponticum** DC.

a. **Stemmacantha** Less.

2989. **Rhaponticum atriplicifolium** DC. Prodr. VI. 663. *Carduus atriplicifolius* Treviranus N. A. N. C. XIII. 198. Reichenb. Hort. Bot. t. 18. *Silybum atriplicifolium* Fischer Index Hort. Petrop. 1824. *Stemmacantha atriplicifolia* Hort. — ♃ — *Habitat in sylvis Dahuriae.*

2990. **Rhaponticum cynaroides** Lessing Synops. 6. *Cnicus centauroides* Linn. Spec. 1157. *Cnicus inermis* Willd. Spec. III. 1672. *Cnicus Cynara* Lam. Fl. fr. II. 14. *Serratula cynaroides* DC. Fl. fr. ed. 3. n. 3030. *Stemmacantha cynaroides* Cassini Dict. sc. nat. L. 460. — ♃ — *Habitat in pratis asperis Pyrenaeorum centralium.*

b. **Eurhaponticum** DC.

2991. **Rhaponticum pulchrum** Fisch. et Mey. Index Sem. Hort. Petrop. 1835. p. 36. DC. Prodr. VI. 664. — ♃ — *Habitat in montibus Talüsch.*

2895. **Leuzea** DC.

a. **Rhacoma** DC.

2992. **Leuzea conifera** DC. Mem. comp. 22. t. 10. Prodr. VI. 665. *Centaurea conifera* Linn. Spec.

1294. Miller Ic. t. 153. —⊙— *Habitat in apricis sterilibus petrosis Europae australis.*

b. **Fornicium** Cass.

2993. **Leuzea carthamoides** DC. Mem. comp. 49. Prodr. VI. 666. *Cnicus carthamoides* Willd. Spec. III. 1686. *Cirsium carthamoides* Link Enum. II. 302. *Halocharis carthamoides* Bieberst. msc. —♃— *Habitat in Sibiria.*

2896. Alfredia Cass.

2994. **Alfredia cernua** Cassini in Dict. sc. nat. I. Suppl. 115. Reichenb. Iconogr. t. 448. DC. Prodr. VI. 666. *Cnicus cernuus* Linn. Spec. 1157. *Silybum cernuum* Gärtner II. 378. —♃— *Habitat in campis Sibiriae.*

2897. Serratula DC.

a. **Sarreta** DC.

2995. **Serratula tinctoria** Linn. Spec. 1144. E. B. t. 38. Flor. dan. t. 281. Schkuhr t. 234. DC. Prodr. VI. 667. —♃— *Habitat in pratis et sepibus Europae totius.*

b. **Mastrucium** Cass.

2996. **Serratula coronata** Linn. Spec. 1144. DC. Prodr. VI. 667. *Mastrucium coronatum* Cassini in Dict. sc. nat. XLI. 323. —♃— *Habitat in Sibiria.*

c. **Klasea** Cass.

2997. **Serratula quinquefolia** Bieberst. Flor. Taur. cauc. n. 1136. Sims Bot. Mag. t. 1871. DC. Prodr. VI. 668. *Klasea quinquefolia* Cassini in Dict. sc. nat. XLI. 321. —♃— *Habitat in nemoribus Caucasi et Persiae borealis.*

2998. **Serratula centauroides** Linn. Spec. 1144. DC. Prodr. VI. 668. —♃— *Habitat in Sibiria transbaicalensi.*

2999. **Serratula radiata** Bieberst. Suppl. 544. DC. Prodr VI. 668. *Carduus radiatus* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 9. t 11. — ♃ — *Habitat in montibus calcareis Hungariae, Volhyniae et Caucasi.*

3000. **Serratula nitida** Fischer msc. Sprengel Syst. III. 390. DC. Prodr. VI. 660. — ♃ — *Habitat circa Sareptam.*

3001. **Serratula heterophylla** Desfont. Catalog. Hort. Paris. 1804. p. 93. DC Prodr. VI. 669 *Carduus lycopifolius* Villars Delphin. III. 23. t. 19. *Klasea heterophylla* Cassini in Dict. sc nat. XLI. 323. — ♃ — *Habitat in montibus Delphinatus.*

2898. **Jurinea** Cass.

3002. **Jurinea alata** Cassini in Dict. sc. nat. XXIV. 288. DC. Prodr. VI. 675. *Serratula alata* Desfont. Catalog Hort. Paris. ed. 2. p. 108. Willd. Suppl. 56. *Carduus alatus* Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 103. — ⊙ — *Habitat in promontorio Caucasico occidentali.*

3003. **Jurinea spectabilis** Fischer et Meyer et DC. Prodr. VI. 678. — ♃ — *Habitat in Somchetia.*

Subordo II. Labiatiflorae.

2917. **Mutisia** Linn. f.

3004. **Mutisia speciosa** Hooker Bot. Mag. t. 2705. DC. Prodr. VII. 5. — ♃ ϧ — *Habitat in Brasilia.*

3005. **Mutisia latifolia** Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 288. DC. Prodr. VII. 7. — ♃ — *Habitat in Chili.*

2933. **Anandria** Siegesb.

3006. **Anandria Bellidiastrum** DC. Prodr. VII. 40. *Tussilago Anandria* Linn. Spec. 1213. *Perdicium Anandria* R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 84. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

2955. **Moscharia** Ruiz et Pav.

3007. **Moscharia pinnatifida** Ruiz et Pavon Syst. I. 136. Lindley in Bot. Reg. t 1564. DC. Prodr. VII. 72. *Moscaria pinnatifida* Persoon Encheir. II. 379. *Mosigia pinnatifida* Sprengel Syst. III. 661. *Gastrocarpha runcinata* Don in Sweet Fl. Gard. t. 220. — ⊙ — *Habitat in collibus herbidis sylvaticis Chili.*

Subordo III. Liguliflorae.

2965. **Scolymus** Tourn.

3008. **Scolymus maculatus** Linn. Spec. 1142. Lam. t. 659. DC. Prodr. VII. 75. — ⊙ — *Habitat ad margines agrorum per totam regionem mediterraneam.*

2966. **Myscolus** Cass.

3009. **Myscolus hispanicus.** *Myscolus microcephalus* Cassini in Dict. sc. nat. XXIV. 85. *Scolymus hispanicus* Linn. Spec. 1143. DC. Prodr. VII. 76. — ♃ — *Habitat in Tauria, regione mediterranea, Canariis et Madera.*

2967. **Lampsana** Tournef.

3010. **Lampsana communis** Linn. Spec. 1141. Schkuhr t. 225. Flor. dan. t. 500. E. B. t. 844. — ⊙ — *Habitat in cultis et ruderatis Europae totius.*

β *Crispa. Lampsana crispa* Willd. Spec. III. 1623.

3011. **Lampsana grandiflora** Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 50. DC. Prodr. VII. 77. *Lampsana lyrata* Willd. Enum. 832. — ⊙ — *Habitat in Tauria et Caucaso.*

3012. **Lampsana virgata** Desfont. Flor. atlant. II. 235 t 215. DC Prodr. VII. 77. — ♃ — *Habitat in Barbaria prope La-Calle.*

2970. **Rhagadiolus** Tournef.

3013. **Rhagadiolus stellatus** Willd. Spec. III. 1625. Schkuhr t. 225 DC. Prodr. VII. 77. *Lapsana stellata* Linn. Hort Upsal. 245. —⊙— *Habitat in cultis Europae australis, a Lusitania ad Orientem.*

γ. Edulis. Rhagadiolus edulis Gärtner Carp. II. 354. t. 157. *Lapsana Rhagadiolus* Linn. Hort. Upsal. 246.

2973. **Hedypnois** Tournef.

3014. **Hedypnois rhagadioloides** Willd. Spec. III. 1616. *Hyoseris rhagadioloides* Linn. Spec. 1139. —⊙— *Habitat in agris et arvis regionis mediterraneae.*

2974. **Hyoseris** Juss.

a. Euhyoseris.

3015. **Hyoseris scabra** Linn. Spec. 1138. non Mönch. *Hyoseris adspersa* Mönch Meth. 541 *Hyoseris microcephala* Cassini in Dict. sc. nat. XXII. 338. DC. Prodr. VII. 79. *Hedypnois scabra* Lessing Synops. 128. —⊙— *Habitat in cultis regionis mediterraneae.*

b. Astroseris.

3016. **Hyoseris radiata** Linn. Spec. 1137. DC. Prodr. VII. 79. *Leontodon radiatum* Lam. Fl. fr. II. 114. *Rhagadiolus stellatus* Allioni Flor. Pedemont. n. 835. *Hedypnois radiata* Gärtner II. 373. t. 160. —♃— *Habitat in arvis regionis mediterraneae.*

2975. **Aposeris** Neck.

3017. **Aposeris lucida** Lessing Synops. 128. *Aposeris foetida* Cassini in Dict. sc. nat. XLVIII. 427. excl. synon. *Hyoseris lucida* Linn. Mant. 103. Jacq. Hort. Vindob. t. 150. DC. Prodr. VII. 80. —♃— *Habitat in Graecia, Aegypto et Sicilia.*

2976. **Catananche** Vaill.

3018. **Catananche caerulea** Linn. Spec. 1142. Schkuhr Handb. t. 226. Lam. t. 658. f. 1. DC. Prodr. VII. 83. — ⊙ — *Habitat in collibus saxosis Galliae mediterraneae, Hispaniae et Barbariae.*

3019. **Catananche lutea** Linn. Spec. 1142. Schkuhr Handb. t. 226. Lam. t. 658. f 2. DC. Prodr. VII. 83. — ⊙ — *Habitat in arvis regionis mediterraneae, imprimis orientalis.*

2978. **Cichorium** Tournef.

3020. **Cichorium Intybus** Linn. Spec. 1142. E. B. t. 538. Hayne Arzneigew. II. t. 24. DC. Prodr. VII. 84. — ♃ — *Habitat ad margines viarum et agrorum Europae totius.*

3021. **Cichorium Endivia** Linn. Spec. 1142. DC. Prodr. VII. 84. — ⊙ — *Colitur passim in hortis.* Variat foliis integris, laceris et crispis, in acetariis deliciosa.

3022. **Cichorium pumilum** Jacq. Observ. IV. 3. t. 80. DC. Prodr. VII. 84. — ⊙ — *Patria ignota.*

2979. **Tolpis** Adans.

Drepania Juss.

3023. **Tolpis barbata** Gärtner Carp. II. 372. t. 160. f. 1. Lam. t. 661. Bivona Tolpid. t. 3. DC. Prodr. VII. 86. *Crepis barbata* Linn. Spec. 1131. Curt. Bot. Mag. t. 35. *Swertia barbata* Allioni Flor. Pedemont. n. 157. *Drepania barbata* Desfont. Flor. atlant. II. 252. — ⊙ — *Habitat in apricis sterilibus Europae australis et Africae borealis.*

2985. **Hypochaeris** Linn.

Arachnites DC.

3024. **Hypochaeris arachnoidea** Poir. Dict. V. 572. DC. Prodr. VII. 90. — ⊙ — *Habitat in arenosis maritimis regni Neapolitani et Mauritaniae.*

2986. **Achyrophorus** Scop.

3025. **Achyrophorus ambiguus** DC. Prodr. VII 93. *Crepis pinnatifida* Hort. — ♃ — *Patria ignota.*

3026. **Achyrophorus pinnatifidus** DC. Prodr. VII. 93. *Hypochaeris pinnatifida* Cyrill. ex Tenore Sylloge 406 — ♃ — *Habitat in pratis montanis Calabriae et Corsicae.*

3027. **Achyrophorus maculatus** Scopoli Flor. carn. ed. 2. n. 986. DC. Prodr. VII. 93. *Hypochaeris maculata* Linn. Spec. 1140. Flor. dan. t. 149. Schkuhr Handb. t. 225. Hayne Arzneigew. VI. t. 45. — ♃ — *Habitat in pratis asperis Europae mediae et borealis.*

2987. **Seriola** Gärtn.

3028. **Seriola albicans** Tineo Plant. Sicil. rar. pug. I. 20. *Seriola alliata* Bivon. Plant. Sicul. Cent. I. n. 57. t. 7. *Seriola laevigata* Var. γ. DC. Prodr. VII. 96. — ♃ — *Crescit in rupibus Siciliae.*

2988. **Metabasis** DC.

3029. **Metabasis aetnensis** DC. Prodr. VII. 307. *Seriola aetnensis* Linn. Spec. 1139. Jacq. Observ. IV. 3. t. 79. — ♃ — *Crescit in regione mediterranea.*

3030. **Metabasis cretensis** DC. Prodr. VII. 307. *Seriola cretensis* Linn. Spec. 1139. Bivona Manip. IV. 15. t. 4. — ⨀ — *Crescit in pascuis montanis insularum maris mediterranei.*

2989. **Thrincia** Roth.

a. **Euthrincia** DC.

3031. **Thrincia hirta** DC. Fl. fr. ed. 3. n. 2965. Prodr. VII. 99. Reichenb. Iconogr. f. 994. *Leontodon hirtum* Linn. Spec. 1123. Curtis Flor. Lond. II. t. 160. *Hedypnois hirta* Smith E B. t. 550. *Hyoseris hirta* Gärtner Carp. II. 375. — ♃ — *Habitat in aridis et ad margines agrorum Europae totius.*

b. Streckera Schultz.

3032. **Thrincia tuberosa** DC. Fl. fr. ed. 3. n. 2967. Prodr. VII. 100. *Leontodon tuberosum* Linn. Spec. 1123. *Apargia tuberosa* Willdenow Spec. III. 530. — ♃ — *Habitat in agris arenosis regionis mediterraneae.*

2990. Leontodon Juss.

a. Virea Adans.

3033. **Leontodon squamosum** Lam. Dict. III. 529. DC. Prodr. VII. 101. *Leontodon alpinum* Jacq. Flor. austr. t. 93. *Apargia alpina* Willd. Spec. III. 1547. — ♃ — *Habitat in pascuis montanis et alpinis Europae totius.*

β. *Crepidiforme. Leontodon crepidiforme* Lam. Dict. III. 530.

3034. **Leontodon hastile** Linn. Spec. 1123. DC. Prodr. VII. 102. *Virea hastilis* Gärtner Carp. II. 365. t. 159 f. 3. *Apargia hastilis* Hoffmann Flor. germ. IV. 113. *Leontodon danubiale* Jacq. Flor. austr. t. 164. — ♃ — *Habitat in humidiusculis Europae totius.*

3035. **Leontodon hispidum** Linn. Spec. 1123. Curt. Flor. Lond. II. t. 161. DC Prodr. VII. 102. *Apargia hispida* Hoffm. Fl. germ. V. 113. Schkuhr Handb. t. 220. *Hedypnois hispida* Smith E. B. t. 554. — ♃ — *Habitat in siccis montanis Europae fere totius.*

3036. **Leontodon Berinii** Bartling in Flora 1820. p. 343. Reichenb. Iconogr. t. 829 DC. Prodr. VII. 102. *Apargia arenaria* Moretti. *Apargia Berinii* Jan. — ♃ — *Habitat in arenosis agri Forojuliensis, ad ripas fluvii Isonzo.*

3037. **Leontodon incanum** DC. Fl. fr. n. 2975. Prodr. VII. 103. *Hieracium incanum* Linn. Spec. 522. Jacq. Flor austr. t 287. *Apargia incana* Scopoli Flor. carn. ed. 2. n. 982. — ♃ — *Habitat in pratis montanis et subalpinis Europae australioris.*

3038. **Leontodon saxatile** Reichenb Flor. excurs. 252. DC. Prodr. VII. 103. *Apargia saxatilis* Tenore Catalog. hort. neap. 1819. p. 59. Flor. neap.

t 72. *Apargia tergestina* Hoppe — ♃ — *Habitat in montibus calcareis apricis Europae australis.*

3039. **Leontodon crispum** Villars Delph. III. 84. t. 25. DC. Prodr. VII. 103 *Apargia crispa* Willd. Spec. III. 1551. — ♃ — *Habitat in asperis vallium Delphinatus, Vallesiae et Pedemontii.*

3040. **Leontodon Villarsii** Loisleur Flor. gall. 514. DC. Prodr. VII. 103. *Apargia Villarsii* Willd. Spec. III. 422. *Leontodon hirtum* Villars Delph. III. 82. t. 25. — ♃ — *In saxosis Galliae australis, Pedemontii et Forojulii.*

3041. **Leontodon Rosani** DC. Prodr. VII. 104. *Apargia Rosani* Tenore Flor. neap. App. 5. p. 26. Syllog. 394. — ♃ — *Habitat in collibus regni neapolitani, circa Rosano, Ischia et alibi.*

b. Asterothrix Less.

3042. **Leontodon asperrimum.** *Asterothrix asperrima* Cassini in Dict sc. nat. XLVIII. 434. DC. Prodr. VII. 127. *Scorzonera asperrima* Willd. Spec. III. 1507. *Apargia strigosa* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 249. — ♃ — *Habitat in Caucaso.*

c. Oporinia Don.

3043. **Leontodon autumnale** Linn. Spec. 1123 *Hedypnois autumnalis* Hudson Flor. angl. 341. *Apargia autumnalis* Hoffm. Deutschl. Flor. IV. 113. Schkuhr Handb. t. 220 *Scorzoneroides autumnalis* Mönch Method. 544. *Oporinia autumnalis* Don in Edinb. new. philosoph. Journ 1829. p. 309. — ♃ — *Habitat in pratis et pascuis Europae totius nec non Sibiriae.*

2992. Geropogon Linn.

3044. **Geropogon glaber** Linn. Spec. 1109. Jacq. Hort. Vindob. I. t. 33. Schkuhr Handb. t. 213. DC. Prodr. VII. 112. *Geropogon australis* Sprengel Syst. III. 663. — ⊙ — *Habitat inter segetes Europae australis.*

2993. **Podospermum** DC.

3045. **Podospermum laciniatum** DC. Fl. fr. ed. 3. n. 2984. Prodr. VII. 111. *Scorzonera laciniata* Linn. Spec. 1114. Gärtner II. 367. t. 159. – ☉— *Habitat in arvis et collibus Europae mediae et australis.*

3046. **Podospermum Jacquinianum** Koch Synops. 425. *Podospermum octangulare* Roth. DC. Prodr. VII. 110. *Scorzonera laciniata* Jacq. Flor. austr t. 356. —☉— *Habitat in Europae australis argillosis.*

2994. **Urospermum** Scop.

3047. **Urospermum picroides** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 1. p. 90. DC. Prodr. VII. 116. *Tragopogon picroides* Linn. Spec. 1111. Lam. Ill. t. 646. f. 3. —☉— *Habitat in vineis et agris regionis mediterraneae.*

2995. **Tragopogon** Tournef.

3048. **Tragopogon major** Jacq Flor. austr. t. 29. DC. Prodr. VII. 112. *Tragopogon dubius* Scopoli Carn. n. 927. —⊙— *Habitat in arvis et vineis apricis Europae, et ad mare caspicum.*

3049. **Tragopogon eriospermus** Tenore Flor. neap. Prodr. III. 11. DC. Prodr. VII. 113. —⊙— *Habitat in pascuis regni Neapolitani.*

3050. **Tragopogon porrifolius** Linn. Spec. 1110. Jacq. Ic. rar. t. 159. Flor. dan. t. 797. E. B. t. 638. DC. Prodr. VII. 113. —☉— *Habitat in collibus et pratis Europae australioris, in media passim » Scorzonerae hispanicae « loco cultus.*

3051. **Tragopogon undulatus** Jacq. Ic. rar. t. 158. DC. Prodr. VII. 113. —☉— *Habitat in pascuis montosis subalpinis Carpathorum, Tauriae et Asiae mediae.*

β. *Orientalis. Tragopogon orientalis* Linn. Spec. 1109. *Tragopogon villosus* Hablitzl Taur. 151.

3052. **Tragopogon pratensis** Linn. Spec. 1109. E. B. t. 434. Schkuhr t. 214. Gärtner Carp.

II. t. 159. DC. Prodr. VII. 113. —⊙— *Habitat in pratis Europae et Orientis vulgaris.*

»Radix Tragopogonis s. Barbae hirci« mucilaginosa, subamara, olim inter medicamina leniter aperientia et solventia laudata.

3053. **Tragopogon crocifolius** Linn. Spec. 1100. DC. Prodr. VII. 114. —⊙— *Habitat in pratis apricis montosis Europae australis et Orientis.*

3054. **Tragopogon angustifolius** Bellard. ex Willd. Spec. III. 1494. DC. Prodr. VII. 115. —⊙— *Habitat in agro Nicaënsi.*

3055. **Tragopogon mutabilis** Jacq. Ic. rar. I. t. 157. Miscell. II. 316. DC. Prodr. VII. 114. —⊙— *Habitat circa Astrachan.*

2997. Scorzonera Linn.

1. Euscorzonera DC.

3056. **Scorzonera deliciosa** Gussone Index Sem. Hort. Boccadifal. 1825. DC. Prodr. VII. 118. —♃— *Habitat in pascuis montanis Siciliae, circa Panormum frequens.*

Radicis saccharo varie confectae et gratissime refrigerantis magnam vim Panormitani consumunt.

3057. **Scorzonera purpurea** Linn. Spec. 1113. Jacq. Flor. austr. t. 35. DC. Prodr. VII. 118. —♃— *Habitat in collibus apricis sterilibus Germaniae mediae.*

3058. **Scorzonera plantaginea** Schleich. ex Gaudin Flor. Helv. V. 20. DC. Prodr. VII. 119. *Scorzonera humilis* Willd. Spec. III. 1499. Flor. dan. t. 1653. *Scorzonera glastifolia* Hegetschw. Helv. II. 157. *Scorzonera nervosa α.* Poiret Dict. VII. 22. —♃— *Habitat in pratis nemorosis, humidis Helvetiae, Germaniae et Italiae.*

3059. **Scorzonera humilis** Linn. Spec. 1112. Jacq. Flor. austr. t. 36. DC. Prodr. VII. 120. *Scorzonera austriaca* Willd. Spec. III. 1498. *Scorzonera graminifolia* Ledebour Flor. alt. IV. 161. *Scorzonera ner-*

vosa Persoon Encheir. II. 360. — ♃ — *Habitat in pratis collinis Europae et Sibiriae.*

3060. **Scorzonera hispanica** Linn. Spec. 1112. DC. Prodr. VII. 121. — ♃ — *Habitat in Hispania, passim per reliquam Europam ob radicem edulem culta, olim contra Viperarum ictus celebris.*

3061. **Scorzonera taurica** Bieberst. Flor. Taur. cauc. n. 1558. DC. Prodr. VII. 121. — ♃ — *Habitat in Tauriae et Bessarabiae collibus aridis.*

3062. **Scorzonera glastifolia** Willd. Spec. III. 1499. DC. Prodr. VII. 121. *Scorzonera hispanica β.* Wallroth Flor. Hall. Suppl. 3. 94. — ♃ — *Habitat in collibus Europae mediae et australioris.*

3063. **Scorzonera parviflora** Jacq. Flor. austr. IV. t. 305. DC. Prodr. VII. 121. — ♃ — *Habitat in limosis subsalsis ad Neusiedeler-See, in Galliae littore mediterraneo, et in desertis salsis Sibiriae.*

2. Gelasia Cass.

3064. **Scorzonera villosa** Scopoli Carn. ed. 2. n. 952. t. 46. DC. Prodr. VII. 124 *Gelasia villosa* Cassini Dict. sc. nat. XVIII. 286. — ♃ — *Crescit in agro Tergestino.*

β Concolor.

3. Lasiospora Cass.

3065. **Scorzonera hirsuta** Linn. Mant. 278. DC. Prodr. VII. 124. *Lasiospermum hirtum* Fischer Catalog. Hort. Gorenk. 1812. p. 34. *Lasiospora hirsuta* Cassini Dict. sc. nat. XXV. 308. **Geropogon calyculatus* Linn. Syst. 562. Jacq. Hort. Vindob. t. 106. — ♃ — *Habitat in collibus aridis Europae mediterraneae.*

3066. **Scorzonera eriosperma** Bieberst. Casp. 117. DC. Prodr. VII 124. *Lasiospermum angustifolium* Fischer Catalog Hort. Gorenk. 1812. p. 34. *Lasiospora angustifolia* Cassini in Dict. sc. nat. XXV. 306. — ♃ — *Habitat in Tauria.*

3067. **Scorzonera nervosa** Treviranus Ind.

Sem. Hort. Bonn. 1833. DC. Prodr. VII. 125. —♃— *Habitat in Armenia.*

2999. **Picris** Linn.

3068. **Picris hieracioides** Linn. Spec. 1115. E. B. t. 196. DC. Prodr. VII. 128. *Crepis hieracioides* Lam. Fl. fr. II. 111. —☉— *Habitat in versuris Europae totius et Caucasi.*

3069. **Picris laciniata** Visiani Plant. Dalm. rar. 24. DC. Prodr. VII 129. *Crepis lappacea* Host Flor. austr. II. 421. —☉— *Habitat in rupestribus Dalmatiae.*

3070. **Picris scaberrima** Gussone Syllog. 396. —☉— *Habitat in Sicilia.*

3071. **Picris strigosa** Bieberst. Flor. Taur. cauc. 1603. DC. Prodr. VII. 129. —♃— *Habitat in collibus herbidis Caucasi.*

3000. **Helminthia** Juss.

3072. **Helminthia echioides** Gärtner Carp. II. 368. t. 159. Lam. t. 641 DC. Prodr. VII. 132. *Picris echioides* Linn. Spec. 1114. —☉— *Habitat in agris Angliae, Galliae et Italiae.*

3001. **Kalbfussia** Schulz.

3073. **Kalbfussia Salzmanni** Schulz in Flora 1833. p. 723. DC. Prodr. VII. 101. *Apargia verna* Salzm. ex Delile Ind. Sem. Hort. monsp. 1836. —☉— *Habitat in vineis circa Tanger.*

3002. **Picridium** Desf.

3074. **Picridium tingitanum** Desfont. Flor. atlant. II. 220. DC. Prodr. VII. 182. *Scorzonera tingitana* Linn. Spec. 1114. *Sonchus tingitanus* Lam. Dict. III. 397 *Reichardia runcinata* Mönch Meth. 16. *Reichardia tingitana* Roth Abhandl. 35. —♃— *Habitat in rupibus maritimis Barbariae, Aegypti et Siciliae.*

3003. **Sonchus** Linn.

a. **Eusonchus** DC.

* **Herbacei annui.**

3075. **Sonchus ciliatus** Lam. Fl. fr. II. 87. DC. Prodr. VII. 185. *Sonchus oleraceus α* et *β*. Linn. Spec. 1116. — ⊙ — *Habitat in cultis totius fere orbis.*

3076. **Sonchus tenerrimus** Linn. Spec. 1117. DC. Prodr. VII. 186. — ⊙ — *Habitat in rupibus orae mediterraneae.*

β. Lacerus. Sonchus lacerus Willd. Spec. III. 1503.

** **Fruticosi.**

3077. **Sonchus laevigatus** Willd. Enum. Suppl. 54. DC. Prodr. VII. 188. — ♄ — *Patria ignota.*

3078. **Sonchus Jacquini** DC. Catalog. Hort. Monsp. 1813. p. 147. *Sonchus fruticosus* Jacq. Collect. I. 13. Ic. rar. I. t. 161. excl. synon. — ♄ — *Crescit in rupibus insulae Teneriffa ubi » Lactuca Pastoris « (Lechuga de Pastor) dicitur.*

3079. **Sonchus pinnatus** Aiton Hort. kew. III. 116. DC. Prodr. VII. 188. — ♄ — *Habitat in rupibus Maderae.*

b. **Atalanthus** Don.

3080. **Sonchus arboreus** DC. Prodr. VII. 189. *Prenanthes arborea* Broussonet Elench. Hort. Monsp. 47. — ♃ — *Habitat in insula Teneriffa.*

3081. **Sonchus leptocephalus** Cassini in Dict. sc. nat. XLIII. 281. DC. Prodr. VII. 189. *Prenanthes pinnata* Linn. f. Suppl. 347. Jacq. f. Eclog. I. 30. t. 19. non Ait. *Chondrilla pinnata* Lam. Dict. II. 79. — ♄ — *Habitat in rupibus Teneriffae.*

3004. **Youngia** Cass.

3082. **Youngia mauritiana** DC. Prodr. VII. 192. *Youngia lyrata* Cassini Opusc. III. 86. — ⊙ — *Habitat in agris et cultis insulae Mauritii.*

3005. **Prenanthes** Gärtn.

a. **Euprenanthes** Endl.

3083. **Prenanthes purpurea** Linn. Spec. 1121. Jacq. Flor. austr. t. 317. Gärtner Carp. II. t. 158. f. 1. Schkuhr t. 218. DC. Prodr. VII. 194. *Chondrilla purpurea* Lam. Dict. II. 78. — ♃ — *Habitat in montanis sylvaticis Europae.*

b. **Nabalus** Cass.

3084. **Prenanthes serpentaria** Pursh Flor. Bor. Amer. II 499. t. 14. *Nabalus serpentarius* Hooker Flor. Bor. Amer. I. 294. DC. Prodr. VII. 240. *Harpalyce serpentaria* Don in Edinb. new philosoph. Journ. 1829. — ♃ — *Habitat in montibus Americae borealis, specificum adversus morsus serpentum.*

3008. **Lactuca** Linn.

Scariola DC.

a. **Cyanicae.**

3085. **Lactuca perennis** Linn. Spec. 1120. Mill. Ic. t. 157. Bot. Mag. t. 2130. DC. Prodr. VII. 133. — ♃ — *Habitat in collibus et montanis apricis Europae totius.*

3086. **Lactuca tuberosa** Jacq. Hort. Vindob. t. 47. DC. Prodr. VII. 133. — ♃ — *Habitat in convallibus montium Seidchadschi, provinciae Aderbeidschan Persiae.*

3087. **Lactuca Fischeriana** DC. Prodr. VII. 135. *Prenanthes graminea* Fischer Mem. soc. nat. mosq. III. 67. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

b. **Xanthinae.**

3088. **Lactuca saligna** Linn. Spec. 1119. Jacq. Flor. austr. t. 250. DC. Prodr. VII. 136. —⊙— *Habitat in asperis salsis Europae, Tauriae et Syriae.*

3089. **Lactuca sagittata** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 1. t. 1. DC. Prodr. VII. 136. — ⊙ — *Habitat in sylvis Hungariae Tibiscanae, et Chersonesi tauricae.*

3090. **Lactuca augustana** Allioni Flor. Pedemont. n. 823. t. 52. f 1. DC. Prodr. VII. 137. — ⊙ — *Habitat in arenosis vallis augustanae Pedemontii, in Persia boreali et Aegypto superiori.*

3091. **Lactuca virosa** Linn Spec. 1119. DC. Prodr. VII. 137. — ⊙ — *Habitat in aggeribus et sepibus Europae mediae et australis.*

β. *Maculata. Lactuca maculata* Hornemann Hort. Hafn. II. 755.

3092. **Lactuca Scariola** Linn. Spec. 1119. DC. Prodr. VII. 137. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Europae mediae et australis.*

3093. **Lactuca stricta** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 47. t. 48 DC. Prodr. VII. 138. — ⊙ — *Habitat in collibus asperis et vineis Europae australioris et Caucasi.*

3094. **Lactuca laciniata** Roth Catalect. I. 90. DC. Prodr. VII. 138. *Lactuca palmata* Willd. Spec. III. 1523. — ⊙ — *Patria, plantae sub nomine gallico »Laitue-Epinard« notae, dubia.*

3095. **Lactuca crispa** C. Bauhin Pin. 123. DC. Prodr VII. 138. *Lactuca sativa crispa* Linn. Spec. 1118. — ⊙ — *Plantae Gallis »Laitue frisée« dictae patria ignota.*

3096 **Lactuca sativa** Linn. Spec. 1118. DC. Prodr. VII. 138. — ⊙ — *Patria dubia, verisimiliter India orientalis.*

β. *Constantinopolitana.*

3097. **Lactuca canadensis** Linn. Spec. 1119. *Sonchus pallidus* Willdenow Spec. III. 1521. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3009. **Chondrilla** Tournef.

3098. **Chondrilla juncea** Linn. Spec. 1120. Jacq. Flor. austr. t. 427. DC. Prodr. VII. 142. — ⊙ —

Habitat in glareosis Europae fere totius et Sibiriae altaicae.

3099. **Chondrilla latifolia** Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 244. DC. Prodr. VII. 142. — ⊙ — *Habitat in campestribus Tauriae et in Olympo Bithyniae.*

3100. **Chondrilla pauciflora** Ledebour Flor. alt. IV. 148. Ic. t 198. DC Prodr. VII. 142. — ♃ — *Habitat in arenosis Sibiriae altaicae ad fluvium Irtysch.*

3010. Taraxacum Hall.

3101. **Taraxacum Dens Leonis** Desfont. Flor. atlant. n. 228. DC. Prodr. VII. 145. *Leontodon Taraxacum* Linn. Spec. 1122. — ♃ — *Habitat in regionibus extratropicis Asiae et Africae, in Europa a maris littore in alpes adscendens.*

3102. **Taraxacum serotinum** Sadler Flor. Pesth. 243. DC. Prodr. VII. 147. *Leontodon serotinus* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. II. t. 114. — ♃ — *Habitat in argillosis agri Vindobonensis, Hungariae et Caucasi.*

3103. **Taraxacum appenninum** DC. Prodr. VII. 148. *Leontodon appenninus* Tenore Sylloge 392. *Leontodon alpinus* Gussone Plant. rar. 395. — ♃ — *Habitat in pratis alpinis Aprutiorum.*

3013. Zacyntha Tournef.

3104. **Zacyntha verrucosa** Gärtner Carp. II. 358. t. 157. DC. Prodr. VII. 178. *Lapsana Zacyntha* Linn. Spec. 1141. — ⊙ — *Habitat in agris regionis mediterraneae et Tauriae.*

3014. Nemauchenes Cass.

3105. **Nemauchenes aspera** Endl. *Nemauchenes aculeata* Cassini in Dict. sc. nat. XXXIV. 362. *Endoptera aspera* DC. Prodr. VII. 179. *Crepis aspera* Linn. Spec. 1133. *Barkhausia aspera* Reichenb. Flor. excurs. 253. — ⊙ — *Habitat in Italia, Graecia et Oriente.*

3015. **Gatyona** Cass.

3106. **Gatyona Dioscoridis** Endl. *Crepis Dioscoridis* Linn. Spec. 1133. DC. Ic. Plant. Gall. rar. t. 18. Schkuhr Handb. t. 222. *Crepis globifera* Haller f. in Naturw. Anzeig. 1818. p. 91. *Picris globifera* Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed. 2. *Crepis croatica* Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 90. *Gatyona globulifera* Cassini in Dict. sc. nat. XVIII. 184. *Endoptera Dioscoridis* DC. Prodr. VII. 179. —⊙— *Habitat in Europa australiori.*

3018. **Trochoseris** Pöpp. et Endl.

3107. **Trochoseris pterocarpa** Pöpp. et Endl. msc. *Macrorhynchus pterocarpus* Fischer et C. A. Meyer Index Sem Hort. Petrop. 1835. p. 41. 1837. p. 40. DC. Prodr. VII. 151. *Taraxacum caulescens* Moris in Mem. Academ Turin. XXXVII. 108. t. 34. —⊙— *Habitat in pascuis saxosis Chili.*

3108. **Trochoseris aurantiaca** Pöpp. et Endl. msc. *Macrorhynchus aurantiacus* Fischer et C. A. Meyer Index Sem. Hort. Petrop 1837. p. 40. —♃— *Habitat in Chili.*

3021. **Barkhausia** Mönch.

a. **Paleya** Cass.

3109. **Barkhausia albida** Cassini in Dict. sc. nat. XXVI 62. DC. Prodr. VII. 152. *Crepis albida* Villars Delph. III. 139. t. 33. *Picridium albidum* DC. Fl. fr. IV. 16. *Paleya albida* Cassini in Dict. sc. nat. XXXIX. 393. —♃— *Habitat in pratis lapidosis Pyrenaeorum et Delphinatus.*

b. **Lepidoseris** Reichenb.

3110. **Barkhausia alpina** DC. Fl. fr. IV. 2946. Prodr. VII. 153. *Crepis alpina* Linn Spec. 1134. Gärtner Carp. II. 354 t. 158. —⊙— *Habitat in montibus Europae australis et Tauriae.*

c. **Aegoseris** DC.

3111. **Barkhausia setosa** DC. Ic Plant. Gall. rar. t. 19. Prodr. VII. 155. *Crepis hispida* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 43. *Crepis bannatica* Willdenow Enum. Suppl. 55. — ⊙ — *Habitat in asperis et ruderalis Europae australioris et Tauriae.*

d. **Anisoderis** Cass.

3112. **Barkhausia rubra** Mönch Meth. 537. *Crepis rubra* Linn. Spec. 1132. *Crepis incarnata* Visiani Plant. Dalm. 17. t. 6. f. 1. — ⊙ — *Habitat in pascuis Europae mediterraneae.*

3113. **Barkhausia glandulosa** Presl Flor. sicul. XXXI. DC. Prodr. VII. 158. *Crepis glandulosa* Gussone Plant. rar. 329. t. 56. — ⊙ — *Habitat in collibus regni Neapolitani et Siciliae.*

3114. **Barkhausia foetida** DC. Flor. fr. ed. 3. p. 2948. Prodr. VII. 158. *Crepis foetida* Linn. Spec. 1133. E. B. t. 837. — ⊙ — *Habitat in ruderatis Europae australis et Tauriae.*

3115. **Barkhausia rhoeadifolia** Bieberst. Flor. Taur. cauc. Suppl. 538. DC. Prodr. VII. 158. *Crepis rhoeadifolia* Bieberst. Flor. Taur. cauc. p. 538. — ⊙ — *Habitat in Iberia.*

3022. **Crepis** Mönch.

a. **Phaecasium** Cass.

3116. **Crepis pulchra** Linn Spec. 1134. DC. Prodr. VII. 160. *Prenanthes pulchra* DC. Fl. fr. n. 2282. *Phaecasium lampsanoides* Cassini in Dict. sc. nat. XXXIX. 387. — ♃ — *Habitat in ruderatis et collibus Europae australioris et Asiae mediterraneae.*

b. **Brachyderea** Cass.

3117. **Crepis rigida** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung I. 18 t. 19. DC. Prodr. VII. 160. *Crepis latifolia* Balbis Hort. Taurin. *Hieracium pannonicum* Jacq. Collect. V. 148. *Brachyderea rigida* Cassini

Dict. sc. nat. XLVIII. 430. — ♃ — *Habitat in campestribus et montanis herbidis Hungariae, Tauriae, Caucasi et Persiae.*

3118. **Crepis lacera** Tenore Flor. Neap. II. 179. t. 74. Reichenb. Iconogr. t. 19. DC Prodr. VII. 161. *Crepis latialis* Sebastiani Plant. rom. fasc. II. 16. t. 5. — ♃ — *Habitat in montibus calcareis Latii et regni Neapolitani.*

Herba venenatissima, vulgo » Angina « et » Cichoria di montagna « dicta.

c. Eucrepis DC.

3119. **Crepis pauciflora** Desfont. Catalog. Hort. Paris ed. 2. p. 103. DC. Prodr. VII. 161. — ⊙ — *Habitat in Aegypto.*

3120. **Crepis parviflora** Desfont. Catalog. Hort. Paris. ed 1. p. 88. DC. Prodr. VII. 162. — ⊙ — *Habitat in Oriente.*

d. Intybelloides DC.

3121. **Crepis praemorsa** Frölich in DC. Pródr. VII. 164. *Hieracium praemorsum* Linn. Spec. 1126. Flor. dan. t. 942. *Geracium praemorsum* Mösler et Reichenb. Handb. II. 1367. — ♃ — *Habitat in apricis herbidis montium Europae et Sibiriae.*

3122. **Crepis multicaulis** Ledebour Flor. alt. IV. 125. Ic. t. 36. DC Prodr. VII. 165. — ♃ — *Habitat in lapidosis insularum fluvii Tschuja, ad ostium fluvii Kurai Sibiriae altaicae.*

e. Haplostephium Don.

3123. **Crepis alpestris** Tausch ex DC. Prodr. VII. 166. *Hieracium alpestre* Jacquin Flor. austr. t. 191. — ♃ — *Habitat in subalpinis calcareis Europae totius.*

3124. **Crepis grandiflora** Frölich in DC. Prodr. VII. 166 *Hieracium grandiflorum* Allioni Flor. Pedemont. t. 29. f. 2. Waldst. et Kitaibel Plant Hung. rar. t. 31. — ♃ — *Habitat in alpinis et subalpinis Europae mediae.*

3125. **Crepis sibirica** Linn. Spec. 1125. *Hieracium sibiricum* Lam. Dict. II. 368. *Soyeria sibirica* Monnier Ess. 77. — ♃ — *Habitat in Sibiria, Volhynia et Hungaria.*

3126. **Crepis croatica** Frölich in DC. Prodr. VII. 171. *Hieracium croaticum* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. t. 218. — ♃ — *Habitat in subalpinis Croatiae.*

3127. **Crepis foeniculacea** Frölich in DC. Prodr. VII. 172. *Andryala chondrilloides* Scopoli Flor. carn. II. 115. t. 52. *Berinia andryaloides* Brignoli Forojul. 50. *Crepis chondrilloides* Jacq. Enum. Vindob. 312. — ♃ — *Habitat in fissuris rupium Europae australioris.*

3026. **Hieracium** Tournef.

Sect. I. Copholepida DC. Prodr. VII. 199.

Subsect. 1. Dasycephala DC. l. c.

§. 1. Pilosellae DC.

3128. **Hieracium Pilosella** Linn. Spec. 1125. Flor. dan. t. 1110. DC. Prodr. VII. 199. — ♃ — *Habitat in collibus et pascuis siccis Europae totius.*

3129. **Hieracium flagellare** Willd. Suppl. 54. DC. Prodr. VII. 200 *Hieracium stoloniferum* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. III. 303. t. 270. — ♃ — *Habitat in pratis siccis Hungariae et Bohemiae.*

3130. **Hieracium Auricula** Linn. Spec. 1126. Flor. dan. t. 1111. DC. Prodr. VII. 201. *Hieracium dubium* Willd. Spec. III. 1563. — ♃ — *Habitat in pascuis Europae totius.*

3131. **Hieracium glaucescens** Besser Flor. Gallic. II. 150. DC. Prodr. VII. 202. — ♃ — *Habitat in argillosis Galliciae.*

3132. **Hieracium Bauhini** Besser Flor. Gallic. II. 150. DC. Prodr. VII. 202. — ♃ — *Habitat in collibus siccis Helvetiae, Austriae, Hungariae et Poloniae.*

3133. **Hieracium aurantiacum** Linn. Spec. 1126. Jacq. Flor. austr. t. 410. DC. Prodr. VII. 204. — ♃ — *Habitat in subalpinis et alpinis Europae totius.*

β. *Repens. Hieracium repens* Willd. Spec. III. 1564.

3134. **Hieracium angustifolium** Hoppe Taschenb. 1799. p. 130. DC. Prodr. VII 204. — ♃ — *Habitat in alpibus Carinthiae et Tyrolis.*

3135. **Hieracium piloselloides** Vill. Delph. III. 100. t. 27. DC. Prodr. VII. 205. — ♃ — *Habitat in glareosis Alpium.*

3136. **Hieracium praealtum** Gochnat Cich. 17. Reichenb. Iconogr. t. 55. DC. Prodr. VII. 205. — ♃ — *Habitat in muris vetustis et montanis asperis Europae mediae.*

3137 **Hieracium fallax** Willd. Enum. 822. Reichenb. Iconogr. t. 39. DC. Prodr. VII. 205. — ♃ — *Habitat in rupestribus Germaniae mediae.*

3138. **Hieracium echioides** Lumnitz. Flor. poson. n. 782. Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 85. DC. Prodr. VII 206. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Europae orientalis, Tauriae et Persiae.*

3139. **Hieracium cymosum** Villars Voy. 62. t. 4. f. 2. Reichenb Iconogr. t. 17. DC. Prodr. VII. 207. — ♃ — *Habitat in collibus apricis Europae mediae et australis.*

β. *Nestleri. Hieracium Nestleri* Vill. Voy. 62. t. 4. f. 1.

3140. **Hieracium Zizianum** Tausch in Flora 1828. Ergänz. I. 62. DC. Prodr. VII. 238. — ♃ — *Habitat in saxosis Palatinatus.*

§. 2. Pulmonariae DC.

3141. **Hieracium alpinum** Linn. Spec. 1124. E. B. t. 1119. DC. Prodr. VII. 208. — ♃ — *Habitat in turfosis alpium Europae totius, Asiae et Americae borealis.*

3142. **Hieracium sudeticum** Sternberg in Denkw. Regensb. bot. Gesellsch. II. 62. c. ic. DC. Prodr. VII. 209. — ♃ — *Habitat in Sudetis et in alpibus Carinthiae.*

3143. **Hieracium nigrescens** Willd. Spec. III. 1674. Hort. berolin. I. 7. t. 10. DC. Prodr. VII. 209. — ♃ — *Habitat in Sudetis.*

3144. **Hieracium intybaceum** Jacq. Flor. austr. App. t. 43. DC. Prodr. VII. 210. — ♃ — *Habitat in glareosis alpium Europae.*

3145. **Hieracium prenanthoides** Villars Delph. III. 108. DC. Prodr. VII. 211. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae.*

β. *Denticulatum. Hieracium denticulatum* Smith E. B. t. 2235.

3146. **Hieracium cydoniaefolium** Villars Delph. III. 107. DC. Prodr. VII. 212. — ♃ — *Habitat in alpibus Germaniae, Helvetiae et Galliae.*

3147. **Hieracium speciosum** Link Enum. II. 207. DC. Prodr. VII. 212. — ♃ — *Habitat in subalpinis Helvetiae.*

3148. **Hieracium compositum** Lapeyr. Abreg. 476. DC Prodr. VII. 212. — ♃ — *Habitat in pratis siccis Pyrenaeorum.*

3149. **Hieracium humile** Host Synops. 402. DC. Prodr. VII. 214. *Hieracium Jacquini* Villars Delph. III. 123. t. 28 *Hieracium pumilum* Jacq. Flor. austr. t. 189. excl. synon. — ♃ — *Habitat in rupibus subalpinis Europae totius.*

3150. **Hieracium vulgatum** Fries msc. DC. Prodr. VII. 214. — ♃ — *Habitat in petrosis Sueciae et Germaniae.*

3151. **Hieracium bifidum** Kitaibel msc. DC. Prodr. VII. 214. — ♃ — *Habitat in rupibus subalpinis Hungariae et Carinthiae.*

3152. **Hieracium murorum** Linn. Spec. 1128. Schkuhr Handb. t. 221. DC. Prodr. VII. 215. — ♃ — *Habitat in maceriis et rupibus Europae totius.*

3153. **Hieracium lanatum** Willdenow Spec. III. 1686. Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 127. DC. Prodr. VII. 216. — ♃ — *Habitat in subalpinis Croatiae.*

Subsect. 2. Leiocephala DC. Prodr. VII. 217.

§. 1. Phyllopoda DC. l. c.

3154. **Hieracium staticifolium** Allioni Flor. Pedemont. n. 782. t. 81. f. 2. DC. Prodr. VII. 218. — ♃ — *Habitat in glareosis juxta torrentes alpestres Europae totius.*

3155. **Hieracium glaucum** Allioni Flor. Pedemont. n. 781. t. 28. f. 3. DC. Prodr. VII. 219. [*Hieracium saxatile* Jacq. Ic. rar. t. 163. non Observ. — ♃ — *Habitat in subalpinis Europae australioris.*

3156. **Hieracium bupleuroides** Gmelin Flor. Bad. III. 317. t. 2. — ♃ — *Habitat in rupibus Germaniae occidentalis.*

3157. **Hieracium saxatile** Jacq. Observ. II. 30. t. 50. non Ic. rar. DC. Prodr. VII. 220 — ♃ — *Habitat in rupibus calcareis prope Baden Austriae.*

3158. **Hieracium porrifolium** Jacq. Enum. Vindob. 273. t. 6. Flor. austr. t. 286. DC. Prodr. VII. 220. — ♃ — *Habitat in rupibus calcareis Austriae, Sabaudiae, Italiae.*

3159. **Hieracium pulmonarium** Smith E. B. t. 2307. DC. Prodr. VII. 237. — ♃ — *Habitat in Anglia.*

3160. **Hieracium laevigatum** Willdenow Spec. III. 1590. Hort. berol. t. 16. DC. Prodr. VII. 220. — ♃ — *Habitat ad ripas Berezinae, et in rupibus arcis Sebenstein Austriae inferioris.*

β. *Hirsutulum* DC. l. c.

3161. **Hieracium ramosum** Willd. Spec. III. 1579. Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. III. t. 216. DC. Prodr. VII. 221. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Hungariae, Carinthiae et Helvetiae.*

§. 2.* Aphyllopoda DC. Prodr. VII. 222.

3162. **Hieracium racemosum** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. II. 211. t. 198. DC. Prodr. VII. 223. — ♃ — *Habitat in montibus Hungariae.*

3163. **Hieracium umbellatum** Linn. Spec.

1131. E. B. t. 671. Flor. dan. t. 680. DC. Prodr. VII. 224. — ♃ — *Habitat in dumetis et ad sylvarum margines Europae totius.*

β. *Coronopifolium. Hieracium coronopifolium* Willd. Suppl. 826.

3164. **Hieracium auriculatum** Willd.Herb. Spreng. Syst. III. 646. DC. Prodr. VII. 225. —♃— *Patria ignota.*

3165. **Hieracium sylvestre** Tausch Bemerk. 70. DC. Prodr. VII. 225. — ♃ — *Habitat in dumetis et sylvis caeduis Europae totius.*

β *Tenuifolium* Hoppe.

3166. **Hieracium sabaudum** Allioni Flor. Pedemont. t. 27. f. 2. DC. Prodr. VII. 226. —♃— *Habitat in sylvis montanis Europae australioris.*

3167. **Hieracium latifolium** Spreng. Syst. III. 645. DC. Prodr. VII. 226. — ♃ — *Habitat in Russia et Pyrenaeis.*

3168. **Hieracium corymbosum** Persoon Encheir. II. 374. DC. Prodr. VII. 226. — ♃ — *Patria ignota.*

3169 **Hieracium virosum** Pallas It. 501. DC. Prodr. VII. 226. *Hieracium foliosum* Waldst. et Kit. Plant. rar. Hung. t. 145. — ♃ — *Habitat in Hungaria, Tauria et Sibiria.*

3170. **Hieracium prostratum** DC. Voy. 78. Prodr. VII. 227. — ♃ — *Habitat in arenosis Galliae, ad ostia Aturi.*

3171. **Hieracium eriophorum** Saint Amand Bullet. soc. philom. n. 52. p. 26. t. 2. f. 1. DC. Prodr. VII. 227. — ♃ — *Habitat in arenosis maritimis Aquitaniae circa Bajonam.*

Sect. II. Oxylepida DC. Prodr. VII. 227.

3172. **Hieracium Schraderi** DC. Fl. fr. IV. 20. Prodr. VII. 227. — ♃ — *Habitat in alpibus Helvetia et Tyrolis.*

3173. **Hieracium villosum** Linn. Spec. 1130.

Jacq. Flor. aust. t. 87. DC. Prodr. VII. 228. —♃— *Habitat in pascuis alpinis Europae totius.*

3174. **Hieracium flexuosum** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. III. t. 209. DC. Prodr. VII. 229. —♃— *Habitat in rupibus alpium Europae totius.*

β *Dentatum* Hoppe in Sturm Flor. 37.

3175. **Hieracium longifolium** Hornem. Hort. Havn. Suppl. 155. Link Enum. II. 288. *Hieracium cerinthoides* Willdenow Spec. III. 1580. —♃— *Habitat in rupibus alpinis Helvetiae et Carnioliae.*

3176. **Hieracium Schmidtii** Tausch Bemerk. 65. DC. Prodr. VII. 230. *Hieracium rupestre* Schmidt in Act. Boh. I. 58. t. 9. *Hieracium ovatum* Hort. Vindob. 1818. —♃— *Habitat in rupibus Bohemiae, Helvetiae et Istriae.*

3177. **Hieracium amplexicaule** Linn. Spec. 1129. DC. Prodr. VII. 230. —♃— *Habitat in rupibus calcareis subalpinis Europae.*

3178. **Hieracium pallescens** Waldst. et Kitaibel Plant. rar Hung. III. t. 217. Willd. Enum. 823. DC. Prodr. VII. 231. —♃— *Habitat in subalpinis Croatiae, Hungariae, Austriae.*

β. *Rotundatum* Schult. Flor. austr. II. 309.

3179. **Hieracium cerinthoides** Linn. Spec. 1229. DC. Prodr. VII. 233. —♃— *Habitat in Pyrenaeis.*

3180. **Hieracium Lawsonii** Villars Delph. III. 118. DC. Prodr. VII. 233. —♃— *Habitat in rupibus apricis Delphinatus et Pyrenaeorum.*

3181. **Hieracium undulatum** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 134. DC. Prodr. VII. 234. —♃— *Habitat in Hispania.*

3182. **Hieracium andryaloides** Villars Delph. III. 121. t. 29. DC. Prodr. VII. 234. —♃— *Habitat in rupibus Helvetiae, Pedemontii et Delphinatus.*

3027. Dubyaea DC.

3183. **Dubyaea sonchoidea** DC. Prodr.

VII. 247. *Lasiopus sonchoides.* Don in Sweet Fl. Gard. II. t. 346. — ♃ — *Habitat in Armenia.*

3028. **Mulgedium** Cass.

α. **Eumulgedium** DC.

§. 1. Foliis plus minus pinnatilobis.

3184. **Mulgedium alpinum** Lessing Synops. 142. DC. Prodr. VII. 248. *Sonchus alpinus* Linn. Spec. 1117. Flor. dan. t. 182. non Smith. *Sonchus caeruleus* Smith Flor. brit. 816. E. B. t. 2425. *Sonchus montanus* Lam. Dict. III. 401. *Hieracium caeruleum* Scopoli Carn. n. 976. *Cicerbita alpina* Wallroth Sched. 433. *Aracium alpinum* Monnier Hierac. 73. — ♃ — *Habitat in montosis et subalpinis Europae mediae et in Canada.*

3185. **Mulgedium Plumieri** DC. Prodr. VII. 248. *Sonchus Plumieri* Linn. Spec. 1117. DC. Fl. fr. ed. 3. n. 2899. — ♃ — *Habitat in umbrosis montanis Helvetiae, Galliae, Italiae et Hispaniae borealis.*

3186. **Mulgedium macrophyllum** DC. Prodr. VII. 248. *Sonchus macrophyllus* Willd. Spec. III. 1319. *Sonchus cordifolius* Desfont. Cat. Hort. Paris. 1804. p. 87. *Sonchus canadensis* Frölich in Usteri Annal. I. 29. non alior. — ♃ — *Habitat in umbrosis humidis Americae borealis.*

§. 2. Foliis subindivisis, dentatis.

3187. **Mulgedium multiflorum** DC Prodr. VII. 249. *Sonchus multiflorus* Desfont. Cat. Hort. Paris. 1829. p. 145. — ♃ — *Patria ignota.*

3188. **Mulgedium floridanum** DC. Prodr. VII. 249. *Mulgedium lyratum* Cassini Dict. sc. nat. XXXIII. 297. *Sonchus floridanus* Linn. Spec. 1118. *Lactuca floridana* Gärtner Carp. II. 362. t. 158. — ♃ — *Habitat in Americae borealis umbrosis et ad viarum margines a Virginia ad Carolinam et Floridam.*

Ob radicem amaram alexiteriam vulgo »Gall of the earth« dicitur.

5. **Agalma** DC.

3189. **Mulgedium leucophaeum** DC. Prodr. VII. 250. *Sonchus leucophaeus* Willd. Spec. III. 1520. *Sonchus spicatus* Lam. Dict. III. 401. — ⊙ — *Habitat in America boreali.*

Ordo LXXIII. Calycereae.

3036. Acicarpha Juss.

3190. **Acicarpha spathulata** R. Brown in Linn. Transact. XII. 131. L. C. Richard in Mem. Mus. VI. 78. t. 12. DC. Prodr. V. 3. *Echinolaena arenaria* Jacq. f. msc. — ♄ — *Habitat in arenosis maritimis Brasiliae.*

Ordo LXXIV. Goodeniaceae.

3038. Scaevola Linn.

3191. **Scaevola microcarpa** Cavanill Ic. VI. t. 509. R. Brown Prodr. 585. DC. Prodr. VII. 510. *Goodenia laevigata* Curtis Bot. Mag. t. 287. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia circa Port-Jackson.*

3043. Goodenia Smith.

3192. **Goodenia grandiflora** Sims Bot. Mag. t. 890. DC. Prodr. VII. 514. *Goodenia appendiculata* Jacq. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia.*

3048. Leschenaultia R. Br.

3193. **Leschenaultia formosa** R. Brown Prodr. 581. Sweet Flor. austr. t. 26. DC. Prodr. VII. 519. non Lindl. et Hook. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia australi.*

Ordo LXXV. Lobeliaceae.

3052. **Clintonia** Dougl.

3194. **Clintonia pulchella** Lindl. in Bot. Reg. t. 1909. DC. Prodr. VII. 347. —⊙— *Habitat in California.*

3058. **Lobelia** Linn.

α. **Rapuntium** DC.

§. 1. Antherae omnes apice barbatae v. setis terminatae.

3195. **Lobelia ramosa** Benth. in Maunds Botanist t. 93. DC. Prodr. VII. 359. *Lobelia tenuior* Benth. in Enum. Plant. Hügel. 75. non R. Br. —♃— *Habitat in Nova Hollandia ad fluvium Cygnorum.*

§. 2. Antherae 2 inferiores barbatae v. setis terminatae, reliquae muticae, dorso glabrae v. pilosae.

3196. **Lobelia triquetra** Linn. Mant. 120. DC. Prodr. VII. 370. excl. syn. *Rapuntium triquetrum* Presl Lobel. 16. —⊙— *Habitat in Capite bonae spei.*

3197. **Lobelia heteromalla** Schrader msc. *Rapuntium heteromallum* Presl Lobel. 15. —⊙— *Habitat in Capite bonae spei.*

3198. **Lobelia pubescens** Aiton Hort. kew. edit. 1. III. 498. Jacq. Hort. Schönbr. t. 178. DC. Prodr. VII. 370. *Rapuntium pubescens* Presl Lobel. 17. —♃— *Habitat in Capite bonae spei.*

3199. **Lobelia hederacea** Hort. kew. ex DC. Prodr. VII. 370. *Lobelia arguta* Hort. —♃— *Patria ignota.*

3200. **Lobelia urens** Linn. Spec. 1321. E. B. t. 953. DC. Prodr. VII. 372. —⊙— *Habitat in paludosis Angliae meridionalis, Galliae occidentalis, Hispaniae et Maderae.*

3201. **Lobelia anceps** Thunb. Prodr. 40. DC. Prodr. VII. 375. *Lobelia decumbens* Sims Bot. Mag. t. 2277. *Lobelia rhizophyta* Sprengel Nov. prov. 1818. Sims Bot. Mag. t. 2519. *Lobelia bellidifolia* Aiton Hort. kew. ed. 2. III. 357. *Lobelia alata* Labillard. Nov. Holl. t. 72. —♃— *Habitat passim in regionibus extratropicis hemisphaerae australis.*

3202. **Lobelia discolor** Klotsch Ic. Hort. Berol. t. 2. —♃— *Habitat in Mexico.*

3203. **Lobelia syphilitica** Linn. Spec. 945. Jacq. Ic. rar. III. t. 597. Ker Bot. Reg. t. 537. DC. Prodr. VII. 377. *Rapuntium syphiliticum* Miller Dict. n. 2. Gärtner I. 152. t. 30. Presl Lobel. 19. —♃— *Habitat in humidis Americae borealis a Canada ad Carolinam.*

Var. δ. *Hybrida* Hooker Bot. Mag. t. 3604. *Lobelia speciosa* Sweet Fl. Gard. II. t. 174.

3204. **Lobelia splendens** Willdenow Hort. berolin. t. 86. DC. Prodr. VII. 381. *Rapuntium splendens* Presl Lobel. 26. —♃— *Habitat in temperatis Mexici.*

b. Homochilus DC.

3205. **Lobelia laxiflora** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. III. 311. DC. Prodr. VII. 383. —♃— *In temperatis Mexici.*

α. Bicolor. Lobelia persicaefolia Cavanill. Ic. III. t. 518. non Lam. *L. Cavanillesiana* Römer et Schult. Syst. V. 43. *Siphocampylus bicolor* Don in Sweet Brit. Fl. Gard. II. Ser. t. 389.

β. Angustifolia DC. l. c. *L. Cavanillesii* Martius Amoen. monac. 12. t. 9. Graham in Bot. Mag. t. 3600. *Siphocampylus Cavanillesii* Hort.

c. Tupa G. Don.

3206. **Lobelia excelsa** Bonpl. Malmais. 112. t. 46. *Lobelia Tupa* Aiton Hort. kew. ed. 2. III. 357. non Linn. *Lobelia gigantea* Sims Bot. Mag. t. 1325. non Cav. *Lobelia arguta* Lindl. Bot. Reg. t. 973. *Lobelia salicifolia* Sweet Hort. Lond. 37. *Tupa salicifolia* G. Don. Syst. III. 700. DC. Prodr. VII. 392. —♄— *Habitat in Chili, prope Valparaiso.*

3207. **Lobelia blanda.** *Tupa blanda* Don in Sweet Fl. gard. II. t. 308. DC. Prodr. VII. 393. — ♄ — *Habitat in Chili.*

3208. **Lobelia robusta** Graham in Bot. Mag. t. 3138. *Tupa robusta* DC. Prodr. VII. 394. — ♄ — *Habitat in Hispaniola.*

3060. **Laurentia** Michel.

3209. **Laurentia Michelii** DC. Prodr. VII. 409. *Lobelia Laurentia* Linn. Spec. 1321. — ☉ — *Habitat in stagnis et juxta rivulos regionis mediterraneae.*

3060. 1. **Isotoma** R. Br.

a. Euisotoma DC.

3210. **Isotoma axillaris** Lindley in Bot. Reg. t. 964. Gaudich. ad Freycin. t. 70. *Isotoma senecioides* DC. Prodr. VII. 412. *Lobelia senecioides* Sims Bot. Mag. t. 2702. *Lobelia aspleniifolia* Hortul. — ☉ — *Habitat in Nova Hollandia orientali.*

b. Selenanthis DC.

3211. **Isotoma longiflora** Presl Lobel. 42. DC. Prodr. VII. 413. *Lobelia longiflora* Linn. Spec. 942. Jacq. Hort. Vindob. t. 27. *Hippobroma longiflora* G. Don Syst. III. 717. — ♃ — *Habitat in paludosis Caribaearum.*

3063. **Piddingtonia** DC.

3212. **Piddingtonia nummularia** Alph. DC. Prodr. VII. 341. *Lobelia nummularia* Lam. Dict. III. 589. *Lobelia begonifolia* Wallich in Asiat. Research. XIII. 377. et in Roxburgh Flor. ind. II. 115. *Pratia begonifolia* Lindley in Bot. Reg. t. 1373. — ♃ — *Habitat in montanis humidis Javae et in Nepalia.*

3069. **Centropogon** Presl.

3213. **Centropogon surinamensis** Presl

Prodr. Lobel. 48. DC. Prodr. VII. 345. *Lobelia surinamensis* Linn. Spec. 1320. Bot. Mag. t. 225. Bonpl. Navarr. t. 39. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

Ordo LXXVI. Campanulaceae.

3076. **Canarina** Juss.

3214. **Canarina Campanula** Lam. Dict. I. 598. Bot. Mag. t. 444. DC. Prodr. VII. 422. —♃— *Habitat in insulis Canariis.*

Capsula subcarnosa, edulis.

3077. **Platycodon** Alph. DC.

3215. **Platycodon grandiflorum** Alph. DC. Camp. 125. Prodr. VII. 422. *Waldenbergia grandiflora* Schrader Catalog. Hort. Götting. 1814. *Campanula grandiflora* Jacq. Hort. Vindob. III. 4. t. 2. — ♃ — *Habitat in Sibiria et Dahuria.*

3079. **Wahlenbergia** Schrad.

a. **Edraianthus** Alph. DC.

3216. **Wahlenbergia Kitaibelii** Alph. DC. Camp. 131. *Edraianthus Kitaibelii* DC. Prodr. VII. 449. *Campanula graminifolia* Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 154. excl. synon. — ♃ — *Habitat in montibus calcareis Banatus, Croatiae et Transylvaniae.*

3217. **Wahlenbergia tenuifolia** Alph. DC. Camp. 133. *Edraianthus tenuifolius* DC. Prodr. VII. 449. *Campanula tenuifolia* Waldstein et Kitaibel Plant. rar. Hung. t. 155. — ♃ — *Habitat in Croatia et Dalmatia locis demissis.*

b. **Aikinia** Salisb.

3218. **Wahlenbergia gracilis** Alph. DC. Camp. 142. Prodr. VII. 433. *Campanula gracilis* Forst. Prodr. n. 84. Bot. Mag. t. 691. — ♃ — *Habitat in Nova Hollandia et Nova Zeelandia.*

3219. **Wahlenbergia capensis** Alph. DC. Camp. 136. t. 18. Prodr. VII. 426. *Campanula capensis* Linn. Spec. 240. Bot. Mag. t. 782. — ⊙ — *Habitat in Capite bonae spei, in arenosis ad fluviorum ripas.*

3081. **Roella** Linn.

3220. **Roella ciliata** Linn. Spec. 241. Bot. Mag. t. 278. DC. Prodr. VII. 446. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3082. **Phyteuma** Linn.

a. **Hedranthum** G. Don.

3221. **Phyteuma Sieberi** Sprengel Pugill. I. n. 29. Reichenb. Iconogr. f. 360. 361. DC. Prodr. VII. 451. — ♃ — *Habitat in alpibus Austriae et in Apennino.*

3222. **Phyteuma orbiculare** Linn. Spec. 242. E. B. t. 142. DC. Prodr. VII. 451. *Phyteuma cordatum* Villars Delph. II. 517. t. 11. f. 1. Sims Bot. Mag. t. 1466. *Phyteuma fistulosum* Reichenb. Flor. Dresd. — ♃ — *Habitat in nemorosis montanis Europae totius.*

3223. **Phyteuma spicatum** Linn. Spec. 242. Flor. dan. t. 362. Bot. Mag. t. 2347. DC. Prodr. VII. 453. — ♃ — *Habitat in sylvis montanis Europae mediae.*

β. *Caeruleum.*

b. **Podanthum** G. Don.

3224. **Phyteuma canescens** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 12. t. 14. DC. Prodr. VII. 455. — ♃ — *Habitat in Hungaria et Caucaso.*

3225. **Phyteuma pulchellum** Fischer et Meyer Index Sem. Hort. Petropolit. 1835. p. 35. DC. Prodr. VII. 455. — ♃ — *Habitat in aridis montium Talüsch.*

3226. **Phyteuma limoniifolium** Sibthorp Flor. graec. III. 14. t. 218. DC. Prodr. VII. 454.

Phyteuma strictum Sims Bot. Mag. t. 2145. — ♃ — *Habitat in Olympo Bithyniae, in Dalmatia, et regno Neapolitano.*

3084. Michauxia Herit.

3227. **Michauxia campanuloides** Heritier Dissert. Curtis Bot. Mag. t. 219. Alph. DC. Camp. 211. t. 4. f. c. Prodr. VII. 457. — ⊙ — *Habitat in Libano et Tauro.*

3228. **Michauxia laevigata** Venten. Hort. Cels. t. 81. Gärtner f. Carp. III. 162. t. 211. Bot. Mag. t. 3128. Bot. Reg. t. 1451. Alph. DC. Prodr. VII. 457. *Michauxia decandra* Fischer msc. — ⊙ — *Habitat in Persia.*

3085. Campanula Linn.

a. Medium Tournef.

3229. **Campanula medium** Linn. Spec. 236. DC. Prodr. VII. 460. — ⊙ — *Habitat in montosis Europae australis.*

3230. **Campanula Saxifraga** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 155. Suppl. 147. Alph. DC. Camp. 228. t. 20. f. 2. Prodr. VII. 460. — ♃ — *Habitat in editioribus Caucasi jugis.*

3231. **Campanula altaica** Alph. DC. Camp. 229. t. 10. f. 3. Prodr. VII. 461. *Campanula pilosa* Ledebour Ic. t. 209. — ♃ — *Habitat in altioribus montium altaicorum jugis.*

3232. **Campanula sarmatica** Ker in Bot. Reg. t. 237. Sims Bot. Mag. t. 2019. DC. Prodr. VII. 464. *Campanula betonicaefolia* Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 153. *Campanula gummifera* Willd. in Römer et Schult. Syst. V. 144. *Campanula commutata* Römer et Schult. Syst. V. 143. — ♃ — *Habitat in subalpinis Caucasi.*

3233. **Campanula lancifolia** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 154. DC. Prodr. VII. 464. — ♃ — *Habitat in Ponto et Caucaso.*

β. *Macrophylla. Campanula macrophylla* Sims Bot. Mag. t. 2019.

3234. **Campanula alliariaefolia** Willdenow Spec. I. 910. DC. Prodr. VII. 464. — ♃ — *Habitat in Cappadocia.*

3235. **Campanula Grossekii** Heufel in Flora 1833. n. 23. DC. Prodr. VII. 464. — ♃ — *Habitat in Hungaria.*

3236. **Campanula punctata** Lam. Dict. I. 586. Sims Bot. Mag. t. 1723. Schrank Hort. monac. t. 87. DC. Prodr. VII. 465. — ♃ — *Habitat in Sibiria orientali, in Dahuria et Japonia.*

3237. **Campanula divergens** Willd. Enum. I. 212. Alph. DC. Prodr. VII. 465. *Campanula spathulata* Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. III. 286. t. 258. non Sibth. — ⨀ — *Habitat in Banatu, Transylvania et Sibiria.*

3238 **Campanula sibirica** Linn. Spec. 236. Jacq. Flor. austr. t. 200. DC. Prodr. VII. 465. — ♃ — *Habitat in Europa orientali et Asia boreali.*

3239. **Campanula barbata** Linn. Spec. 236. Jacq. Observ. II. 14. t. 37. Sims Bot. Mag. t. 1258. DC. Prod. VII. 466. — ♃ — *Habitat in alpibus Europae.*

3240. **Campanula cichoracea** Sibthorp Flor. graec. t. 209. DC. Prodr. VII. 406. *Campanula capitata* Bot. Mag. t. 811. Reichenbach Iconogr. f. 782. — ⨀ — *Habitat in Thessalia.*

3241. **Campanula lingulata** Waldst. et Kitaibel Plant. rar. Hung. I. 65. t. 64. DC. Prodr. VII. 466. — ⨀ — *Habitat in Hungaria et Croatia.*

δ. **Eucodon** Alph. DC.

3242. **Campanula petraea** Linn. Spec. 236. DC. Prodr. VII. 466. — ♃ — *Habitat in monte Baldo.*

3243 **Campanula glomerata** Linn. Spec. 235. Flor. dan. t. 1328. E. B. t. 90. DC. Prodr. VII. 467. — ♃ — *Habitat in Europa et Asia media.*

ε. *Sparsiflora* DC. l. c. *Campanula aggregata* Willdenow Suppl. 10. Reichenb. Iconogr. f. 760. 761.

t. 7. Prodr. VII. 477. — ♃ — *Habitat in Caucaso et Iberia.*

3262. **Campanula persiaefolia** Linn. Spec. ed. I. 164. Flor. dan. t. 1087. DC. Prodr. VII. 479. — ♃ — *Habitat passim in Europa.*

β. *Alba.*

3263. **Campanula carpatica** Jacq. Hort. Vindob. I. 22. t. 57. Bot. Mag. t. 117. DC. Prodr. VII. 479. — ♃ — *Habitat in montibus Carpatis et in Transylvania.*

3264. **Campanula Infundibulum** Vest. in Röm. et Schult. Syst. V. 91. Ledebour Flor. alt. I. 239. *Campanula Steveni* Bieberst. Suppl. 138. DC. Prodr. VII. 479. *Campanula simplex* Steven in Mem. Soc. Mosq. III. 255. — ♃ — *Habitat in Caucaso, Iberia, Armenia.*

3265. **Campanula Rapunculus** Linn. Spec. 232. E. B. t. 283. Flor. dan. t. 1326. DC. Prodr. VII. 480. — ⨀ — *Habitat in Europa media et Caucaso.*

3086. **Specularia** Heist.

*** Gerontogeae.**

3266. **Specularia pentagona** Alph. DC. Camp. 344. Prodr. VII. 489. *Campanula pentagona* Linn. Spec. I. 239. Ker Bot. Reg. t. 55. — ⨀ — *Habitat in Oriente.*

3267. **Specularia falcata** Alph. DC. Camp. 345. Prodr. VII. 489. *Prismatocarpus falcatus* Tenore Flor. neap. I. 77. t. 20. *Campanula falcata* Römer et Schult. Syst. V. 154. — ♃ — *Habitat in Dalmatia, Italia et Graecia.*

3268. **Specularia Speculum** Alph. DC. Camp. 346. Prodr. VII. 490. *Campanula Speculum* Linn. Spec. 238. Curt. Bot. Mag. t. 102. Sibthorp Flor. graec. t. 216. *Prismatocarpus Speculum* Heritier Sert. 2. *Legouzia arvensis* Durand Flor. Bourg. I. 37. — ⨀ — *Habitat in Europa media et mediterranea.*

3269. **Specularia hybrida** Alph. DC. Camp.

349. Prodr. VII. 490. *Campanula hybrida* Linn. Spec. 239. E. B. t. 375. *Prismatocarpus hybridus* Heritier Sert. 2. —⊙— *Habitat in Europa media, in regione mediterranea et taurico-caucasica.*

3270. **Specularia biflora** Fisch. msc. —⊙— *Patria?*

** **Americanae.**

3271. **Specularia perfoliata** Alph. DC. Camp. 551. Prodr. VII. 490. *Campanula perfoliata* Linn. Spec. 239. *Campanula amplexicaulis* Michaux Flor. Bor. Amer. I. 108. —⊙— *Habitat per omnem Americam.*

3087. Trachelium Tournef.

3272. **Trachelium caeruleum** Linn. Hort. Upsal. 41. Lam. t. 126. Schkuhr t. 40. A. DC. Prodr. VII. 491. —♃— *Habitat in rupibus Africae boreali-occidentalis mediterraneae, Hispaniae et Italiae.*

3088. Adenophora Fisch.

3273. **Adenophora tricuspidata** Fischer in Römer et Schultes Syst. V. 158. Alph. DC. Camp. 355. Prodr. VII. 492. *Adenophora denticulata* Ledebour Suppl. Cat. Hort. Dorp. 1823. Reichenb. Hort. Bot. t. 2. *Campanula denticulata* Spreng. Syst. I. 735. —♃— *Habitat in Dahuria.*

3274. **Adenophora verticillata** Fischer Adumbr. Gen. Adenoph. p. 5. Alph. DC. Camp. 356. Prodr. VII. 492. Sweet Fl. Gard. II. t. 160. *Campanula verticillata* Pallas Reise. III. t. G. f. 1. —♃— *Habitat in Dahuria.*

3275. **Adenophora latifolia** Fisch. Adumbr. Gen. Adenoph. p. 6. Alph. DC. Camp. 357. Prodr. VII. 492. *Campanula Pereskia* Fisch. msc. *Campanula pereskiaefolia* Römer et Schult. Syst. V. 116. —♃— *Habitat in Dahuria.*

3276. **Adenophora Lamarckii** Fischer

Adumbr. Gen. Adenoph. p. 6. Alph. DC. Camp. 357. Prodr. VII. 492. — ♃ — *Habitat in Sibiria altaica.*

3277. **Adenophora liliifolia** Ledeb. Catalog. Hort. Dorpat. Alph. DC. Camp. 359. Prodr. VII. 493 *Campanula liliifolia* Linn. Spec. 233. Jacq. Hort. Schönbr. III. 46. t. 335. — ♃ — *Habitat in Europa orientali et Sibiria.*

3278. **Adenophora stylosa** Fischer Adumbr. Gen. Adenoph. p. 6. Alph DC. Camp. 360. Prodr. VII. 493. *Campanula stylosa* Lam. Dict. I. 580. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

3279. **Adenophora coronopifolia** Fischer Adumbr. Gen. Adenoph. p. 5. Reichenb. Hort. Bot. t. 23. Alph. DC. Camp. 362. Prodr. VII. 493. *Adenophora Fischeri* Don. *Campanula coronopifolia* Römer et Schult. Syst. V. 157. *Campanula Fischeriana* Sprengel Cur. post. 77. — ♃ — *Habitat in Dahuria et Sibiria altaica.*

3280. **Adenophora Gmelini** Fisch. Adumbr. Gen. Adenophor. p. 6. Alph. DC. Camp. 363. Prodr. VII. 493. (Gmelin Sibir. III. 162. t. 33.) — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

3281. **Adenophora marsupiiflora** Fischer Adumbr. Gen. Adenoph. p. 5. Reichenb. Hort. Bot. t. 15. *Adenophora coronata* Alph. DC. Camp. 363. Prodr. VII. 494. *Campanula coronata* Ker in Bot. Reg. t. 149. *Campanula marsupiiflora* Römer et Schult. Syst. V. 116. *Campanula stenanthina* Ledebour Mem. Academ. Petrop. V. 525. — ♃ — *Habitat in Dahuria et Sibiria altaica.*

3089. Musschia Dumort.

3282. **Musschia aurea** Dumortier Comment. Bot. 28. Alph. DC. Prodr. VII. 495. *Campanula aurea* Linn. f. Suppl. 141. Jacq. Hort. Schönbr. t. 472. Venten. Malm. t. 116. Ker in Bot. Reg. t. 57. — ♃ — *Habitat in insulis Madera et Teneriffa.*

Ordo LXXVII. Stylideae.

3093. **Stylidium** R. Br.

3283. **Stylidium fruticosum** R. Brown Prodr. 570. Reichenb. Magaz. t. 39. DC. Prodr. VII. 335. — ♄ — *Habitat in Novae Hollandiae ora australi.*

3284. **Stylidium adnatum** R. Brown Prodr. 572. Bot. Reg t. 914. Bot. Mag. t. 2598. DC. Prodr. VII. 337. — ☉ — *Habitat in Nova Hollandia austro-occidentali.*

Ordo LXXVIII. Rubiaceae.

Tribus I. Stellatae.

3098. **Vaillantia** DC.

3285. **Vaillantia muralis** Linn. Spec. 1490. DC. Prodr. IV. 614. — ☉ — *Habitat in muris et agris aridis Europae australis.*

3286. **Vaillantia hispida** Linn. Spec. 1490. DC. Prodr. IV. 614. — ☉ — *Habitat in sepibus et agris Teneriffae, Hispaniae australis, Barbariae et Italiae.*

3099. **Callipeltis** Stev.

3287. **Callipeltis Cucullaria** Steven Obs. Plant. ross. 69. DC. Prodr. IV. 613. *Vaillantia Cucullaria* Linn. Amoen. Academ. IV. 295. Lam. Ill. t. 843. f. 2. — ☉ — *Habitat in agris asperis Cappadociae, Persiae, Iberiae et Hispaniae.*

3100. **Galium** Scop.

a. **Leiogalium.**

3288. **Galium sylvaticum** Linn. Spec. 155. DC. Prodr. IV. 593. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Europae.*

3289. **Galium linifolium** Lam. Dict. II. 578. DC. Prodr. IV. 593. — ♃ — *Habitat in umbrosis Delphinatus et Galloprovinciae.*

3290. **Galium Mollugo** Linn. Spec. 155. E. B. t. 1623. Flor. dan. t. 425. DC. Prodr. IV. 596. — ♃ — *Habitat ad sepes Enropae totius.*

3291. **Galium palustre** Linn. Spec. 153. E. B. t. 1857. DC. Prodr. IV. 597. — ♃ — *Habitat in fossis paludosis Europae.*

b. **Platygalium.**

3292. **Galium rubioides** Linn. Spec. 152. DC. Prodr. IV. 599. — ♃ — *Habitat in pratis sylvaticis Europae imprimis orientalis et Asiae mediae.*

3293. **Galium valantioides** Bieberst. Flor. Taur. caucas. I. 102. DC. Prodr. IV. 599. — ♃ — *Habitat in rupibus subalpinis Caucasi.*

c. **Trichogalium.**

3294. **Galium boreale** DC. Fl. fr. Suppl. 498. Prodr. IV. 600. — ♃ — *Habitat in uliginosis montanis Europae totius.*

3295. **Galium maritimum** Linn. Mant. 38. DC. Prodr. IV. 602. — ♃ — *Habitat in rupestribus apricis Galliae australis et Orientis.*

d. **Erythrogalium.**

3296. **Galium rubrum** Linn. Spec. 156. DC. Prodr. IV. 603. — ♃ — *Habitat in dumetis Europae australioris.*

3297. **Galium purpureum** Linn. Spec. 156. DC. Prodr. IV. 603. — ♃ — *Habitat in collibus siccis Europae australioris.*

e. **Xanthogalium.**

3298. **Galium verum** Linn. Spec. 155. DC. Prodr. IV. 603. — ♃ — *Habitat in pratis et dumetis Europae et Asiae mediae.*

f. **Maschaligalium.**

3299. **Galium tauricum** Röm. et Schult. Syst. III. 250. DC. Prodr. IV. 605. *Valantia taurica* Willd. Spec. IV. 951. — ♃ — *Habitat in asperis Tauriae.*

3300. **Galium vernum** Scopoli Flor. carn. ed. 2. n. 144. t. 2. DC. Prodr. IV. 605. *Valantia glabra* Linn. Spec. 1491. Waldstein et Kit. Plant. rar. Hung. t. 32. — ♃ — *Habitat in herbidis Europae mediae et australis.*

g. **Cruciata.**

3301. **Galium pedemontanum** Allioni Auct. 2. DC. Prodr. IV. 605. *Valantia pedemontana* Bellardi App. 46. t. 5. — ⊙ — *Habitat in siccis lapidosis Europae australioris.*

h. **Leiaparine.**

3302. **Galium divaricatum** Lam. Dict. II. 580. DC. Ic. Plant. Gall. rar. t. 24. DC. Prodr. IV. 607. — ⊙ — *Habitat in aridis sabulosis Galliae et Siciliae.*

3303. **Galium anglicum** Hudson Flor. angl. I. 69. DC. Prodr. IV. 607. — ⊙ — *Habitat in arenosis Europae mediae.*

i. **Euaparine.**

3304. **Galium tricorne** Withering Flor. brit. ed. 2. 153. E. B. t. 1641. DC. Prodr. IV. 608. — ⊙ — *Habitat in arvis Europae totius.*

3305. **Galium Aparine** Linn. Spec. 157. E. B. t. 816. — ⊙ — *Habitat in cultis hemisphaerae borealis amphigeum.*

k. **Aspera.**

3306. **Galium verticillatum** Danth. in Lam. Dict. II. 585. DC. Prodr. IV. 610. — ⊙ — *Habitat in asperis Siciliae, Galloprovinciae et Tauriae.*

3101. **Rubia** Tournef.

3307. **Rubia cordifolia** Linn. Mant. 197. DC. Prodr. IV. 588. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

3308. **Rubia tinctorum** Linn. Spec. 158. Hayne Arzneigew. XI. t. 5. Schkuhr Handb. t. 23. DC. Prodr. IV. 589. — ♃ — *Habitat in Oriente et australiore Europa spontanea, ob radicem colorem rubrum tenacissimum praebentem etiam culta.*

Cultura Rubiae maximi hodie apud Gallos momenti, ob ingentem coloris rubri in tingendis braccis militaribus usum.

Offic. Radix Rubiae.

3309. **Rubia peregrina** Linn. Spec. 158. E. B. t. 851. DC. Prodr. IV. 589. *Rubia anglica* Hudson Angl. I. 54. — ♃ — *Habitat in asperis Europae mediae et australis.*

3310. **Rubia Bocconi** Petagna Instit. II. 255. Tenore Flor. neap. t. 10. DC. Prodr. IV. 590. — ♃ — *Habitat in rupibus calcareis agri Neapolitani et Siciliae.*

3102. Crucianella Linn.

3311. **Crucianella hispidula** Fischer et Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. 1835. I. 25. — ⊙ — *Habitat in monte Ararat.*

3312. **Crucianella angustifolia** Linn. Spec. 157. Smith Exot. Bot. t. 109. DC. Prodr. IV. 586. — ⊙ — *Habitat in siccis lapidosis regionis mediterraneae et Tauriae.*

3313. **Crucianella patula** Linn. Spec. 602. DC. Prodr. IV. 587. *Crucianella pentandra* Dufour in Römer et Schultes Syst. III. 532. — ⊙ — *Habitat in saxosis Hispaniae.*

3314. **Crucianella suaveolens** C. A. Meyer Verz. cauc. Pflanz. 52. — ⊙ — *Habitat in lapidosis montium Talüsch.*

3315. **Crucianella gilanica** Trinius in Mem. Academ. Petrop. 1818. p. 493. t. 12. DC. Prodr. IV. 587. — ♃ — *Habitat in Persiae provincia Gilan.*

3316. **Crucianella stylosa** Trinius in Mem. Academ. Petersb. 1818. p. 485. t. 11. DC. Prodr. IV. 587. Lindley in Bot. Reg. 1839. t. 55. — ♃ — *Habitat in Persiae provincia Gilan.*

3317. **Crucianella molluginoides** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 106. Cent. II. t. 65. DC. Prodr. IV. 587. *Asperula tubiflora* Hort. — ♃ — *Habitat in Caucaso, Armenia et Hungaria.*

3318. **Crucianella aspera** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 107. DC. Prodr. IV. 588. *Crucianella prostrata* Adams in Weber et Mohr Cat. I. 46. —♃— *Habitat in Iberia prope Tiflim.*

3319. **Crucianella glomerata** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 107. DC. Prodr. IV. 588. —♃— *Habitat in collibus lapidosis Iberiae.*

3103. Asperula Linn.

3320. **Asperula tinctoria** Linn. Spec. 150. DC. Prodr. IV. 582. — ♃ — *Habitat in collibus saxosis Europae.*

3321. **Asperula cynanchica** Linn. Spec. 151. E. B. t. 33. DC. Prodr. IV. 582. — ♃ — *Habitat in siccis glareosis Europae.*

3322. **Asperula longiflora** Waldstein et Kitaibel Plant. Hung. rar. II. t. 150. DC. Prodr. IV. 583. — ♃ — *Habitat in asperis apricis montium Europae australioris.*

3323. **Asperula montana** Willdenow Enum. 151. DC. Prodr. IV. 583. — ♃ — *Habitat in collibus sylvaticis Hungariae.*

3324. **Asperula littoralis** Sibthorp Flor. graec. t. 122. DC. Prodr. IV. 584. — ♃ — *Habitat ad Ponti Euxini littora.*

3325. **Asperula odorata** Linn. Spec. 150. Flor. dan. t. 562. DC. Prodr. IV. 585. — ♃ — *Habitat in dumetis et sylvis Europae totius.*

3326. **Asperula Aparine** Schott in Besser Flor. Galic. I. 114. Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 102. DC. Prodr. IV. 585. — ♃ — *Habitat in uliginosis Europae et Asiae mediae.*

3327. **Asperula galioides** Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 101. DC. Prodr. IV. 585. *Galium glau-*

cum Linn. Spec. 156. Jacq. Flor. austr. t. 81. — ♃ — *Habitat in apricis, imprimis calcareis Europae mediae.*

Var. β. *Tyraica. Asperula tyraica* Besser Enum. cont. 42.

3328. **Asperula humifusa** Bieberst. Suppl. 105. DC. Prodr. IV. 585. *Galium humifusum* Bieberst. Flor. Taur. cauc. I. 104. — ♃ — *Habitat in sterilibus apricis Podoliae, Tauriae et Caucasi.*

3104. **Sherardia** Dillen.

3329. **Sherardia arvensis** Linn. Spec. 149. Flor. dan. t. 439. E. B. t. 891. Schkuhr Handb. t. 22. DC. Prodr. IV. 581. — ⊙ — *Habitat in agris Europae et Tauriae frequens.*

Tribus II. Anthospermeae.

3105. **Anthospermum** Linn.

3330. **Anthospermum aethiopicum** Linn. Spec. 1511. Gärtner f. Carp. III. t. 195. DC. Prodr. IV. 580. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei et Madagascaria.*

3108. **Phyllis** Linn.

3331. **Phyllis Nobla** Linn. Spec. 335. DC. Prodr. IV. 579. — ♄ — *Habitat in insulis Canariis.*

Tribus III. Spermacoceae.

3117. **Serissa** Comm.

3332. **Serissa foetida** Commers. ex Jussieu in Mem. Mus. VI. 395. DC. Prodr. IV. 575. *Lycium japonicum* Thunberg Flor. jap. 93. t. 17. Curtis Bot. Mag. t. 361. *Lycium foetidum* Linn. f. Suppl. 150. *Buchozia coprosmoides* Heritier msc. — ♄ — *Habitat in China, Japonia, Cochinchina.*

3120. **Borreria** C. F. W. Mey.

3333. **Borreria parviflora** Meyer Esseq. 83. t. 1. DC. Prodr. IV. 544. *Spermacoce aspera* Vahl Eclog. 10. —⊙— *Habitat in America tropica.*

3334. **Borreria advena** Fisch. —⊙— *Patria ignota.*

3121. **Spermacoce** G. F. W. Meyer.

3335. **Spermacoce tenuior** Linn. Spec. 147. DC. Prodr. IV. 552. —⊙— *Habitat in Caribaeis, Peruvia et Carolina.*

3336. **Spermacoce scabra** Willdenow Spec. I. 572. DC. Prodr. IV. 555. —⊙— *Habitat in Malabaria.*

3123. **Diodia** Linn.

3337. **Diodia dasycephala** Cham. et Schlecht. in Linnaea II. 348. DC. Prodr. IV. 565. — ♃ — *Habitat in Brasilia meridionali.*

3125. **Crusea** Cham. et Schlecht.

3338. **Crusea rubra** Cham. et Schlechtend. in Linnaea V. p. 165. DC. Prodr. IV. 567. *Crusea strigosa* Hort. monac. *Spermacoce rubra* Jacq. Hort. Schönbr. III. 3. t. 256. *Spermacoce strigosa* Sims Bot. Mag. t. 1558. —⊙— *Habitat in Vera Cruz.*

3126. **Richardsonia** Kunth.

3339. **Richardsonia scabra** St. Hil. Plant. us. t. 8. DC. Prodr. IV. 567. *Richardsonia pilosa* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. t. 279. *Richardia scabra* Linn. Spec. 470. *Richardia pilosa* Ruiz et Pavon Flor. peruv. III. 50. — ♃ — *Habitat in cultis arenosis Americae tropicae.*

Herbae Brasiliensibus *Poaya do campo* dictae radix *Ipecacuanhae amylaceae* s. *albae* nomine inter pharmaca emetica celebris.

3127. **Mitracarpum** Zuccar.

3340. **Mitracarpum villosum** Cham. et Schlecht. 1828. p. 363. DC. Prodr. IV. 572. *Spermacoce hirta* Jacq. Ic. rar. t. 308. — ⊙ — *Habitat in Jamaica.*

3138. **Cephalanthus** Linn.

3341. **Cephalanthus occidentalis** Linn. Spec. 138. Duham. Arbr. I. t. 54. Schkuhr t. 21. et 5. b. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

Tribus IV. Psychotrieae.

3147. **Psychotria** Linn.

3342. **Psychotria undata** Jacq. Hort. Schönbr. III. 5. t. 260. DC. Prodr. IV. 513. — ♄ — *Habitat in insulis Bahamensibus.*

3152. **Coffea** Linn.

3343. **Coffea arabica** Linn. Spec. 245. Sims Bot. Mag. t. 1303. DC. Prodr. IV. 499. — ♄ — *Habitat in Arabia felici et Aethiopia, unde in Indiam orientalem et in Americam tropicam transplantata.*

3161. **Ixora** Linn.

3344. **Ixora stricta** Roxburgh Flor. ind. I. 384. DC. Prodr. IV. 486. *Ixora coccinea* Curtis Bot. Mag. t. 169. non Linn. *Ixora flammea* Salisbury Prodr. 62. *Ixora speciosa* Willdenow Enum. 157. — ♄ — *Habitat in Asia tropica.*

3167. **Chiococca** P. Brown.

3345. **Chiococca racemosa** Jacq. Amer. 68. Linn. Spec. 246. Andrews Bot. Reposit. t. 284. Hooker Exot. Flor. t. 93. DC. Prodr. IV. 482. — ♄ —

Habitat in collibus sylvaticis Antillarum, Mexici et Carthagenae.

Baccae niveae, unde colonis Anglis in Jamaica vulgo Snowberry, ex quo Patricius Brown graecum Chiococca fecit.

Tribus V. Hamelieae.

3224. **Sabicea** Aubl.

3346. **Sabicea cinerea** Aublet Guian. I. 192. t. 75. DC. Prodr. IV. 439. *Schwenkfeldia cinerea* Swartz Flor. Ind. occid. I. 452. — ♄ — ○ — *Habitat in Guiana.*

3228. **Hamelia** Jacq.

3347. **Hamelia patens** Jacq. Amer. 72. t. 50. Linn. Spec. 246. Smith Exot. Bot. t. 24. Gärtner f. Carp. III. t. 196. f. 3. DC. Prodr. IV. 441. — ♄ — *Habitat in montanis Antillarum et continentis Americae tropicae.*

Tribus VI. Hedyoteae.

3240. **Hedyotis** Lam.

Oldenlandia Linn.

3348. **Hedyotis biflora** Smith in Rees Cyclop. 17. n. 15. *Hedyotis diffusa* Willd. Spec. I. 566. *Oldenlandia biflora* Linn. Spec. 174. DC. Prodr. IV. 426. — ⊙ — *Habitat in Asia tropica.*

3349. **Hedyotis lactea** Willd. Enum. I. 149. *Hedyotis cymosa* Spreng. Syst. I. 413. *Oldenlandia lactea* Cham. et Schlecht. in DC. Prodr. IV. 427. — ⊙ — *Habitat in India orientali.*

3350. **Hedyotis Deppeana.** *Oldenlandia Deppeana* Cham. et Schlecht. in DC. Prodr. IV. 428. *Gerontogea Deppeana* Link et Otto Ic. select. t. 36. — ⊙ — *Habitat in Mexico.*

Tribus VII. Rondeletieae.

3254. **Rondeletia** Linn.

3351. **Rondeletia americana** Linn. Spec. 243. DC. Prodr. IV. 408. — ♄ — *Habitat in Cuba.*

Tribus VIII. Cinchoneae.

3266. **Manettia** Mutis.

3352. **Manettia glabra** Chamisso et Schlecht. in Linnaea IV. 159. DC. Prodr. IV. 363. — ♃ ○ — *Habitat in Brasiliae meridionalis frutetis ripariis.*

3274. **Cinchona** Linn.

3353. **Cinchona pubescens** Vahl in Act. soc. h. n. hafn. I. 19. t. 2. DC. Prodr. IV. 352. — ♄ — *Habitat in Peruvia.*

3276. **Hymenodictyon** Wall.

3354. **Hymenodictyon thyrsiflorum** Wallich in Roxburgh Flor. ind. II. 151. DC. Prodr. IV. 358. *Cinchona thyrsiflora* Hort. — ♄ — *Habitat in Bengalo.*

Tribus IX. Gardenieae.

3286. **Catesbaea** Linn.

3355. **Catesbaea spinosa** Linn. Spec. 159. Lam. t. 67. f. 1. Curtis Bot. Mag. t. 131. DC. Prodr. IV. 401. — ♄ — *Habitat in insulis Bahamensibus.*

3305. **Gardenia** Ellis.

3356. **Gardenia florida** Linn. Spec. 305. Ker in Bot. Reg. t. 449. DC. Prodr. IV. 379. *Gardenia jasminoides* Solander in Philosoph. Transact. LII.

t. 20. — ♄ — *Habitat sponte in China, in India orientali, Japonia et Capite bonae spei passim culta.*

3357. **Gardenia radicans** Thunb. Dissert. Gard. n. 1. t. 1. f. 1. Andrews Bot. Rep. t. 491. Ker in Bot. Reg. t. 73. DC. Prodr. IV. 379. — ♄ — *Habitat in Japonia, in India passim culta.*

3313. Mussaenda Linn.

3358. **Mussaenda speciosa** Poiret Suppl. IV. 37. DC. Prodr. IV. 370. *Macrocnemum speciosum* Jacq. Hort. Schönbr. I. 19. t. 43. — ♄ — *Habitat in Caracas.*

3315. Burchellia R. Br.

3359. **Burchellia capensis** R. Brown in Ker Bot. Reg. t. 466. DC. Prodr. IV. 369. *Lonicera bubalina* Linn. f. Suppl. 146. *Cephaëlis bubalina* Persoon Encheir. I. 202. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei, ubi ob ligni duritiem vulgo Buffelhorn dicitur.*

Ordo LXXIX. Lonicereae.

Subordo I. Lonicereae verae.

3334. Symphoricarpus Dill.

3360. **Symphoricarpus vulgaris** Michaux Flor. Bor. Am. 1. 106. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

β. *Variegatus.*

3361. **Symphoricarpus racemosus** Michaux Flor. Bor. Am. 1. 107. Bot. Mag. t. 2211. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

β. *Glaucus.*

3335. Leycestria Wall.

3362. **Leycestria formosa** Wallich Plant.

Subordo II. Sambucineae.

3340. **Viburnum** Linn.

a. Solenotinus DC.

3385. **Viburnum dahuricum** Pallas Flor. ross. 50. DC. Prodr. IV. 328. — ♄ — *Habitat in Dahuria.*

b. Opulus Tournef.

3386. **Viburnum Oxycoccos** Pursh Flor. Bor. Am. 1. 203. — ♄ — *Habitat in sylvis uliginosis Americae borealis.*

3387. **Viburnum edule** Pursh Flor. Bor. Am. 1. 203. — ♄ — *Habitat in ripis fluminum Americae borealis.*

3388. **Viburnum Opulus** Linn. Spec. 384. E. B. t. 332. Flor. dan. t. 661. — ♄ — *Habitat in sepibus et dumetis Europae et Caucasi.*

Var. β. *Roseum.* — γ. *Xanthocarpum.*
Offic. exolet. Sambucus aquatica.

c. Tinus.

3389. **Viburnum pubescens** Pursh Flor. Bor. Am. 1. 202. — ♄ — *Habitat in rupibus sylvarum Americae borealis.*

3390. **Viburnum dentatum** Linn. Spec. 384. Jacq. Hort. Vindob. 1. t. 36. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis Americae borealis.*

3391. **Viburum lantanoides** Michaux Flor. Bor. Am. 1. 179. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis Americae borealis.*

3392. **Viburum Lantana** Linn. Spec. 384. Jacq. Flor. austr. t. 341. — ♄ — *Habitat in sepibus Europae et Caucasi.*

3393. **Viburnum laevigatum** Willd. Spec. I. 1491. — ♄ — *Habitat in Carolina et Virginia.*

3394. **Viburnum Lentago** Linn. Spec. 384. Schmidt Oesterr. Baumz. III. t. 176. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

3395. **Viburnum prunifolium** Linn. Spec. 383. Guimp. Holzart. t. 101. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

3396. **Viburnum pyrifolium** Poiret Dict. V. 658. — ♄ — *Habitat in Pensylvania.*

3397. **Viburnum Tinus** Linn. Spec. 383. Bot. Mag. t. 38. — ♄ — *Habitat in nemorosis Europae australis.*

3341. Sambucus Linn.

3398. **Sambucus Ebulus** Linn. Spec. 385. Flor. dan. t. 1156. — ♃ — *Habitat in Europae et Caucasi cultis.*

Offic. Baccae Ebuli.

3399. **Sambucus canadensis** Linn. Spec. 385. Schmidt Oesterr. Baumz. t. 142. — ♄ — *Habitat in humidis Americae borealis.*

3400. **Sambucus nigra** Linn. Spec. 385. E. B. t. 476. — ♄ — *Habitat in Europa, Caucaso et Sibiria.*

Var. β. *Alba.* — γ. *Viridis.* — δ. *Rotundifolia.* — ε. *Heterophylla.* — ζ. *Albo-variegata.* — η. *Luteo-variegata.* — θ. *Monstrosa.*

Officin. Flores et baccae Sambuci.

3401. **Sambucus racemosa** Linn. Spec. 386. Jacq. Ic. rar. 1. t. 59. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis Europae mediae et australis.*

Var. β. *Praecox.* — γ. *Laciniata* Koch.

Ordo LXXX. Jasmineae.

3342. Jasminum Tournef.

* **Folia simplicia.**

3402. **Jasminum Sambac** Aiton Hort. kew. edit. 1. I. 8. Willdenow Spec. I. 35. Röm. et Schult. Syst. I. 78. Desfont. in Annal. Mus. IV. 20. Ker Bot. Reg. t. 1. Sims Bot. Mag. t. 1785. *Nyctanthes Sambac* Linn. Spec. edit. 1. p. 8. *Mogorium Sambac* Lam.

Dict. IV. 210. Illustr. t. 6. f. 1. — ♄ — *Habitat in Asia tropica.*

3403 **Jasminum hirsutum** Willdenow Spec. I. 36. Vahl Enum. I. 30. Smith Exot. Bot. II. 117. t. 118. Römer et Schult. Syst. I. 79. Mant. I. 85. Sims Bot. Mag. t. 1991. Ker Bot. Reg. t. 15. *Jasminum pubescens* Willdenow Spec. I. 37. Vahl Enum. I. 27. Roxburgh Flor. Ind. edit. Wallich I. 90. *Jasminum multiflorum* Andrews Bot. Reposit. t. 496. Römer et Schult. Syst. I. 81. Mant. I. 89. *Nyctanthes hirsuta* Linn. Spec. 8. *Nyctanthes pubescens* Retz Observ. V. 9. — ♄ — *Habitat in Asia tropica.*

3404. **Jasminum gracile** Andrews Bot. Reposit. t. 127. R. Brown Prodr. 521. Ker Bot. Reg. t. 606. Römer et Schult. Syst. I. 78. *Jasminum geniculatum* Venten. Choix t. 8. — ♄ — *Habitat in insula Norfolk et in Nova Hollandia tropica et orientali.*

*** Folia ternata opposita.**

3405. **Jasminum auriculatum** Vahl Symb. III. 1. Enum. I. 30. Willd. Spec. I. 38. Ker Bot. Reg. t. 264. Römer et Schult. Syst. I. 83. Mantiss. I. 90. *Jasminum trifoliatum* Persoon Encheir. I. 7 *Mogorium trifoliatum* Lam. Illustr. I. 24. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

3406. **Jasminum azoricum** Linn. Spec. 9. Willdenow Spec. I. 39. Vahl Enum. I. 31. Römer et Schult. Syst. I. 83. Ker Bot. Reg. t. 89. Sims Bot. Mag. t. 1889. — ♄ — *Habitat in insulis Azoricis.*

*** Folia ternata alterna.**

3407. **Jasminum fruticans** Linn. Spec. 9. Willdenow Spec. I. 39. Vahl Enum. I. 33. Römer et Schult. Syst. I. 84. Curtis Bot. Mag. t. 461. Schmidt Baumz. t. 148. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

3408. **Jasminum humile** Linn. Spec. 9. Willdenow Spec. I. 40. Vahl Enum. I 33. Römer et Schultes Syst. I. 84. Ker Bot. Reg. t. 350. Schmidt Baumz. t. 149. — ♄ — *Habitat in Madera.*

*** Folia pinnata, opposita.**

3409. **Jasminum officinale** Linn. Spec. 9. Willdenow Spec. I. 40. Vahl Enum. I. 34. Römer et Schultes Syst. I. 85. Schmidt Baumz. t. 150. — ♄ — *Patria ignota, plantae nunc in Europa australi eferatae.*

*** Folia pinnata, alterna.**

3410. **Jasminum revolutum** Sims in Bot. Mag. t. 1731. Ker in Bot. Reg. t. 178. Römer et Schult. Mant. I. 93. *Jasminum chrysanthemum* Roxburgh Flor. Ind. edit. Wallich I. 98. Römer et Schult. Mant. I. 91. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

3411. **Jasminum Wallichianum** Lindley in Bot. Reg. t. 1409. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

Ordo LXXXI. Oleaceae.

Subordo I. Oleineae.

3346. Chionanthus Linn.

3412. **Chionanthus virginiana** Linn. Spec. 11. Duham. Arbr. I. 165. t. 63. — ♄ — *Habitat in America boreali.*

3348. Noronhia Stadtm.

3413. **Noronhia emarginata** Poiret in Dict. encyclop. XII. 108. Bojer in Hooker Bot. Miscell. II. 167. t. 88. *Noronhia chartacea* Stadtm. msc. *Noronhia Binia* Thouars Gen. madagasc. n. 7. Römer et Schult. Syst. I. 72. *Binia* Noronh. msc. *Olea emarginata* Lam. Dict. IV. 545. t. 8. f. 2. Römer et Schult. Syst. I. 70. — ♄ — *Arbor madagascariensis, in patria triginta-pedalis, in insula Mauritii ob drupae carnem edulem sub nomine »Ponay des Indes« culta.*

3349. Olea Linn.

3414. **Olea europaea** Linn. Spec. 11. Will-

denow Spec. I. 44. Sibthorp Flor. graec. t. 3. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 298. — ♄ — *Habitat in Europa australi, passim culta.*

β. Buxifolia Aiton Hort. kew. I. 12. — *Colitur passim in hortis Europae australis.*

3415. **Olea verrucosa** Link Enum. 1. 33. Römer et Schult. Mant. I. 76. Spreng. Syst. I. 34. *Olea europaea* Thunb. Prodr. I. 2. Flor. cap. I. 38. *Olea europaea verrucosa* Willdenow Spec. I. 44. Vahl Enum. I. 40. Römer et Schult. Syst. I. 69. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3416. **Olea excelsa** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 14. ed. 2. I. 22 Vahl Symb. III. 3. Enum. I. 42. Willd. Spec. I. 46. Römer et Schult. Syst. I. 70. *Olea exasperata* Jacq. Hort. Schönbr. t. 251. — ♄ — *Habitat in Madeira.*

3417. **Olea fragrans** Thunberg Flor. japon. 18. t. 2. Willd. Spec. I. 46. Vahl Enum. I. 43. Sims Bot. Mag. t. 1552. Römer et Schult. Syst. I. 71. Roxburgh Flor. ind. edit. Wallich I. 71. *Osmanthus fragrans* Loureiro Flor. cochinch. 35. *Moksei* Kaempfer Amoen. exot. 844. *Quaj-sa* Osbeck Reise 250. — ♄ — *Habitat in Cochinchina, China et Japonia.*

3349. **Phillyrea** Tournef.

3418. **Phillyrea latifolia** Linn. Spec. 11. Willdenow Enum. I. 12. Sibthorp. Flor. graec. t. 2. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 299. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

3419. **Phillyrea media** Linn. Spec. 11. Willdenow Enum. I. 11. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 299. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

3420. **Phillyrea angustifolia** Linn. Spec. 10. Willdenow Enum. I. 11. Mertens et Koch Deutschl. Flor. I. 300. — ♄ — *Habitat in Europa australi.*

3352. **Ligustrum** Linn.

3421. **Ligustrum vulgare** Linn. Spec. 10.

E. B. t. 764. Flor. dan. t. 1141. Schmidt Baumz. t. 147. — ♄ — *Habitat per Europam omnem.*

Var. β. *Chlorocarpum.* — γ. *Italicum* Mill.

3422. **Ligustrum japonicum** Thunb. Flor. japon. 17. t. 1. Vahl Enum. I. 35. — ♄ — *Habitat in Japonia.*

3423. **Ligustrum nepalense** Wallich in Roxburgh Flor. Ind. I. 151. Plant. As. rar. III. 17. t. 231. Hooker in Bot. Mag. t. 2921. *Ligustrum spicatum* Hamilt. in Don Nepal. 107. — ♄ — *Habitat in montibus Nepaliae.*

Subordo II. Fraxineae.

3353. **Fraxinus** Tournef.

α. **Bumelioides** Endl.

3424. **Fraxinus excelsior** Linn. Spec. 1509. Flor. dan. t. 969. E. B. t. 1692. — ♄ — *Habitat in sylvis montanis Europae totius.*

Var. β *Pendula* Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 475. — γ. *Aurea* Willdenow Enum. 1059. — δ. *Crispa* Bosc. *Fraxinus atrovirens* Desfont. Arbr. I. 104. — ε. *Jaspidea* Willd. Enum. 1059. — ζ. *Verrucosa* Desfont. Arbr. I. 104. — η. *Variegata.* — θ. *Viridis.*

3425. **Fraxinus nana** Bosc. Willdenow Enum. 1059. — ♄ — *Patria ignota.*

3426. **Fraxinus heterophylla** Vahl Enum. I. 53. *Fraxinus simplicifolia* Willdenow Baumz. 121. t. 3. f. 3. E. B. t. 2476. *Fraxinus monophylla* Desfont. Arbr. I. 102. — ♄ — *Crescit in sylvis Angliae.*

Var. β. *Angustifolia.*

3427. **Fraxinus parvifolia** Willdenow Spec. IV. 1101. Baumz. 155. t. 2. f. 2. Tenore Syllog. 9. — ♄ — *Habitat in Sicilia et Graecia.*

Arbor mannifera, Siculis vulgo Frassino mistino et Frassino lentisco dicta.

3428. **Fraxinus tamariscifolia** Vahl Enum. I. 52. *Fraxinus lentiscifolia* Desfont. Cat. Hort. Paris.

52. Willdenow Spec. IV. 1101. *Fraxinus aleppensis* Plukn. Phyt. 182. f. 4. — 5 — *Habitat prope Aleppum.*

Var. β. *Pendula.*

3429. **Fraxinus sambucifolia** Vahl Enum. I. 51. Willdenow Spec. IV. 1099. Michaux f. Arbr. Am. III. 122. — 5 — *Habitat in America boreali, a Canada ad Carolinam.*

3430. **Fraxinus oxycarpa** Willdenow Spec. IV. 1100. *Fraxinus oxyphylla* Bieberst. Flor. Taur. cauc. II. 450. — 5 — *Habitat in Caucaso.*

3431. **Fraxinus angustifolia** Vahl Enum. I. 52. Willdenow Spec. IV. 1100. — 5 — *Habitat in Hispania.*

b. Melioides Endl.

3432. **Fraxinus juglandifolia** Lam. Dict. II. 543. Willdenow Spec. IV. 1104. — 5 — *Habitat in America boreali, a Canada ad Carolinam.*

3433. **Fraxinus Caroliniana** Lam. Dict. II. 543. Vahl Enum. I. 51. Willdenow Spec. IV. 1103. — 5 — *Habitat in America boreali, a Pensylvania ad Carolinam.*

3434. **Fraxinus pubescens** Walter Flor. Carolin. 254. Vahl Enum. I. 51. Willdenow Spec. IV. 1103. *Fraxinus tomentosa* Michaux f. Arbr. Am. III. 112. — 5 — *Habitat in America boreali.*

Var. β. *Longifolia* Willdenow Spec. IV. 1103.

3435. **Fraxinus acuminata** Lam. Dict. II. 542. *Fraxinus americana* Willd. Spec. IV. 1102. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3436. **Fraxinus quadrangulata** Michaux Flor. Bor. Amer. II. 255. Vahl Enum. I. 50. Willdenow Spec. IV. 1104. Michaux f. Arbr. Am. III. 118. *Fraxinus tetragona* Cels. — 5 — *Habitat in Americae borealis provinciis Ohio, Kentucky et Tenessee.*

3437. **Fraxinus platycarpa** Vahl Enum. I. 49. Michaux Flor. Bor. Amer. II. 256. *Fraxinus Caroliniana* Catesby Carol. t. 80. non Lam. — 5 — *Habitat in Virginia et Carolina.*

3438. **Fraxinus expansa** Willdenow Baumz. 150. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3439. **Fraxinus rubicunda** Bosc ex Sprengel Syst. I 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3440. **Fraxinus Richardi** Bosc ex Sprengel Syst. I. 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3441. **Fraxinus viridis** Bosc ex Sprengel Syst. I. 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3442. **Fraxinus ovata** Bosc. ex Sprengel Syst. I. 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3443. **Fraxinus elliptica** Bosc ex Sprengel Syst. I. 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3444. **Fraxinus nigra** Bosc ex Sprengel Syst. I. 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

3445. **Fraxinus pannosa** Venten. ex Sprengel Syst. I. 96. — 5 — *Habitat in America boreali.*

c. **Ornus** Pers.

3446. **Fraxinus americana** Linn. Spec. 1510. *Ornus americana* Pursh Flor. Bor. Am. I. 9. Nuttall Gen. I. 6. — 5 — *Habitat in Virginia et Marylandia.*

3447. **Fraxinus rotundifolia** Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 445. Vahl Enum. I. 49. Willdenow Spec. IV. 1105. Baumz. 145. t. 2. f. 1. — 5 — *Habitat in Calabria et Graecia.*

3448. **Fraxinus Ornus** Linn. Spec. 1510. Sibthorp Flor. graec. t. 4. *Ornus europaea* Persoon Encheir. I. 9. — 5 — *Habitat in Europa australi.*

3354. **Fontanesia** Labill.

3449. **Fontanesia phyllireoides** Labill. Syr. Decad. I. 9. t. 1. — 5 — *Habitat in Syria, inter Loodiceam et montem Cassium.*

3355. **Syringa** Linn.

3450. **Syringa vulgaris** Lam. Spec. 11. Duham. Arbr. II. t. 138. Schmidt Baumz. t. 77. — 5 —

Habitat in Persia spontanea, nunc per Europam orientalem eferata.

Var. α. *Alba major.* — β. *Alba semiplena.* — γ. *Coccinea.* — δ. *Media* — ε. *Purpurea.* — ζ. *Rubra.* — η. *Variegata.*

3451. **Syringa Josikaea** Jacq. f. in Flora 1831. Reichenb. Iconogr. t. 780. Hooker in Bot. Mag. t. 3278. Lindley Bot. Reg. t. 1733. — ♄ — *Habitat in rupibus Transylvaniae, ubi ab excellentissima matrona Baronissa Josika nostris diebus detecta, et in hortum Vindobonensem illata fuit.*

3452. **Syringa chinensis** Willdenow Spec. I. 48. Baumz. 498. — ♄ — *Habitat in China.*

Var. β. *Rubra.*

3453. **Syringa persica** Linn. Spec. 11. Curtis Bot. Mag. t. 486. — ♄ — *Habitat in Persia.*

Var. β. *Alba.* — γ. *Laciniata* Miller Ic. t. 164. f. 2.

Ordo LXXXII. Loganiaceae.

3364. Logania R. Br.

3454. **Logania latifolia** R. Brown Prodr. 455. *Exacum vaginale* Labillard Nov. Holl. I. 37. t. 51. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

3368. Spigelia Linn.

3455. **Spigelia marylandica** Linn. Mant. 2. 330. Curtis Bot. Mag. t 80. — ♃ — *Habitat in America boreali australiore ubi vulgo » Worm grass v. Pinkroot, « Cherokesis » Unstitla « dicitur.*

Ordo LXXXIII. Apocynaceae.

3372. Carissa Linn.

3456. **Carissa Carandas** Linn. Mant. 52. Lam. Illustr. t. 118. f. 1. Roxburgh Plant. corom. I. 55. t. 77. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

3383. Allamanda Linn.

3457. **Allamanda verticillata** Desfont. Tabl. ed. 2. p. 93. Sprengel Syst. I. 584. — 5 — *Habitat in America tropica.*

3384. Vallesia Ruiz et Pav.

3458. **Vallesia cymbifolia** Ortega Decad. 58. *Rauwolfia glabra* Cavanill. Ic. III. 50. t. 297. — 5 — *Habitat in Nova Hispania.*

3459. **Vallesia dichotoma** Ruiz et Pav. Flor. Peruv. II. 26. t. 151. f. 6. — 5 — *Habitat in Peruvia.*

3386. Tanghinia Thouar.

3460. **Tanghinia veneniflua** Poiret Dict. Suppl. V. 283. Bojer in Hook. Bot. Misc. III. 290. t. 110. *Cerbera Tanghin* Hooker Bot. Mag. t. 2968. — 5 — *Habitat in Madagascar.*

3388. Cerbera Linn.

3461. **Cerbera Manghas** Linn. f. Flor. Zeyl. 106. Gärtn. II. 192. t. 123. 124. f. 1. *Cerbera lactaria* Hamilt. — 5 — *Habitat in Asia tropica.*

3391. Rauwolfia Linn.

3462. **Rauwolfia nitida** Jacq. Amer. 47. Edit. pict. p. 28. Lam. t. 172. f. 1. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

3463. **Rauwolfia canescens** Linn. Syst. 250. *Rauwolfia subpubescens* Linn. Spec. 303. *Rauwolfia hirsuta* Jacq. Amer. 47. Edit. pict. 259. f. 17. — ♄ — *Habitat in Antillis.*

3393. Alyxia Banks.

3464. **Alyxia daphnoides** A. Cunningh. in Bot. Mag. t. 3313. — ♄ — *Habitat in insula Norfolk.*

3465. **Alyxia ruscifolia** R. Brown Prodr. 470.

A. Cunningh. in Bot. Mag. t. 3312. — ♄ — *Habitat in Nova Cambria australi.*

3396. **Tabernaemontana** Linn.

3466. **Tabernaemontana citrifolia** Linn. Spec. 210. Lam. t. 170. f. 1. — ♄ — *Habitat in Antillis.*

3467. **Tabernaemontana amygdalaefolia** Jacq. Amer. 39. t. 181. f. 15. Bot. Reg. t. 338. — ♄ — *Habitat in Carthagena.*

3400. **Plumiera** Linn.

3468. **Plumiera rubra** Jacq. Amer. 35. Edit. pict. 23. Curtis Bot. Mag. t. 279. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

3469. **Plumiera alba** Jacq. Amer. 36. t. 174. f. 12. Edit. pict. t. 38. — ♄ — *Habitat in America tropica.*

3470. **Plumiera pudica** Jacq. Amer. 37. Edit. pict. t. 24. — ♄ — *Habitat in Caraçao, ubi vulgo » Donzelle. «*

3471. **Plumiera aurantia** Loddiges Cat. 15. — ♄ — *Patria ignota.*

3404. **Amsonia** Walt.

3472. **Amsonia angustifolia** L. C. Richard in Michaux Flor. Bor. Am. I. 121. *Amsonia ciliata* Walter Flor. carolin. 98. *Tabernaemontana angustifolia* Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 300. Venten. Choix t. 29. — ♃ — *Habitat subulosis apricis Georgiae, Carolinae et Virginiae.*

3473. **Amsonia salicifolia** Pursh Flor. Bor. Am. I. 184. Sims Bot. Mag. t. 1873. — ♃ — *Habitat in Carolina et Georgia.*

3405. **Vinca** Linn.

3474. **Vinca minor** Linn. Spec. 304. Smith

E. B. t. 917. Curtis Flor. lond. III. t. 16. — ♃ — *Habitat in sylvaticis Europae totius.*

Var. β. *Variegata.*

3475. **Vinca major** Linn. Spec. 304. Smith E. B. t. 514. Curtis Flor. lond. IV. t. 19. — ♃ — *Habitat in Europa media et australi.*

3476. **Vinca herbacea** Waldst. et Kitaibel Plant. Hung. rar. I. 8. t. 9. — ♃ — *Habitat in collibus calcareis Austriae et Hungariae.*

3406. **Lochnera** Reichenb.

3477. **Lochnera rosea** Reichenb. in Möslers Handb. *Cataranthus roseus* G. Don Syst. IV. 95. *Vinca rosea* Linn. Spec. 305. Miller Ic. t. 186. Curtis Bot. Mag. t. 248. Gärtner Carp. II. 172. t. 117. f. 5. — ♃ — *Habitat in Madagascaria.*

3410. **Mandevilla** Lindl.

3478. **Mandevilla suaveolens** Lindley in Bot. Reg. 1840. t. 7. — ♄ ○ — *Habitat in Bonaria.*

3411. **Beaumontia** Wall.

3479. **Beaumontia grandiflora** Wallich Tent. flor. nepal. 14. t. 17. Bot. Reg. t. 901. Bot. Mag. t. 3213. *Echites grandiflora* Roxburgh Plant. Corom. t. 281. — ♄ ○ — *Habitat in India orientali.*

3413. **Pachypodium** Lindl.

3480. **Pachypodium tuberosum** Lindley in Bot. Reg. t. 1321. *Echites tuberosa* Haworth Synops. 6. — ♄ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3420. **Lyonsia** R. Br.

3481. **Lyonsia straminea** R. Brown Prodr. 466. — ♄ — *Habitat in Nova Hollandia.*

3422. **Apocynum** Linn.

3482. **Apocynum cannabinum** Linn. Spec. 311. R. Brown in Mem. Werner. Soc. I. 68. —♃— *Habitat in Canada et Virginia, ubi vulgo »Indian hemp.«*

3483. **Apocynum hypericifolium** R. Brown in Aiton Hort. kew. ed. 2. II. 74. *Apocynum sibiricum* Jacq. Hort. Vindob. III. t. 66. —♃— *Habitat in America boreali, in glareosis fluviorum ripis.*

3427. **Nerium** R. Br.

3484. **Nerium Oleander** Linn. Spec. 805. Duhamel Arbr. II. 46. t. 12. — ♄ — *Habitat in India orientali, nunc per Europam mediterraneam efferatum.*

Var. β. *Carneum.* — γ. *Flavescens.*

3485. **Nerium odorum** Aiton Hort. kew. ed. 1. I. 297. Sims Bot. Mag. t. 2032. — ♄ — *Habitat in India orientali, juxta fluviorum ripas et ad littora maris.*

3428. **Strophanthus** DC.

3486. **Strophanthus sarmentosus** DC. in Bullet. soc. philomat. n. 64. p. 123. t. 8. Desfont. in Annal. Mus. I. 410. t 27. — ♄ — *Habitat in Sierra Leona.*

3487. **Strophanthus dichotomus** DC. in Bullet. soc. philomat. n. 64. p. 123. Ker in Bot. Reg. t. 469. *Echites caudata* Linn. Mant. 52. *Nerium caudatum* Roxburgh Flor. ind. II. 9. — ♄ — *Habitat in India orientali.*

3429. **Wrightia** R. Br.

3488. **Wrightia mollissima** Wallich Plant. As. rar. II. 39. t. 146. — ♄ — *Habitat in Nepalia.*

Ordo LXXXIV. Asclepiadeae.

3433. **Periploca** Linn.

3489. **Periploca graeca** Linn. Spec. 309. Jacq. Miscell. I. 11. t. 1. f. 2. Schkuhr Handb. t. 53.

Sibthorp Flor. graec. t. 249. Lindley in Bot. Reg. t. 803. — ♂ ◯ — *Habitat in Europa australi.*

3451. Tweedia Hook. et Arn.

3490. **Tweedia versicolor** Hooker in Bot. Mag. t. 3630. *Tweedia caerulea* Sweet Fl. Gard. t. 407. — ♃ — *Habitat in America australi.*

3456. Sarcostemma R. Br.

3491. **Sarcostemma viminale** R. Brown in Mem. Werner. Soc. I. 51. *Cynanchum viminale* Linn. Syst. 257. *Euphorbia viminalis* Linn. Spec. II. 649. — ♂ ◯ — *Habitat in India orientali.*

3457. Philibertia H. B. K.

3492. **Philibertia gracilis** Don in Sweet Fl. Gard. t. 364. *Philibertia grandiflora* Hooker in Bot. Mag. t. 3618. — ♂ — *Habitat in Bonaria.*

3461. Cynanchum Linn.

3493. **Cynanchum acutum** Linn. Spec. 310. Jacq. Miscell. I. 16. t. 1. Schkuhr Handb. t. 54. — ♃ — *Habitat in Italia, Hispania, Graecia et Tauria.*

3464. Skylakanthus Endl.

3494. **Skylakanthus sibiricus.** *Cynanchum sibiricum* R. Brown in Mem. Werner. Soc. I. 48. *Asclepias sibirica* Linn. Spec. 315. Murray in Comment. Götting. 1779. p. 23. t. 7. — ♃ — *Habitat in Sibiria et China.*

3465. Vincetoxicum Mönch.

3495. **Vincetoxicum officinale** Mönch Method. 317. *Cynanchum Vincetoxicum* R. Brown in Mem. Wern. Soc. I. 47. *Asclepias Vincetoxicum* Linn. Spec. 314. Flor. dan. t. 849. Schkuhr Handb. t. 55. — ♃ — *Habitat in montanis Europae fere totius, e Britannia exul.*

3496. **Vincetoxicum fuscatum.** *Cynanchum fuscatum* Link Enum. I. 250. *Asclepias lutea* Miller Dict. — ♃ — *Habitat in Europa australi.*

3497. **Vincetoxicum nigrum.** *Cynanchum nigrum* R. Brown in Mem. Wern. Soc. I. 48. *Asclepias nigra* Linn. Spec. 315. — ♃ — *Habitat in Gallia meridionali.*

3484. Gomphocarpus R. Br.

3498. **Gomphocarpus angustifolius** Link Enum. I. 251. *Asclepias angustifolia* Willd. Enum. 13. *Asclepias linearis* Hort. — ♃ — *Habitat in Mexico.*

3490. Asclepias Linn.

3499. **Asclepias syriaca** Linn. Spec. 313. — ♃ — *Habitat in America boreali, nec in Syria.*

3500. **Asclepias currasavica** Linn. Spec. 314. — ♃ — *Habitat in America tropica.*

3501. **Asclepias nivea** Linn. Spec. 313. Sims Bot. Mag. t. 1187. — ♃ — *Habitat in Virginia et Carolina.*

3502. **Asclepias pulchra** Ehrh. in Willd. Enum. 278. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3503. **Asclepias incarnata** Linn. Spec. 314. Jacq. Hort. Vindob. t. 107. Ker in Bot. Reg. t. 250. — ♃ — *Habitat in paludosis Americae borealis.*

3504. **Asclepias amoena** Linn. Spec. 313. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3505. **Asclepias verticillata** Linn. Spec. 315. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3506. **Asclepias tuberosa** Linn. Spec 316. Bot. Reg. t. 76. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3507. **Asclepias Greeneana** Nuttall ex Loudon Hort. Brit. — ♃ — *Habitat in America boreali.*

3501. Hoya R. Br.

3508. **Hoya carnosa** R. Brown in Mem. Werner. Soc. I. 27. *Schollia crassifolia* Jacq. f. Eclog. 2.

Asclepias carnosa Linn. Suppl. 170. Sims Bot. Mag. 788. Smith Exot. Bot. II. t. 70. *Stapelia chinensis* Loureiro Flor. cochinch. 165. — ♄ ○ — *Habitat in Asia tropica.*

3508. **Dischidia** R. Br.

3509. **Dischidia bengalensis** Colebrook in Linn. Transact. XII. 357. t. 15. Hooker Bot. Mag. t. 2916. — ♄ ○ — *Habitat in Silhet super arbores parasitica.*

3510. **Stephanotis** Thouars.

3510. **Stephanotis floribunda** Hort. — ♄ ○ — *Habitat in Madagascaria.*

3524. **Stapelia** Linn.

a. **Stapeltonia** Endl.

3511. **Stapelia grandiflora** Masson Stap. t. 11. Haworth Synops. 16. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3512. **Stapelia ambigua** Masson Stap. t. 12. Haworth Synops. 17. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3513. **Stapelia Asterias** Masson Stap. t. 14. Curtis Bot. Mag. t. 536. Jacquin Stap. t. 58. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3514. **Stapelia comata** Jacq. Stap. t. 4. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3515. **Stapelia rufa** Masson Stap. t. 20. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3516. **Stapelia pulvinata** Masson Stap. t. 13. Sims Bot. Mag. t. 1240. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

b. **Genostemon** Haw.

3517. **Stapelia divaricata** Masson Stap. t. 22. Sims Bot. Mag. t. 1007. *Gonostemon divaricata* Haworth Synops. 27. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

c. **Podanthes** Haw.

3518. **Stapelia verrucosa** Masson Stap. t. 8. Jacq. Stap. t. 26. non Sims. *Podanthes verrucosa* Haworth Synops. 33. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

d. **Tridentea** Haw.

3519. **Stapelia Vetula** Masson Stap. t. 16. Jacq. Stap. t. 27. *Tridentea Vetula* Haworth Synops. 34. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

e. **Tromotriche** Haw.

3520. **Stapelia revoluta** Masson Stap. t. 10. Sims Bot. Mag. t. 724. *Tromotriche revoluta* Haworth Synops. 36. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3521. **Stapelia glauca** Jacq. Stap. t. 10. *Tromotriche glauca* Haworth Synops. 37. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3522. **Stapelia fuscata** Jacq. Stap. t. 55. *Tromotriche fuscata* Haworth Suppl. 10. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

f. **Caruncularia** Haw.

3523. **Stapelia serrulata** Jacq. Stap. t. 41. *Caruncularia serrulata* G. Don Syst. IV. 122. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

g. **Orbea** Haw.

3524. **Stapelia maculosa** Jacq. Stap. t. 31. Sims Bot. Mag. t. 1833. *Orbea maculosa* Haworth Synops. 37. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3525. **Stapelia variegata** Thunb. Prodr. I. 46. Jacq. Miscell. I. 27. t. 4. Stap. t. 24. DC. Plant. gr. t. 149. non Curt. *Orbea variegata* Haworth Synops. 40. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3526. **Stapelia trisulca** Jacq. Stap. t. 64. *Orbea bisulca* Haworth Synops. 39. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3527. **Stapelia Curtisii.** *Stapelia variegata* Curtis Bot. Mag. t. 26. excl. synon. *Orbea Curtisii*

Haworth Synops. 40. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3528. **Stapelia planiflora** Jacq. Stap. t. 40. *Orbea planiflora* G. Don Syst. IV. 120. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Obscura.*

3529. **Stapelia normalis** Jacq. Stap. t. 42. Ker in Bot. Reg. t. 755. *Orbea normalis* G. Don Syst. IV. 120. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3530. **Stapelia clypeata** Jacq. Stap. t. 48. *Orbea clypeata* Haworth Suppl. t. 13. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3531. **Stapelia bufonia** Jacq. Stap. t. 35. Sims Bot. Mag. t. 1076. *Orbea bufonia* Haworth Synops. 40. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3532. **Stapelia marmorata** Jacq. Stap. t. 28. *Orbea marmorata* G. Don Syst. IV. 120. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3533. **Stapelia picta** Don Catalog. Hort. Cantabr. p. 53. Sims Bot. Mag. t. 1169. *Orbea picta* Haworth Synops. 42. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3534. **Stapelia mutabilis** Jacq. Stap. t. 59. 60. *Orbea mutabilis* G. Don Syst. IV. 121. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Var. β. *Inodora. Orbea inodora* Haworth Suppl. 12. — γ. *Obscura.* — δ. *Rigida.*

h. **Obesia** Haw.

3535. **Stapelia geminata** Masson Stap. t. 25. Jacq. Stap. t. 8. Sims Bot. Mag. t. 1326. *Obesia geminata* Haworth Synops. 42. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

i. **Duvalia** Hav.

3536. **Stapelia deflexa** Jacq. Stap. t. 20. *Duvalia deflexa* G. Don Syst. IV. 121. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Obscura.*

3537. **Stapelia hirtella** Jacq. Stap. t. 14.

Duvalia hirtella G. Don Syst. IV. 122. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β *Hirsutior.*

3538. **Stapelia mastodes** Jacq. Stap. t. 56. 57. *Duvalia mastodes* G. Don Syst. IV. 122. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3526. Apteranthes Mik.

3539. **Apteranthes Gussoneana** Mikan in N. A. N. C. XVII. 594. t. 41. *Stapelia Gussoneana* Jacq. f. in Bot Reg. t. 1731. *Piaranthus Gussoneanus* G. Don Syst. IV. 113. — ♃ — *Habitat in insula Lampedusa.*

3527. Heurnia R. Br.

3540. **Heurnia tubata** R. Brown in Mem. Werner. Soc. I. 11. *Stapelia tubata* Jacq. Stap. t. 23. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

β. *Duodecimfida. Stapelia duodecimfida* Jacq. Stap. t. 33. 34.

3541. **Heurnia barbata** R. Brown in Mem. Wern. Soc. I. 11. *Stapelia barbata* Masson Stap. t. 7. Jacq. Stap. t. 46. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3542. **Heurnia clavigera** Haworth Synops. 26. Suppl. 10. *Stapelia clavigera* Jacq. Stap. t. 4. *Stapelia campanulata* Sims Bot. Mag. t. 1661. excl. synon. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

Ordo LXXXV. Gentianeae.

Subordo I. Gentianeae verae.

3528. Gentiana Tournef.

α. **Asterias** Ren.

3543. **Gentiana lutea** Linn. Spec. 329. Plenk Plant. offic. t. 156. — ♃ — *Habitat in alpibus, imprimis calcareis, Europae.*

b. **Crassepetalum** Froel.

3544. **Gentiana ciliata** Linn. Spec. 334. Jacq. Flor. austr. t. 113. — ♃ — *Habitat in pratis et pascuis siccis, imprimis calcareis, Europae mediae.*

c. **Cyane** Ren.

3545. **Gentiana decumbens** Linn. Suppl. 174. β. *Gebleri* Ledebour ex Bung. Gent. 211. t. 8. — ♃ — *Habitat in Sibiria.*

3546. **Gentiana asclepiadea** Linn. Spec. 329. Jacq. Flor. austr. t. 328. — ♃ — *Habitat in pratis montanis Europae mediae et australis.*

3547. **Gentiana saponaria** Linn. Spec. 330. Bot. Mag. t. 1039. — ♃ — *Habitat in pratis humidis et sylvis Americae borealis.*

d. **Thylacites** Renealm.

3548. **Gentiana pannonica** Scopoli Carn. 2. n. 297. Jacq. Flor. austr. t. 136. — ♃ — *Habitat in alpinis et subalpinis Europae.*

Offic. Radix Gentianae rubrae.

3549. **Gentiana cruciata** Linn. Spec. 334. Jacq. Flor. austr. t. 372. — ♃ — *Habitat in pratis montanis siccis Europae.*

3536. **Chironia** Linn.

3550. **Chironia frutescens** Linn. Spec. 273. Bot. Mag. t. 37. *Chironia decussata* Vent. Jard. Cels. t. 31. Reichenb. Ic. exot. t. 244. — ♃ — *Habitat in Capite bonae spei.*

3543. **Erythraea** Ren.

3551. **Erythraea Centaurium** Persoon Encheir. I. 283. *Gentiana Centaurium* Linn. Spec. 332. — ⊙ — *Habitat in Europae collibus.*

Offic. Centaurium minus.

Subordo II. Menyantheae.

3564. Menyanthes Linn.

3552. **Menyanthes trifoliata** Linn. Spec. 208. — ♃ — *Habitat in paludibus et fossis Europae.*

3565. Villarsia Vent.

3553. **Villarsia nymphoides** Vent. Choix 9. 2. *Waldschmidia nymphoides* Wigg. Prim. 20. *Menyanthes nymphoides* Linn. Spec. 207. — ♃ — *Habitat in aquis stagnantibus et lente fluentibus Europae.*

INDEX.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

J.

K.

L.

P.

Q.

R.

S.